

## PAKENDI INFOLEHT

**Butasal-100, 100 mg/ml + 0,05 mg/ml süstelahus hobustele, veistele, koertele ja kassidele**

### **1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADDRESS**

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

Vanapere tee 14, Püünsi

Viimsi vald

Harju maakond 74013

Eesti

### **2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Butasal-100, 100 mg/ml + 0,05 mg/ml süstelahus hobustele, veistele, koertele ja kassidele

butafosfaan

tsüanokobalamiin

### **3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS**

Üks ml süstelahust sisaldab:

#### **Toimeained:**

Butafosfaan 100,0 mg

Tsüanokobalamiin (vitamiin B12) 0,05 mg

#### **Abiaine:**

Bensüülalkohol (E1519) 10,5 mg

Selge punane lahus nähtavate osakesteta.

### **4. NÄIDUSTUS(ED)**

Ainevahetus- või sigimishäirete toetav ravi, kui on vajalik fosfori ja tsüanokobalamiini täiendav manustamine.

Poegimiseelsete või –järgsete ainevahetushäirete, tetaania (vahelduvad lihaskrambid) ja pareesi (poegimishalvatus), korral tuleb ravimit manustada lisaks magneesiumile ja kaltsiumile.

### **5. VASTUNÄIDUSTUSED**

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

### **6. KÕRVALTOIMED**

Ei ole teada.

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti.

Võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu.

## **7. LOOMALIIGID**

Hobune, veis, koer, kass.

## **8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD**

### Manustamisviis

Veis, hobune: intravenoosseks (i.v) manustamiseks.

Koer, kass: intravenoosseks (i.v), intramuskulaarseks (i.m) või subkutaaneks (s.c) manustamiseks.

### Annus

Loomaliigid/ alamkategooria	Butafosfan (mg/kg)	Vitamiin B12 (mcg/kg)	Butasal-100 (ml/kg)
Hobune	2,0 – 5,0	1,0 – 2,5	0,02 – 0,05
Varss	3,3 – 5,6	1,65 – 2,8	0,033 – 0,056
Veis	2,0 – 5,0	1,0 – 2,5	0,02 – 0,05
Vasikas	3,3– 5,6	1,65 – 2,8	0,033 – 0,056
Koer	2,5 – 25,0	1,25 – 12,5	0,025 – 0,25
Kass	10,0 – 50,0	5,0 – 25,0	0,1– 0,5

Vajadusel korrata manustamist.

## **9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS**

Kummikorki tohib nõelaga läbistada maksimaalselt 15 korda.

## **10. KEELUAEG**

### Veis, hobune:

Liha ja söödavatele kudedele: 0 päeva.

Piimale: 0 tundi.

## **11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida vial välispakendis valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 28 päeva.

## **12. ERIHOIATUSED**

### Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Soovitav on kindlaks teha ainevahetus- ja sigimishäirete põhjus(ed), et siis määrata kõige sobivamad ennetus- ja ravimeetmed ning vajadus ravida täiendava fosfori ja vitamiiniga B12.

### Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Kassidel tuleb ravimit kasutada ettevaatusega ja kinni pidada soovitatud annustest, kuna neil esineb bensüülalkoholi metabolismiga seotud metaboolse raja (glükuroniseerimise) defitsiit.

### Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Bensüülalkohol võib põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Inimesed, kes on bensüülalkoholi suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

Veterinaarravim võib põhjustada kerget naha, silmade või limaskestade ärritust. Seetõttu tuleb vältida kokkupuudet naha, silmade ja limaskestadega. Juhuslikul ravimiga kokkupuutel naha, silmade või limaskestadega pesta piirkond rohke veega.

Ravimi käsitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

Pärast veterinaarravimi kasutamist pesta käed.

### Tiinus ja laktatsioon

Tiinetel ja lakteerivatel veistel, märadel, koertel ja kassidel ei ole ravimi ohutus tõestatud. Samas ei tohiks ravimi kasutamisega tiinuse ja laktatsiooni ajal nimetatud loomaliikidel probleeme tekkida.

## **13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL**

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmel tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV**

Aprill 2021

## **15. LISAINFO**

### Pakend

Pappkarp ühe 100 ml viaaliga.

6 pappkarpi ühe 100 ml viaaliga pakendatud pappkasti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

Vanapere tee 14, Püünsi

Viimsi vald

Harjumaa 74013

Eesti

Tel.: +372 6 005 005

E-mail: [info@interchemie.ee](mailto:info@interchemie.ee)