

**PAKENDI INFOLEHT**  
**Stromease, 25 mg/ml silmatilgad, lahus koertele ja kassidele**

**1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADDRESS**

Müügiloa hoidja  
DOMES PHARMA  
3 Rue André Citroën  
63430 Pont-du-Château  
Prantsusmaa

Partii vabastamise eest vastutav tootja  
PHARMASTER+  
Z.I. de Krafft  
67150 ERSTEIN  
Prantsusmaa

**2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Stromease, 25 mg/ml silmatilgad, lahus koertele ja kassidele  
atsetüültsüsteiin

**3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS**

Üks ml sisaldab:

**Toimeaine:**

Atsetüültsüsteiin                      25,00 mg

**Abiained:**

Bensalkooniumkloriid                0,10 mg

Ditiotreitol                                4,00 mg

Dinaatriumedetaat                    0,50 mg

Selge värvitu lahus.

**4. NÄIDUSTUS(ED)**

Sarvkesta haavandite toetav ravi.

**5. VASTUNÄIDUSTUSED**

Mitte kasutada, kui esineb teadaolevat ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

## 6. KÕRVALTOIMED

Nagu kõigi silmatilgalahuste puhul, võivad ka pärast selle ravimi manustamist tekkida kerged ja lühiajalised ebamugavusega seotud reaktsioonid.

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti. Võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu.

## 7. LOOMALIIGID

Koer ja kass.



## 8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Okulaarne.


Ravimit tilgutatakse kahjustatud silma(desse) annuses 2 silmatilka 3...4 korda ööpäevas.

Ravi tuleb jätkata vastavalt vastutava veterinaararsti antud juhistele.

## 9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Juhised pudeli avamiseks ja tilgutusotsiku kinnitamiseks

- Peske hoolikalt käed, et vältida viaali sisu mikrobioloogilist saastumist.
- Avage metallkate ja tõmmake mööda ettenähtud jooni mööda lõpuni alla. Seejärel eemaldage ülejäänud metallkate (joonis 1).
- Eemaldage viaalilt oranž punnkork (joonis 2).
- Pärast punnkorgi eemaldamist ei tohi viaaliava puutuda.
- Võtke väikese valge keeratava korgiga tilgutusotsik kotikesest välja ning puudutamata sealjuures viaali külge kinnitatavat otsa, kinnitage otsik (joonis 3) viaali külge ja ärge seda enam eemaldage.
- Ravim on nüüd kasutamiseks valmis (joonis 4).



Kasutusjuhend

Ravimi manustamiseks eemaldage väike valge keeratav kork. Hoidke koera/kassi pead paigal, suunates seda veidi ülespoole. Hoidke pudelit püstiasendis, ilma silma puudutamata. Pudeli ja silma vahelise kauguse hoidmiseks toetage oma kätt / väikest sõrme koera/kassi laubale. Tõmmake haige silma alalaugu

ettevaatlikult allapoole, nii et lau ja silma vahele tekiks väike tasku. Vajutage õrnalt tilgutit ja manustage tekkinud taskusse kaks tilka ravimit.

Pärast keeratava korgi eemaldamist olge ettevaatlik, et mitte puudutada tilguti otsa ning pärast kasutamist keerake valge kork peale tagasi. Pange pudel tagasi karpi (püstiasendis) ja hoidke kuni järgmise ravikorrani laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Kui ravi kombineeritakse muude silmaravimitega, tuleb ravikordade vahele jätta vähemalt 5...10 minutit. Kui ravi kombineeritakse mitte veepõhiste, vaid õlipõhiste ravimitega, tuleb esmajärjekorras manustada atsetüültsüsteiini silmatilgad.

## **10. KEELUAEG**

Ei rakendata.

## **11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja sildil pärast „EXP”.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Kõlblikkusaeg pärast viaali esmast avamist: 7 päeva.

## **12. ERIHOIATUSED**

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Ei ole.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ravi ajal tuleb silmi regulaarselt kontrollida.

Sarvkesta haavandite õigesti ravimiseks tuleb välja selgitada algpõhjused ja/või raskendavad tegurid ning neid asjakohaselt ravida.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Pärast kasutamist pesta käed.

Tiinus ja laktatsioon

Uuringud rottide ja küülikutega tiinetel emasloomadel toksilisust ei näidanud.

Veterinaarravimi ohutus koertel või kassidel tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud.

Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Ei ole teada.

Sobimatus

Ei rakendata.

**13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige palun oma loomaarstilt või apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

**14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV**

September 2021

**15. LISAINFO**

Merevaiguvärvi I tüüpi klaasist viaal, milles on 5 ml ravimit ja mis on suletud I tüüpi broombutüülist punnkorgi ning äratõmmatava alumiiniumkorgiga.

HDPE-korgiga suletav valge PVC-tilguti.

Iga viaal on pakitud pappkarbi.

Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.