

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Vermox 100 mg tabletid mebendasool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Vermox 100 mg tabletid (edaspidi Vermox) ja milleks neid kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Vermox'i võtmist
3. Kuidas Vermox'it võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Vermox'it säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Vermox ja milleks seda kasutatakse

Vermox on parasiitidevastane ravim, mis on näidustatud naaskelsaba (enterobioos, *Enterobius vermicularis*), limuksolkmete (askariaas, *Ascaris lumbricoides*), piuglaste (trihhuroos, *Trichuris trichiura*) ja kidausside (ankülostomaas, *Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*) poolt põhjustatud seedetrakti ühe infestatsiooni või segainfestatsioonide raviks.

Vermox on näidustatud täiskasvanutele ja lastele.

2. Mida on vaja teada enne Vermox'i võtmist

Vermox'it ei tohi võtta

- kui olete mebendasooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Vermox'i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võtke alati Vermox'it täpselt nii, nagu arst on teid juhendanud ja pidev meditsiiniline jälgimine on vajalik kuni sümptomite taandumiseni (nt tuleb uurida väljaheidet).

Isiklik hügieen on ravi ajal ja pärast ravi väga oluline, et vältida infektsioonide taasteket ja levikut teistele inimestele.

Lapsed

Alla 2-aastaseid lapsi ei tohi Vermox'iga ravida, välja arvatud juhul, kui raviarst on nii otsustanud.

Alla 2-aastastel lastel on oht krampide tekkeks.

Muud ravimid ja Vermox

Teatage oma arstile või apteekrile kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Mebendasooli ja metronidasooli (kasutatakse bakteriaalsete ja algloomade nakkuste raviks) samaaegset kasutamist tuleb vältida tõsiste kõrvaltoimete riski tõttu.

Teiste ravimite, nt tsimetidiini (kasutatakse kõrvetiste raviks) samaaegne kasutamine võib mõjutada Vermox´i toimet, seepärast küsige sellistel juhtudel nõu oma arstilt.

Vermox koos toidu ja joogiga

Vermox´it on soovitatav võtta pärast sööki koos vähese koguse veega. Ravi ajal ei ole vajalik lahtistite ega muu dieedi kasutamine.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase või imetate, arvate end olevat rase või kavatsete raseduda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Raseduse ja rinnaga toitmise ajal võib Vermox´it võtta vaid erandjuhtudel vastavalt arsti juhistele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Vermox ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimele.

Vermox sisaldab värvainet päikeseloojangukollane (E110)

Värvaine päikeseloojangukollane (E110) võib tekitada allergilisi reaktsioone.

Vermox sisaldab naatriumi

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi ühes tablettis, see tähendab on põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

3. Kuidas Vermox´it võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Vermox´i annustamise ja ravi kestuse peab määrama arst vastavalt parasiitussnakkuse liigile. Ravi kestus on tavaliselt 1-3 päeva. Arsti poolt määratud annusest tuleb kinni pidada ning vajalik on pidev meditsiiniline jälgimine kuni sümptomite täieliku kadumiseni (nt võetakse vastav väljaheite proov).

Soovitatavad annused on järgmised:

Enterobiaas (naaskelsabad):

Nii täiskasvanutele kui ka lastele alates 2 aasta vanusest 100 mg (1 tablett) ühekordse annusena. Järgides arsti juhiseid, võib ravi vajadusel 2 ja 4 nädala pärast korrata.

Askariaas (solkmed), trihhuriaas (piuglased), ankülostomiaas (kidaussid) ja segainfestatsioonid:

Nii täiskasvanutele kui ka lastele alates 2 aasta vanusest 200 mg ööpäevas (1 tablett hommikul ja 1 tablett õhtul) kolmel järjestikusel päeval.

Tableti võib alla neelata tervena või neelamise kergendamiseks närida või katki teha ning võtta vähese koguse veega pärast sööki. Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks. Enne väiksele lapsele manustamist purustage tablett.

Alati jälgige last selle ravimi võtmise ajal.

Lahtistid või spetsiaalne dieet ei ole ravi ajal vajalikud.

Kui te võtate Vermox´it rohkem, kui ette nähtud

Kui teie või teie laps on võtnud liiga palju tablette, pöörduge viivitamatult arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võtke endaga kaasa ravimi pakend ja infoleht.

Kui olete juhuslikult sisse võtnud rohkem tablette, kui arst on teile määranud, võivad ilmneda kõhukrambid, iiveldus, oksendamise ja kõhulahtisus.

Pikka aega suuremate annustega ravitud patsientidel on harva teatatud pöörduvatest maksaprobleemidest, maksapõletikust, neeruprobleemidest ja teatud valgete vererakkude hulga vähenemisest (neutropeeniast).

Spetsiifilist antidooti (vastumürki) ei ole. Esimese tunni jooksul pärast sissevõtmist võib teha maoloputust. Vajadusel võib manustada aktiveeritud sütt.

Kui te unustate Vermox'it võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmine tablett tavapärasel ajal ning edaspidi jätkake ravimi võtmist nii, nagu arst on teile öelnud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Nagu kõik ravimid, võib ka Vermox põhjustada ülitundlikkusreaktsioone. Pöörduge kohe oma arsti poole, kui teil tekib mõni järgnevatest sümptomitest. Sagedus on teadmata:

- Nahalööve, nõgestõbi (urtikaaria), allergiline turse (angioödeem; näo, kurgu, suu või kõri turse), hingamisraskused, minestuse tunne.
- Raske haigus koos villilise lööbega nahal, suu, silmade ja genitaalide ümbruses. Laiaulatuslik lööve koos villide ja naha mahakoorumisega (*Stevensi-Johnsoni sündroom*). Raske haigus koos villilise lööbega (naha mahakoorumine rohkem kui 30% kehapiina ulatuses - toksiline epidermaalne nekrolüüs).

Kõrvaltoimed, millest on teatatud Vermox'i kasutamisel, on järgmised:

Sage (võib esineda kuni 1-l kasutajal 10-st):

- kõhuvalu

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1-l kasutajal 100-st):

- ebamugavustunne kõhus, kõhupuhitus, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine
- lööve

Harv (võib esineda kuni 1-l kasutajal 1000-st):

- pearinglus

Väga harv (võib esineda kuni 1-l kasutajal 10 000-st):

- glomerulonefriit* (neerude põletik)
- agranulotsütoos* (valgete vererakkude hulga märkimisväärne langus, mille tõttu on infektsioonide teke rohkem tõenäoline)

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

- neutropeenia (teatud valgete vererakkude hulga langus, mistõttu tekivad infektsioonid sagedamini)
- ülitundlikkusreaktsioonid, mõnikord rasked
- krambid
- hepatiit (maksapõletik)
- häired maksafunktsiooninäitajates
- rasked nahareaktsioonid
- eksanteem (naha mahakoorumine)
- angioödeem (allergiline turse)

- urtikaaria (nõgestõbi)
- alopeetsia (juuste kaotus)

Täiendavad kõrvaltoimed lastel

Väga harv (võib esineda kuni 1-l kasutajal 10 000-st):

- krambid

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Vermox´it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C, originaalpakendis.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Vermox sisaldab:

- Toimeaine on mebendasool. Üks tablett sisaldab 100 mg mebendasooli.
- Teised koostisosad on mikrokristalliline tselluloos, naatriumtärklisglükolaat, talk, maisitärklis, naatriumsahhariin, magneesiumstearaat, hüdrogeenitud taimne õli, apelsini lõhna- ja maitseaine, kolloidne veevaba ränidioksiid, naatriumlaaurüülsulfaat, päikeseloojangukollane (E110).

Kuidas VERMOX välja näeb ja pakendi sisu

Ümmargused, lamedad, kaldservadega heleoranžid tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon, poolitusjoone mõlemal poolel on märgistus „Me / 100“. Tableti teisel poolel on märgistus „Janssen“.

Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.

PVC/Al blister, mis on pakendatud pappkarpi.

Pakendis on 6 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Teisese müügiloa hoidja

UAB "Lex ano"
Naugarduko g. 3
LT-03231 Vilnius
Leedu

Tootja

Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica S.A.
Estrada Consiglieri Pedroso 69-B
Queluz de Baixo
2730-055 Barcarena
Portugal

Ümberpakendaja

Lietuvos ir Norvegijos UAB "Norfachema"

Vytauto g. 6

LT-55175 Jonava

Leedu

või

UAB "ENTAFARMA",

Klonėnų vs. 1

LT-19156 Širvintų r. sav.

Leedu

või

CEFEA Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Działkowa 56

02-234 Warszawa

Poola

Infoleht on viimati uuendatud mais 2021.