

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Paxeladine, 0,2% siirup

Toimeaine

Okseladiinvesiniktsitraat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
- Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Paxeladine siirup ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Paxeladine siirupi kasutamist
3. Kuidas Paxeladine siirupit kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Paxeladine siirupit säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Paxeladine siirup ja milleks seda kasutatakse

Ravimit kasutatakse kuiva ja valuliku kõha sümptomaatiliseks raviks.

Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

2. Mida on vaja teada enne Paxeladine siirupi kasutamist

Paxeladine siirupit ei tohi kasutada

- kui olete toimeaine või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- lahtise kõha korral, sest sel juhul on kõharefleks organismi loomulik kaitsereaktsioon sekreedi bronhidest eemaldamiseks.

Pidage nõu arstiga, kui kõha muutub lahtiseks ja sellega kaasnevad röga ja palavik või kui teil on krooniline bronhi- või kopsuhaigus, millega kaasneb röga-eritusega kõha.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Paxeladine siirupi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Vältida sekreedi vedeldavate ainete samaaegset manustamist (rögalahustid, limavedeldajad).

Haruldase päriliku fruktoosi talumatuse, glükoosi – galaktoosi imendumishäirete või sahharoosi – isomaltaasi puudulikkusega patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

Lapsed

Puuduvad kliinilised andmed ravi efektiivsuse ja ohutuse kohta alla 30 elukuu vanustel lastel, mistõttu seda ravimit ei tohi selles vanuses lastel kasutada.

Muud ravimid ja Paxeladine siirup

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mistahes muid ravimeid.

Okseladiini ei tohi kombineerida rögalahustitega.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimit ei tohi raseduse ja rinnaga toitmise ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Paxeladine siirupi kasutamine ei mõjuta autojuhtimisvõimet ega masinate või mehhanismide käsitlemist.

Paxeladine siirup sisaldab

Diabeedihaiged või alandatud suhkruisaldusega dieedil olevad patsiendid peavad arvestama, et päevane annus ravimit sisaldab sahharoosi koguses: 4,25 g 5 ml annuse kohta ja 2,125 g 2,5 ml annuse kohta.

See ravim sisaldab väikeses koguses etanooli, üks 2,5 ml annus sisaldab 12 mg etanooli ja üks 5 ml annus sisaldab 24 mg etanooli

3. Kuidas Paxeladine siirupit kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamiseks tuleb kasutada kaasasolevat 2,5 ml ja 5 ml märgistusega mõõtelusikat või mõõtetopsi.

Kasutamine lastel

Soovitav annus on

Lapsed kehakaaluga 15 ...20 kg (st lapsed vanuses umbes 30 kuud...6 aastat):

2,5 ml iga 4 tunni järel, kehakaalu arvestades mitte rohkem kui 3...4 annust (2,5 ml) päevas.

Lapsed kehakaaluga 20...30 kg (st umbes 6...10 aasta vanused lapsed): 5 ml iga 4 tunni järel, arvestades kehakaalu mitte rohkem kui 2...3 annust (5 ml) päevas.

Lapsed kehakaaluga 30...50 kg (st umbes 10...15 aasta vanused lapsed): 5 ml iga 4 tunni järel, arvestades kehakaalu mitte rohkem kui 3...5 annust (5 ml) päevas.

Täiskasvanud

Soovitav annus on:

5 ml iga 4 tunni järel, mitte rohkem kui 5 annust (5 ml) päevas.

Kui ravim ei anna oodatud toimet, siis ei tohi suurendada ettenähtud annust ja mitte tarvitada paralleelselt teist kõhuvastast ravimit. Pidage nõu oma arstiga.

Ravikuur peab olema lühike (mõned päevad) ja ravimit kasutada ainult köha korral (sümptomaahtiliselt).

Kui te võtate Paxeladine siirupit rohkem kui ette nähtud:

Suure üleannuse võtmisel tuleb kohe võtta ühendust arstiga või kutsuda kiirabi. Jälgida hingamis- ja südamefunktsiooni näitajaid. Spetsiifiline vastumürk puudub.

Kui te unustate Paxeladine siirupit võtta:

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võivad tekkida allergilised nahareaktsioonid.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Paxeladine siirupit säilitada

Hoida seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast {kuupäev PP.KK.AAAA}. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pärast esmast avamist säilib ravim maksimaalselt 6 kuud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Paxeladine siirup sisaldab

Toimeaine on: okseladiinvesiniktsitraat. 1 ml sisaldab 2 mg okseladiinvesiniktsitraati.

Abiained on: Kakao maitsearoom (lõhnaained, vesi, etanool), vedel sahharoos, puhastatud vesi.

Üks 2,5 ml annus sisaldab 5 mg okseladiinvesiniktsitraati.

Üks 5 ml annus sisaldab 10 mg okseladiinvesiniktsitraati.

Teadaolevat toimet omavad abiained: üks 2,5 ml annus sisaldab 2,125 g sahharoosi ja üks 5 ml annus sisaldab 4,25 g sahharoosi.

Kuidas Paxeladine siirup välja näeb ja pakendi sisu

Selge, kergelt kollakas šokolaadi ja kirsilõhnaline siirup.

III tüüpi merevaikkollane, 125 ml klaaspudel, mis on suletud alumiiniumkorgiga ning kaetud polüetüleenkattega

või

III tüüpi merevaikkollane, 100 ml klaaspudel, mis on suletud polüetüleenkorgiga ning kaetud polüetüleenkattega.

Pakend sisaldab 2,5 ml ja 5 ml topeltannuse märgistusega elevantiluu värvi polüstüreenist mõõtelusikat või polüetüleenist mõõtetopsi.

Müügiloa hoidja:

Ipsen Consumer Healthcare
65, quai Georges Gorse
92100 Boulogne - Billancourt
Cedex
Prantsusmaa

Tootja:

BEAUFOR IPSEN Industrie
Rue Ethe Virton
28100 Dreux
Prantsusmaa

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2021.