

Информационный листок-вкладыш: информация для пользователя

Септолете плюс, 5 мг/1 мг леденцы Septolete plus, 5 mg/1 mg losengid

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, поскольку он содержит необходимую вам информацию.

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, или так, как вам объяснили врач или аптекарь.

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности.
- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем.
- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном листке.
- Если по прошествии 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, вам следует связаться с врачом.

Содержание информационного листка:

1. Что представляет собой препарат Септолете плюс и для чего он применяется
2. Что следует знать перед приемом препарата Септолете плюс
3. Как принимать Септолете плюс
4. Возможные побочные эффекты
5. Как хранить Септолете плюс
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. Что представляет собой препарат Септолете плюс и для чего он применяется

Таблетки для рассасывания Септолете плюс оказывают местное обезболивающее и противомикробное действие. Они дезинфицируют ротовую полость и горло и локально уменьшают боль.

Содержащееся в таблетках для рассасывания антисептическое средство хлорид цетилпиридиния уничтожает многие бактерии и грибки и в некоторой степени также подавляет развитие грибков и вирусов. Таким образом оно смягчает воспаление во рту и горле и помогает предупредить развитие гораздо более серьезного бактериального воспаления. Поскольку хлорид цетилпиридиния легко распределяется и снижает поверхностное натяжение, он проникает в том числе и в труднодоступные участки ротовой полости и слизистой оболочки глотки и подавляет рост бактерий в них.

Бензокаин является локальным обезболивающим средством, подходящим для уменьшения боли при глотании, которая часто сопровождается инфекционными и воспалительными процессами в ротовой полости и горле.

Таблетки для рассасывания Септолете плюс содержат полиолы мальтитол и маннитол. Препарат не содержит сахара, который нужен бактериям для роста. Таблетки для рассасывания Септолете плюс подходят диабетикам, не вызывают кариеса зубов и обладают значительно лучшим антисептическим действием, чем препараты, которые содержат сахар.

Если по прошествии 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, вам следует связаться с врачом.

2. Что следует знать перед приемом препарата Септолете плюс

Не принимайте Септолете плюс:

- если у вас аллергия на действующее вещество или какие-либо компоненты препарата (перечислены в разделе б).

Предостережения и меры предосторожности

Перед началом приема Септолете плюс проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

Не превышайте рекомендуемые дозы!

Информация для диабетиков: Одна таблетка для рассасывания содержит приблизительно 1 г мальтитола. Вследствие медленного гидролиза и плохого всасывания в желудочно-кишечном тракте мальтитол оказывает слабое влияние на уровень сахара в крови. При этом энергетическая ценность мальтитола (10 кДж/г или 2,4 ккал/г) значительно ниже, чем у сахара.

Дети и подростки

Септолете плюс не рекомендуется детям младше 6 лет.

Таблетки для рассасывания Септолете плюс содержат полиолы. В высоких дозах полиолы могут вызывать понос, прежде всего у детей.

Другие лекарственные препараты и Септолете плюс

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какие-либо иные лекарства.

Ни одного лекарственного взаимодействия до настоящего времени не выявлено.

Сочетание Септолете плюс с пищей и питьем

Не принимайте Септолете плюс непосредственно перед едой или вместе с молоком.

Беременность и кормление грудью

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

Беременные и кормящие грудью женщины могут принимать таблетки для рассасывания Септолете плюс только по рекомендации лечащего врача, если ожидаемая польза от лечения превышает возможный риск для плода/ребенка.

Вождение автотранспорта и управление механизмами

Не имеется сведений о действии таблеток для рассасывания Септолете плюс, ухудшающем способность водить автомобиль и управлять механизмами.

Леденцы Септолете плюс содержит мальтитол и жидкий мальтитол.

Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, свяжитесь с лечащим врачом перед применением этого препарата.

3. Как принимать Септолете плюс

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены.

Рекомендуемая доза для взрослых и детей старше 12 лет составляет до 8 таблеток для рассасывания в сутки. Каждые 2...3 часа растворяйте во рту один леденец.

Рекомендуемая доза для детей в возрасте 6...12 лет составляет до 4 таблеток для рассасывания в сутки. Дети этого возраста должны растворять во рту один леденец каждые 4 часа.

Если вы приняли больше Септолете плюс, чем предусмотрено

В случае передозировки проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

С учетом малого содержания действующих веществ в таблетке для рассасывания, риск передозировки является минимальным. Прием внутрь слишком большого количества таблеток для рассасывания может вызывать нарушения со стороны пищеварительного тракта: тошноту, рвоту и понос. При возникновении таких симптомов прекратите принимать таблетки для рассасывания, выпейте обильное количество воды или молока и проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Если вы забыли принять Септолете плюс

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен.

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

4. Возможные побочные эффекты

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым подвержены не все.

Если таблетки для рассасывания Септолете плюс принимаются согласно рекомендациям, то побочные эффекты возникают очень редко. У чувствительных людей при приеме в дозах, превышающих рекомендуемые, могут возникать нарушения со стороны пищеварительного тракта из-за раздражения его слизистой оболочки.

При наличии сверхчувствительности к какому-либо компоненту препарата применение леденцов может сопровождаться аллергическими реакциями.

Сообщение о побочных эффектах

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на сайт www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о безопасности препарата.

5. Как хранить Септолете плюс

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте.

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в оригинальной упаковке, защищенной от влаги и света.

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке после отметки «Kõlblik kuni». Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца.

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры благоприятствуют охране окружающей среды.

6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит Септолете плюс

- Действующие вещества: бензокаин и хлорид цетилпиридиния. Каждый леденец (таблетка для рассасывания) содержит 5 мг бензокаина и 1 мг хлорида цетилпиридиния.
- Прочие компоненты: эфирное масло мяты, левоментол, жидкий мальтитол, мальтитол, маннитол, глицерин, касторовое масло, стеарат магния, коллоидный безводный диоксид кремния, повидон, фармацевтические воски, диоксид титана (E171), синий краситель V (E131).

Как выглядит Септолете плюс и что содержится в упаковке

Синие круглые двояковыпуклые леденцы с блестящей поверхностью.

Доступны по 18 или 30 леденцов в блистерной упаковке и коробке.

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов.

Держатель торговой лицензии и изготовитель

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Словения

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Тел. 6671658

Последнее обновление информационного листка датируется маем 2016 г.