

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента

Панзинорм форте-Н 20000ЕД+12000ЕД+900ЕД таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Panzynorm forte-N 20000TÛ+12000TÛ+900TÛ ðhukese polümeerikattega tabletid
Липаза, амилаза, протеаза

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, поскольку он содержит необходимую вам информацию.

Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке, или так, как вам объяснили врач или аптекарь.

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности.
- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем.
- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном листке. См. раздел 4.
- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с лечащим врачом.

Содержание информационного листка:

1. Что представляет собой препарат Панзинорм форте-Н и для чего он применяется
2. Что следует знать перед приемом Панзинорм форте-Н
3. Как принимать Панзинорм форте-Н
4. Возможные побочные эффекты
5. Как хранить Панзинорм форте-Н
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. Что представляет собой препарат Панзинорм форте-Н и для чего он применяется

Панзинорм форте-Н содержит естественные панкреатические (выделяемые поджелудочной железой) ферменты высокой активности: липазу, амилазу и протеазу. Обычно данные вещества высвобождаются в тонком кишечнике во время приема пищи и способствуют расщеплению и усваиванию различных пищевых элементов. Липаза расщепляет жиры, амилаза – углеводы, а протеаза – белки. Компоненты таблеток Панзинорм форте-Н имеют животное (свиное) происхождение и крайне схожи с веществами, вырабатываемыми человеческим организмом. Таблетки покрыты особой оболочкой, защищающей их от действия желудочного сока. Поэтому ферменты высвобождаются из таблетки лишь в тонком кишечнике, где они начинают функционировать, заменяя те ферменты, которые поджелудочная железа неспособна вырабатывать самостоятельно в необходимом объеме.

Показания к применению Панзинорм форте-Н

Панзинорм форте-Н применяется при недостаточности внешнесекреторной функции поджелудочной железы (поджелудочной железы) и кистозном фиброзе (определенном заболевании поджелудочной железы, сопровождаемом образованием кист на месте панкреатических протоков).

2. Что следует знать перед приемом Панзинорм форте-Н

Не принимайте Панзинорм форте-Н

- если у вас аллергия на действующие вещества, какие-либо компоненты препарата (перечислены в разделе 6) или свиные белки,
- если у вас острое воспаление поджелудочной железы или обострение хронического воспаления.

Давать Панзинорм форте-Н страдающим кистозным фиброзом детям младше 15 лет запрещено.

Предостережения и меры предосторожности

Дети и подростки

Безопасность применения препарата у детей младше 15 лет не установлена.

Другие лекарственные препараты и Панзинорм форте-Н

Панкреатические ферменты способны снижать всасывание фолиевой кислоты.

Одновременное лечение блокаторами H₂-гистаминовых рецепторов или ингибиторами протонной помпы (противоязвенные препараты) может повышать эффективность панкреатических ферментов.

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какие-либо иные лекарства.

Сочетание Панзинорма форте-Н с пищей и питьем

Панзинорм форте-Н нужно принимать во время еды с большим количеством жидкости.

Беременность и кормление грудью

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

Безопасность применения Панзинорма форте-Н в период беременности и грудного вскармливания не установлена.

Вождение автотранспорта и управление механизмами

Панзинорм форте-Н не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.

Панзинорм форте-Н содержит лактозу

Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, проконсультируйтесь с врачом перед применением препарата.

3. Как принимать Панзинорм форте-Н

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены.

Принимайте Панзинорм форте-Н во время еды с большим количеством жидкости. Проглатывайте таблетки целиком, не пережевывайте и не крошите их. Принимайте препарат в минимально возможной дозировке, способной устранить жалобы (т.е. Вы обретете контроль над частотой-объемом стула и массой тела). Начните лечение с приема 1 таблетки во время основных приемов пищи (т.е. три раза в день). Если вам покажется, что такая дозировка недостаточна, то можете увеличить ее. Как правило, достаточно дозы в 1...2 таблетки во время основных приемов пищи (три раза в сутки). При необходимости вы также можете принимать по одной таблетке во время перекусов.

Если вам кажется, что препарат оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

В банке содержится пакетик с влагопоглощающим веществом, которое нельзя есть.

Прием препарата детьми

Безопасность применения препарата у детей младше 15 лет не исследована.

Если вы приняли больше Панзинорма форте-Н, чем предусмотрено

Приняв слишком большую дозу, незамедлительно проконсультируйтесь с лечащим врачом или

аптекарем.

Неизвестно, вызывает ли передозировка и системное отравление, но при превышении рекомендуемой дозировки могут возникать понос, чувствительность/зуд в области заднего прохода и закупорка кишечника. Может повышаться концентрация мочевой кислоты в крови и моче.

Если вы забыли принять Панзинорм форте-Н

Если вы забыли принять препарат во время одного из приемов пищи, дождитесь следующего приема пищи и тогда примите таблетку.

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен.

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

4. Возможные побочные эффекты

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым подвержены не все.

Серьезные побочные эффекты возникают крайне редко. При возникновении какого-либо из нижеприведенных симптомов прекратите применение препарата и незамедлительно свяжитесь с лечащим врачом или ближайшей больницей: отек лица, рта, губ или горла, сопровождающийся затрудненным дыханием или глотанием, отеки рук и ног, кожная сыпь, обморок или пожелтение кожи, слизистых оболочек или глазных белков. Данные симптомы указывают на возможную тяжелую реакцию сверхчувствительности, вследствие чего вам необходима неотложная медицинская помощь. Если у вас вздуется живот, станет болезненным и возникнут сильные приступы боли, следует рассмотреть возможность закупорки кишечника. Наиболее частыми побочными эффектами служат тошнота, рвота и боль в животе, но обычно эти симптомы не требуют прекращения приема препарата.

Сообщение о побочных эффектах

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно посредством сайта www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы сможете получить больше информации о безопасности препарата.

5. Как хранить Панзинорм форте-Н

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке в виде «Kõlblik kuni».

Банка для таблеток

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в оригинальной упаковке, защищенной от влаги.

Блистер

Данный лекарственный препарат не требует особой температуры хранения.

Хранить в оригинальной упаковке, защищенной от влаги.

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте.

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры способствуют охране окружающей среды.

6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит Панзинорм форте-Н

- Действующие вещества: липаза, амилаза, протеаза. Одна таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 20 000 единиц липазы, 12 000 единиц амилазы и 900 единиц протеазы.
- Прочие компоненты: моногидрат лактозы, микрокристаллическая целлюлоза, кросповидон, безводный коллоидный кремний, стеарат магния в составе таблетки и гипромеллоза, сополимер этилакрилата и метакриловой кислоты, триэтилцитрат, диоксид титана, тальк, кремниевая эмульсия, вкусовая добавка и ароматизатор ванили, вкусовая добавка и ароматизатор бергамота, макрогол 6000, кармеллоза натрия и полисорбат 80 в оболочке таблетки.

Как выглядит Панзинорм форте-Н и что содержится в упаковке

Круглые, двояковыпуклые, таблетки белого или светло-серого цвета, с ароматным запахом. Во флаконе желтого стекла (тип III), с алюминиевой крышечкой, влагопоглощающей капсулой и ватным абсорбентом; по 10, 30 или 100 таблеток в упаковке.

Блистерная упаковка (пленка из OPA/Al/PVC и алюминиевая фольга): 10, 30 или 100 покрытых пленочной оболочкой таблеток в коробке.

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов.

Держатель торговой лицензии и изготовитель

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Словения

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Тел. 6671658

Последнее обновление информационного листка датируется апрелем 2017 г.