

## Информационный листок-вкладыш: информация для пациента

**Хипрес 5 мг таблетки Hipres 5 mg tabletid**

**Хипрес 10 мг таблетки Hipres 10 mg tabletid**

Амлодипин

**Перед употреблением препарата внимательно прочтите информационный листок, поскольку он содержит необходимую вам информацию.**

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности.
- При возникновении дополнительных вопросов проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.
- Препарат выписан только для вас. Не давайте его кому-либо еще. Лекарство может нанести вред этому человеку, даже если симптомы заболевания схожи.
- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном листке. См. раздел 4.

### Содержание информационного листка

1. Что представляет собой препарат Хипрес, и для чего он применяется
2. Что следует знать перед приемом Хипреса
3. Как принимать Хипрес
4. Возможные побочные эффекты
5. Как хранить Хипрес
6. Содержимое упаковки и прочая информация

#### 1. Что представляет собой препарат Хипрес, и для чего он применяется

В качестве действующего вещества Хипрес содержит амлодипин, который относится к группе препаратов, называемых антагонистами кальция.

Хипрес применяется для лечения высокого кровяного давления (гипертензия) или боли в груди определенного типа, т.е. стенокардии (и ее редко встречающейся формы - стенокардии Принцметала или вариантной стенокардии).

У пациентов с высоким кровяным давлением действие вашего препарата заключается в расслаблении стенок кровеносных сосудов, благодаря чему облегчается течение крови в сосудах. У пациентов со стенокардией Хипрес улучшает кровоснабжение сердечной мышцы, в результате чего сердечная мышца получает больше кислорода из крови, и это, в свою очередь, помогает предупреждать возникновение болей в груди. Ваш препарат не позволяет немедленно облегчить обусловленную стенокардией боль в груди.

#### 2. Что следует знать перед приемом Хипреса

##### Не принимайте Хипрес:

- если у вас аллергия на амлодипин или какой-либо компонент этого препарата (перечислены в разделе 6) или на какой-либо иной антагонист кальциевых каналов. Проявлением этого может быть зуд, покраснение кожи или затрудненное дыхание;
- если у вас очень низкое кровяное давление (серьезная гипотензия);
- если у вас сужение аортального клапана (стеноз аорты) или кардиогенный шок (состояние, при котором ваше сердце не в состоянии в достаточной мере перекачивать кровь в организме);
- если у вас сердечная недостаточность, возникшая вследствие инфаркта сердца.

#### Предостережения и меры предосторожности

Перед приемом Хипреса проконсультируйтесь с врачом или аптекарем.

Известите лечащего врача, если у вас наблюдается или ранее наблюдалось какое-либо из перечисленных ниже состояний:

- недавний инфаркт сердца;
- сердечная недостаточность;
- значительное повышение кровяного давления (гипертензивный криз);
- заболевание печени;
- если вы пожилой человек и вашу дозу нужно увеличивать.

### **Дети и подростки**

Исследований действия препарата Хипрес на детей младше 6 лет не проводилось. Хипрес можно применять у детей и подростков с гипертензией, только если они в возрасте от 6 до 17 лет (см. раздел 3). Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с лечащим врачом.

### **Другие лекарственные препараты и Хипрес**

Хипрес может влиять на действие других препаратов или подвергаться их влиянию; это касается таких препаратов как:

- кетоконазол, итраконазол (противогрибковые препараты),
- ритонавир, индинавир, нелфинавир (называемые ингибиторами протеазы, применяются для лечения ВИЧ-инфекции),
- рифампицин, эритромицин, кларитромицин (антибиотики, которые применяются в лечении бактериальных инфекций),
- зверобой (*Hypericum perforatum*),
- верапрамил, дилтиазем (сердечные препараты),
- дантролен (инфузия, применяемая при существенных отклонениях температуры тела),
- такролимус, сиролимус, темсиролимус и эверолимус (препараты, подавляющие иммунную систему),
- симвастатин (лекарство, снижающее уровень холестерина в крови),
- циклоспорин (иммуносупрессант).

При одновременном приеме других лекарств, понижающих кровяное давление, Хипрес может еще больше понизить Ваше кровяное давление.

### **Сочетание Хипреса с пищей, питьем и алкоголем**

Во время приема препарата Хипрес нельзя есть грейпфруты и пить их сок. Это связано с тем, что грейпфруты и их сок могут вызвать увеличение содержания в крови действующего вещества препарата - амлодипина, что, в свою очередь, может привести к усилению в неизвестной мере снижающего кровяное давление действия препарата Хипрес.

### **Беременность и кормление грудью**

Безопасность амлодипина для человеческой беременности не подтверждена.

По имеющимся данным амлодипин выделяется с грудным молоком в небольшом количестве. Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете забеременеть, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

Перед применением любого препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

### **Вождение автотранспорта и управление механизмами**

Хипрес может влиять на вашу способность водить автотранспорт или управлять механизмами. Если таблетки вызывают у вас плохое самочувствие, головокружение, усталость или головную боль, то следует воздержаться от вождения автомобиля или работы с механизмами и сразу же обратиться к своему лечащему врачу.

### **Хипрес содержит натрий**

Данный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в одной таблетке, что означает, что препарат в принципе является «не содержащим натрия».

### **3. Как принимать Хипрес**

Всегда применяйте это лекарство точно так, как вам объяснил врач. Если вы в чем-то не уверены, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

Обычная начальная доза составляет 5 мг Хипреса один раз в сутки. Дозу Хипреса можно увеличить до 10 мг один раз в сутки.

Это лекарство можно принимать до или после еды или питья. Лучше всего принимать лекарство каждый день в одно и то же время, запивая стаканом воды. Не принимайте Хипрес вместе с грейпфрутовым соком.

#### **Применение детьми и подростками**

Обычная рекомендуемая начальная доза для детей (в возрасте от 6 до 17 лет) составляет 2,5 мг в сутки. Максимальная рекомендуемая доза составляет 5 мг в сутки. Таблетки можно делить на равные дозы.

Важно не прекращать приема таблеток. Не следует откладывать посещение лечащего врача до тех пор, пока ваши таблетки не закончатся.

#### **Если вы приняли больше таблеток Хипрес, чем предусмотрено**

Прием слишком большого количества таблеток может привести к низкому или даже опасно низкому кровяному давлению. У вас может возникнуть головокружение, обморочное состояние или слабость. При чрезмерном падении кровяного давления может возникнуть шок. В таких случаях ваша кожа может стать холодной и липко-влажной, а также вы можете потерять сознание. Если вы приняли излишнее количество таблеток Хипрес, вам нужно сразу же обратиться к врачу.

#### **Если вы забыли принять таблетки Хипрес**

Не беспокойтесь. Если вы забыли принять таблетку, то пропустите эту дозу. Вместо этого примите следующую дозу в предусмотренное время. Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен.

#### **Если вы перестали принимать Хипрес**

Лечащий врач скажет вам, как долго следует принимать лекарство. Если вы прекратите лечение ранее соответствующего указания врача, то ваша болезнь может вновь обостриться.

При возникновении дополнительных вопросов о применении этого препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

### **4. Возможные побочные эффекты**

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым подвержены не все.

**Сразу же** обратитесь к лечащему врачу, если после приема этого лекарства вы заметите у себя какое-либо из перечисленных ниже очень редко встречающихся, но тяжелых побочных эффектов:

- внезапное возникшая одышка, боль в груди, нехватка воздуха или затрудненное дыхание;

- отек век, лица или губ;
- отек языка и горла, который может вызвать серьезное затруднение дыхания;
- тяжелые кожные реакции, в том числе интенсивная кожная сыпь, крапивница, покраснение кожи по всей поверхности тела, сильный зуд, волдыри на коже, отслаивание и отек кожи, воспаление слизистых оболочек (синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз) или другие аллергические реакции;
- инфаркт сердца, нарушения сердечного ритма;
- воспаление поджелудочной железы (панкреатит), которое может вызывать сильную боль в животе и спине, сопровождаемую очень плохим самочувствием.

Сообщалось о следующих **часто встречающихся** побочных эффектах: если какой-либо из этих побочных эффектов беспокоит вас или **длится более одной недели, обратитесь к лечащему врачу**.

**Очень часто:** им может быть подвержено более 1 человека из 10

- отек лодыжек (эдема).

**Часто:** им может быть подвержено до 1 человека из 10

- головная боль, головокружение, сонливость (особенно в начале лечения);
- сердцебиение, румянец кожи;
- боль в животе, тошнота;
- изменения в деятельности кишечника, понос, запор, расстройства пищеварения;
- усталость, слабость;
- нарушения зрения, двоение в глазах;
- мышечные судороги.

Прочие известные побочные эффекты перечислены ниже. Если какой-либо из побочных эффектов становится серьезным, или если вы заметите какой-либо побочный эффект, не указанный в этом информационном листке, сообщите, пожалуйста, об этом лечащему врачу или аптекарю.

**Нечасто:** им может быть подвержено до 1 человека из 100

- нарушения настроения, беспокойство, депрессия, бессонница;
- дрожь, изменения вкусовых ощущений, обморок, слабость;
- онемение или ноющая боль в конечностях, снижение болевой чувствительности;
- звон (гул) в ушах;
- низкое кровяное давление;
- чихание/водянистый насморк, обусловленные воспалением слизистой оболочки носа (ринитом);
- кашель;
- сухость во рту, рвота (плохое самочувствие);
- выпадение волос, повышенная потливость, зуд кожи, красноватые пятна на коже, изменения цвета кожи;
- нарушения мочеиспускания, повышенная потребность в мочеиспускании ночью, учащение мочеиспускания;
- у мужчин: невозможность достичь эрекции, дискомфорт в области грудных желез или их увеличение;
- боль, недомогание;
- боль в суставах или мышцах, боль в спине;
- повышение или понижение веса тела.

**Редко:** им может быть подвержено до 1 человека из 1 000

- спутанность сознания.

**Очень редко:** им может быть подвержено до 1 человека из 10 000

- снижение количества белых кровяных телец в крови, уменьшение количества тромбоцитов, которое может привести к необычным кровоподтекам или с легкостью возникающему кровотечению (повреждение красных кровяных телец);
- повышение содержания сахара в крови (гипергликемия);
- повреждение нервов, которое может вызывать слабость, ноющую боль или чувство онемения;
- отек десен;
- вздутие живота (гастрит);
- нарушения функции печени, воспаление печени (гепатит), пожелтение кожи (желтуха), повышение активности ферментов печени, которое может повлиять на результаты некоторых медицинских исследований;
- повышенное мышечное напряжение;
- воспаление кровеносных сосудов, часто с кожной сыпью;
- чувствительность к свету;
- комбинированные заболевания, сопровождаемые тугоподвижностью, дрожью и/или нарушением движений.

Частота неизвестна: на основании имеющихся данных частоту встречаемости оценить невозможно

- дрожь, жесткое положение тела, лицо напоминает маску, медленные движения и волочение ног при ходьбе, нестабильная походка.

### **Сообщение о побочных эффектах**

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на сайте [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee). Сообщив о них, вы сможете получить больше информации о безопасности препарата.

## **5. Как хранить Хипрес**

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте.

Хранить при температуре не выше 30°C, в оригинальной упаковке в защищенном от влаги и света месте.

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца.

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры способствуют охране окружающей среды.

## **6. Содержимое упаковки и прочая информация**

### **Что содержит Хипрес**

- Действующее вещество: амлодипин. Каждая таблетка содержит 5 мг или 10 мг амлодипина (в виде малеата).
- Прочие вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, прежелатинизированный крахмал, крахмалгликолят натрия, коллоидный безводный диоксид кремния и стеарат магния.

### **Как выглядит Хипрес, и что содержится в упаковке**

В каждой упаковке 30, 60 или 90 таблеток.

**Держатель торговой лицензии и изготовитель**

KRKA, d.d., Novo Mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Словения

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии:

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Тел. 6671658

**Последнее обновление информационного листка датируется февралем 2019 г.**