

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента

Камистад N, 20 мг + 185 мг/г гель для полости рта

Kamistad N, 20 mg + 185 mg/ g suuõõnegeel

Гидрохлорид лидокаина и экстракт цветков ромашки

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, поскольку он содержит необходимую вам информацию. Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке, или так, как вам объяснили врач или аптекарь.

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности.
- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем.
- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном листке. См. раздел 4.
- Если по прошествии 1 недели вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с лечащим врачом.

Содержание информационного листка

1. Что представляет собой препарат Камистад N и для чего он применяется
2. Что следует знать перед применением Камистада N
3. Как применять Камистад N
4. Возможные побочные эффекты
5. Как хранить Камистад N
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. Что представляет собой препарат Камистад N и для чего он применяется

Показания к применению Камистада N:

Обезболивание слизистой оболочки десен и ротовой полости и облегчение симптомов воспаления.

В случае, если симптомы воспаления не отступят за неделю, следует обратиться к врачу.

2. Что следует знать перед применением Камистада N

Не применяйте Камистад N

- если у вас аллергия на лидокаин или другие местные анестетики группы амидов, ромашку или другие растения семейства сложноцветных, корицу, перуанский бальзам или какие-либо компоненты препарата (перечислены в разделе 6).

Предостережения и меры предосторожности

Перед применением Камистада N проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

Следует избегать попадания Камистада N в глаза или на открытые раны. После применения Камистада N следует тщательно вымыть руки.

Дети

В отсутствие достаточных исследований запрещено применять Камистад N у детей младше 12 лет.

Другие лекарственные препараты и Камистад N

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю.

В части указанных в информационном листке дозировок возможные взаимодействия неизвестны.

Беременность и кормление грудью

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

Безопасность применения геля Камистад N в период беременности и грудного вскармливания не доказана. Поэтому применение препарата в эти периоды не рекомендовано.

Вождение автотранспорта и управление механизмами

На сегодняшний день влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами не отмечено.

Камистад N содержит хлорид бензалкония

Это лекарство содержит 1 мг хлорида бензалкония в 1 г геля.
Хлорид бензалкония может вызвать местное раздражение.

3. Как применять Камистад N

Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке, или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены.

Рекомендуемая дозировка:

Взрослые и дети старше 12 лет

Примерно по 0,5-сантиметровой полоске геля три раза в сутки.

Способ приема

Нанести полоску геля на воспаленный участок и втереть легкими движениями.

Длительность применения

Если по прошествии 1 недели вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с лечащим врачом.

Если препарат действует, то длительность его применения принципиально не ограничена.

Если вы забыли применить Камистад N

Продолжайте лечение в соответствии с указаниями. Не применяйте большее количество геля, чем обычно.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы о применении этого препарата, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

4. Возможные побочные эффекты

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым подвержены не все.

Нечасто (им может быть подвержено до 1 человека из 100)

После нанесения геля может возникнуть кратковременное легкое чувство жжения.

Очень редко (им может быть подвержено до 1 человека из 10 000):

Поскольку данный препарат содержит лидокаин, корицу и ромашку, возможно возникновение аллергических реакций (например, контактной аллергии). Такие реакции также могут

развиваться у пациентов, сверхчувствительных к растениям семейства сложноцветных (например, к полыни) и перуанскому бальзаму (риск перекрестной аллергии).

При возникновении сверхчувствительности кожи или слизистых оболочек следует прекратить применение геля Камистад N и проконсультироваться с врачом.

Поскольку Камистад N содержит хлорид бензалкония, в период применения препарата может возникать раздражение кожи.

Сообщение о побочных эффектах

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы сможете получить больше информации о безопасности препарата.

5. Как хранить Камистад N

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте!

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке и тубе. Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца.

Хранить при температуре не выше 25°C. Использовать в течение 12 месяцев после первого вскрытия тубы.

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры способствуют охране окружающей среды.

6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит Камистад N

- Действующие вещества: гидрохлорид лидокаина и экстракт цветков ромашки. 1 г геля содержит 20 мг гидрохлорида лидокаина и 185 мг экстракта цветков ромашки (1:4-5). Экстрагент: 50% (об%) этанол с 1,37% трометамолом (адаптированным к pH 7,3 при помощи 98% муравьиной кислоты).
- Прочие вспомогательные вещества: раствор хлорида бензалкония, этанол 96%, муравьиная кислота, карбомеры, сахарин натрия, трометамол, очищенная вода, масло коры цейлонского коричника.

Как выглядит Камистад N и что содержится в упаковке

Желтовато-коричневый гель.

Гель Камистад N доступен в тубах, содержащих 10 г геля для полости рта.

Держатель торговой лицензии и изготовитель

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

D 61118 Bad Vilbel

Германия

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии.

Almar Sehver
Tartu mnt 16
10117 Tallinn
тел. 6605910
almar@aaa.ee

Последнее обновление информационного листка датируется январем 2020 г.