

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента

Купрум-Хеель
Cuprum-Heel
таблетки

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, поскольку он содержит необходимую вам информацию.

Всегда принимайте это лекарство так, как описано в данном информационном листке или так, как вам объяснили врач или аптекарь.

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности.
- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем.
- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или аптекарем.
- Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном листке. См. раздел 4.
- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с лечащим врачом.

Содержание информационного листка:

1. Что представляет собой препарат Купрум-Хеель и для чего он применяется
2. Что следует знать перед применением препарата Купрум-Хеель
3. Как принимать Купрум-Хеель
4. Возможные побочные эффекты
5. Как хранить Купрум-Хеель
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРЕПАРАТ КУПРУМ-ХЕЕЛЬ И ДЛЯ ЧЕГО ОН ПРИМЕНЯЕТСЯ

Купрум-Хеель – это гомеопатический препарат.

2. ЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА КУПРУМ-ХЕЕЛЬ

Не принимайте Купрум-Хеель, если:

- у вас аллергия или сверхчувствительность к препарату Купрум-Хеель или каким-либо компонентам препарата, перечисленным в разделе 6.
- у вас сверхчувствительность к ромашке или другим растениям семейства сложноцветных.

Другие лекарственные препараты и Купрум-Хеель

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какие-либо иные препараты, в том числе препараты безрецептурного отпуска, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю.

Беременность, кормление грудью и фертильность

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

Влияния не отмечено.

Вождение автотранспорта и управление механизмами

Применение Купрум-Хеель неопасно для вождения автотранспорта или управления механизмами.

Купрум-Хеель содержит лактозу.

Если лечащий врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед применением препарата Купрум-Хеель.

3. КАК ПРИНИМАТЬ КУПРУМ-ХЕЕЛЬ

Всегда принимайте Купрум-Хеель точно так, как вам объяснил врач. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены.

Рекомендуемая дозировка:

Обычная дозировка – 1 таблетка 3 раза в день под язык до полного растворения.

При необходимости сначала можно принимать 1 таблетку каждые 15 минут в течение 2 часов.

Если вам кажется, что Купрум-Хеель оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

Если вы приняли больше Купрум-Хеель, чем предусмотрено

О передозировках не сообщалось

Если вы забыли принять Купрум-Хеель

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием одной дозы был пропущен.

Если вы перестали принимать Купрум-Хеель

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Как и любой другой препарат, Купрум-Хеель может вызывать побочные эффекты, которым подвержены не все.

Препарат содержит компоненты растительного происхождения. В редких случаях могут возникать аллергические реакции.

Сообщение о побочных эффектах

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или аптекарем.

Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы сможете получить больше информации о безопасности препарата.

5. КАК ХРАНИТЬ КУПРУМ-ХЕЕЛЬ

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения.

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте.

Не принимайте Купрум-Хеель по истечении срока годности, указанного на коробке. Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца.

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры способствуют охране окружающей среды.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Что содержит Купрум-Хеель

Действующие вещества: 1 таблетка содержит:

1. Citrullus colocynthis D4 30 мг;
2. Ammonium bromatum D4 30 мг;
3. Atropinum sulfuricum D6 30 мг;
4. Veratrum album D6 30 мг;
5. Magnesium phosphoricum D6 30 мг;
6. Gelsemium sempervirens D6 30 мг;
7. Passiflora incarnata D2 15 мг;
8. Agaricus D4 15 мг;
9. Matricaria recutita D3 15 мг;
10. Cuprum sulfuricum D6 15 мг;
11. Aconitum napellus D6 60 мг.

Вспомогательное вещество: стеарат магния 1,5 мг

Как выглядит Купрум-Хеель и что содержится в упаковке

Картонная коробка, в которой содержится пластмассовая банка с 50 или 250 таблетками.

Описание таблетки: круглая таблетка, белого или желтовато-белого цвета, с гладкой поверхностью, местами видны желто-коричневые пятна. Таблетки толщиной 3,30 - 3,90 мм, диаметром 9,0 - 9,1 мм.

Держатель торговой лицензии и изготовитель

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

DE-76532 Baden-Baden

Германия

Тел. +49 7221 501-00

Факс. +49 7221 501 485

Э-почта: info@heel.de

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии:

Aconit AS

Võru tn 11

13612 Tallinn

Эстония

Тел. +372 - 6328 830

э-почта: info@aconit.ee

Последнее обновление информационного листка датируется июлем 2014 г.