

Информационный листок-вкладыш: информация для пользователя

Септолете плюс мед и лайм, 5 мг/1 мг леденцы Septolete plus honey & lime, 5 mg/1 mg losengid бензокаин/хлорид цетилпиридиния

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, поскольку он содержит необходимую вам информацию.

- Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, или так, как вам объяснили врач или аптекарь.
- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности.
- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем.
- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном листке. См. раздел 4.
- Если по прошествии 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с врачом.

Содержание информационного листка

1. Что представляет собой препарат Септолете плюс мед и лайм и для чего он применяется
2. Что следует знать перед применением леденцов Септолете плюс мед и лайм
3. Как применять Септолете плюс мед и лайм
4. Возможные побочные эффекты
5. Как хранить Септолете плюс мед и лайм
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. Что представляет собой препарат Септолете плюс мед и лайм и для чего он применяется

Леденцы (таблетки для рассасывания) Септолете плюс мед и лайм оказывают местное обезболивающее и противомикробное действие. Они дезинфицируют ротовую полость и горло и локально уменьшают боль.

Содержащееся в таблетках для рассасывания антисептическое средство хлорид цетилпиридиния уничтожает многие бактерии и грибки и в некоторой степени также подавляет развитие вирусов. Таким образом оно смягчает воспаление во рту и горле и, прежде всего, помогает предупредить развитие более серьезного бактериального воспаления. Поскольку хлорид цетилпиридиния легко распределяется и снижает поверхностное натяжение, он проникает в том числе и в труднодоступные участки ротовой полости и слизистой оболочки глотки и подавляет рост бактерий в них.

Бензокаин (действующее вещество Септолете плюс мед и лайм) является местным обезболивающим средством, подходящим для уменьшения боли при глотании, которая часто сопровождается инфекционными и воспалительными процессами в ротовой полости и горле.

Таблетки для рассасывания Септолете плюс мед и лайм содержат полиолы мальтитол и маннитол. Препарат не содержит сахара, который нужен бактериям для роста. Таблетки для рассасывания Септолете плюс мед и лайм подходят для диабетиков, не вызывают кариеса зубов и благодаря бессахарному составу обладают значительно лучшим антисептическим действием.

Таблетки для рассасывания Септолете плюс мед и лайм применяют в качестве дезинфицирующего и обезболивающего средства при воспалительных процессах в ротовой полости и глотке.

2. Что следует знать перед применением леденцов Септолете плюс мед и лайм

Не применяйте Септолете плюс мед и лайм

- если у вас аллергия на бензокаин, хлорид цетилпиридиния или какие-либо компоненты этого препарата (перечислены в разделе б).

Предостережения и меры предосторожности

Перед приемом Септолете плюс мед и лайм проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем:

- если у вас имеются открытые раны в ротовой полости, поскольку хлорид цетилпиридиния замедляет заживление ран.
- если у вас тяжелое инфекционное заболевание с высокой температурой, головной болью и рвотой; обратитесь к лечащему врачу, особенно если симптомы вашей болезни не проходят в течение 3-х дней.
- если у вас сахарный диабет, то вам следует помнить, что каждый леденец содержит приблизительно 1 г мальтитола. Вследствие медленного гидролиза и плохого всасывания в желудочно-кишечном тракте мальтитол оказывает небольшое влияние на уровень сахара в крови.

Не рекомендуется принимать дозы, превышающие рекомендуемые.

Дети и подростки

Леденцы Септолете плюс мед и лайм не рекомендуется давать детям до 6 лет.

Другие лекарственные препараты и Септолете плюс мед и лайм

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какие-либо иные лекарства.

Согласно имеющимся данным, леденцы Септолете плюс мед и лайм не оказывают влияния на действие других лекарственных препаратов.

Сочетание Септолете плюс мед и лайм с пищей и питьем

Не принимайте леденцы Септолете плюс мед и лайм вместе с молоком, так как молоко снижает их эффективность.

Не принимайте леденцы Септолете плюс мед и лайм перед едой или во время еды. Не ешьте и не пейте по меньшей мере один час после принятия леденцов Септолете плюс мед и лайм.

Беременность и кормление грудью

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

Поскольку данные о безопасности препарата в период беременности и грудного вскармливания недостаточны, не рекомендуется применять Септолете плюс мед и лайм в это время.

Вождение автотранспорта и управление механизмами

Септолете плюс мед и лайм не влияет на способность водить автотранспорт и управлять механизмами.

Септолете плюс мед и лайм содержит мальтитол и жидкий мальтитол.

Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, свяжитесь с лечащим врачом перед применением этого препарата.

3. Как применять Септолете плюс мед и лайм

Всегда применяйте это лекарство точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. Если вы в чем-то не уверены, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

Рекомендуемая доза для взрослых составляет до 8 леденцов в день. Растворите во рту по одному леденцу каждые 2...3 часа.

Применение у детей и подростков

Рекомендуемая доза для детей старше 12 лет составляет до 8 леденцов в день. Растворите во рту по одному леденцу каждые 2...3 часа.

Рекомендуемая доза для детей 6...12 лет составляет до 4 леденцов в день. Каждые 4 часа следует растворять во рту один леденец.

Если вы применили больше препарата Септолете плюс мед и лайм, чем предусмотрено

Учитывая содержание действующих веществ в одном леденце, возможность передозировки минимальна. Проглатывание большого количества леденцов может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта, например тошноту, рвоту и понос. В этом случае прекратите принимать препарат, выпейте много воды или молока и проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

Если вы забыли принять Септолете плюс мед и лайм

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен.

Если вы прекратили принимать Септолете плюс мед и лайм

Вы можете прекратить принимать Септолете плюс мед и лайм сразу же как только в нем отпадет необходимость.

При возникновении дополнительных вопросов о приеме препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

4. Возможные побочные эффекты

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым подвержены не все.

Редко (им может быть подвержен 1 человека из 1000):

- нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта.

Очень редко (им может быть подвержен 1 человек из 10 000):

- реакция сверхчувствительности.

Сообщение о побочных эффектах

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на сайте www.ravimiamt.ee. Сообщив о них, вы сможете получить больше информации о безопасности препарата.

5. Как хранить Септолете плюс мед и лайм

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте.

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке после отметки «EXP». Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца.

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от света и влаги месте.

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у аптекаря, как выбрасывать лекарства, которыми вы больше не пользуетесь. Эти меры способствуют охране окружающей среды.

6. Содержимое упаковки и прочая информация

Септолете плюс мед и лайм содержит

- Действующие вещества: бензокаин и хлорид цетилпиридиния. Каждый леденец содержит 5 мг бензокаина и 1 мг хлорида цетилпиридиния.
- Прочие вещества: ароматизатор лайма (натуральный ароматизатор лайма, мальтодекстрин, гуммиарабик (E414)), левоментол, маннитол (E421), коллоидный безводный диоксид кремния, стеарат магния (E572), мальтитол (E965), диоксид титана (E171), краситель хинолиновый желтый (E104), карамельный краситель (E150a), краситель красный очаровательный AC (E129), повидон K25, медовый ароматизатор, мятное эфирное масло, жидкий мальтитол, глицерин (E422), касторовое масло и фармацевтические воски (пчелиный воск (E901), карнаубский воск (E903), шеллак (E904)).

Как выглядит Септолете плюс мед и лайм и что содержится в упаковке

Темно-желтые, круглые, гладкие двояковыпуклые леденцы.

В упаковке 18 леденцов. (2 блистерные упаковки, в каждой по 9 леденцов).

Держатель торговой лицензии и изготовитель

KRKA, d. d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Словения

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии:

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal

Pärnu mnt 141

11317 Tallinn

Тел. 6671658

Последнее обновление информационного листка датируется июлем 2017 г.