

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента

Септолете омни лимон и бузина 3 мг/1 мг леденцы
Septolete omni lemon & elderflower, 3 mg/1 mg losengid
Гидрохлорид бензидамина/хлорид цетилпиридиния

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, поскольку он содержит необходимую вам информацию.

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, или так, как вам объяснили врач или аптекарь.

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности.
- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем.
- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном листке. См. раздел 4.
- Если по прошествии 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, вам следует связаться с врачом.

Содержание информационного листка

1. Что представляет собой препарат Септолете омни лимон и бузина и для чего он применяется
2. Что следует знать перед применением препарата Септолете омни лимон и бузина
3. Как применять Септолете омни лимон и бузина
4. Возможные побочные эффекты
5. Как хранить Септолете омни лимон и бузина
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. Что представляет собой препарат Септолете омни лимон и бузина и для чего он применяется

В качестве действующего вещества Септолете омни лимон и бузина содержит гидрохлорид бензидамина и хлорид цетилпиридиния.

Леденцы Септолете омни лимон и бузина – это препарат противовоспалительного, обезболивающего и антисептического действия для местного применения в ротовой полости. Септолете омни лимон и бузина дезинфицирует полость рта и горло, а также смягчает симптомы воспаления горла, такие как боль, покраснение, припухлость, жжение и нарушение функции глотания.

Септолете омни лимон и бузина применяется для устранения боли в горле, обусловленной легкими инфекциями горла и полости рта (в т.ч. воспалением десен и глотки).

Если по прошествии 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, вам следует связаться с врачом.

2. Что следует знать перед применением препарата Септолете омни лимон и бузина

Не принимайте Септолете омни лимон и бузина:

- если у вас аллергия на гидрохлорид бензидамина, хлорид цетилпиридиния или какие-либо компоненты этого препарата (перечислены в разделе б).
- у детей младше 6 лет.

Предостережения и меры предосторожности

Перед применением Септолете омни лимон и бузина проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

Не принимайте Септолете омни лимон и бузина более 7 дней. Если по истечении 3 дней симптомы заболевания усугубятся или не уменьшатся, или проявятся другие симптомы заболевания, например повысится температура, проконсультируйтесь с врачом.

Применение препаратов местного действия, особенно на протяжении длительного времени, может привести к сенсibilизации, и в этом случае лечение следует прекратить и проконсультироваться с врачом в отношении иного подходящего лечения.

Нельзя применять Септолете омни лимон и бузина в комбинации с анионными соединениями, например с такими, которые содержатся в зубных пастах. Поэтому не рекомендуется употреблять препарат непосредственно до или после чистки зубов.

Будьте осторожны:

- если у вас аллергическая реакция на салицилаты (напр. ацетилсалициловую и салициловую кислоту) или другие противовоспалительные обезболивающие препараты, называемые нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП). Применять этот препарат не рекомендуется;
- если у вас имеется или когда-либо была бронхиальная астма; При применении следует соблюдать осторожность.

Дети и подростки

Препарат Септолете омни лимон и бузина противопоказан детям младше 6 лет.

Другие лекарственные препараты и Септолете омни лимон и бузина

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какие-либо иные лекарства.

Не применяйте Септолете омни лимон и бузина вместе с другими антисептиками.

Взаимодействие Септолете омни лимон и бузина с пищей, питьем и алкоголем

Не принимайте Септолете омни лимон и бузина вместе с молоком, так как молоко снижает эффективность леденцов.

Не принимайте Септолете омни лимон и бузина непосредственно перед или после еды и питья. Пищу и жидкость не следует принимать после приема Септолете омни лимон и бузина как минимум в течение 1 часа.

Беременность и кормление грудью

Если вы беременны, предполагаете, что беременны, кормите грудью либо планируете беременность, то перед применением этого препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

Применять Септолете омни лимон и бузина в период беременности не рекомендуется.

Вы должны проконсультироваться с лечащим врачом, который решит, продолжать ли грудное вскармливание и нужно ли прерывать лечение препаратом Септолете омни лимон и бузина.

Вождение автотранспорта и управление механизмами

Септолете омни лимон и бузина не влияет на вождение автотранспорта и управления механизмами.

Септолете омни лимон и бузина содержит изомальтитол (E953), бутилгидроксианизол (E320) и бензоат натрия (E211)

Если вы узнали от лечащего врача, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, то перед применением данного препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Бутилгидроксианизол может обуславливать местные кожные реакции (напр. контактный дерматит), а также раздражение глаз или слизистых оболочек.

Этот лекарственный препарат содержит до 0,00075 мг бензоата натрия в одном леденце. Может вызвать местное раздражение.

3. Как применять Септолете омни лимон и бузина

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Если вы в чем-то не уверены, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

Взрослые

Рекомендуемая дозировка 3...4 леденца в сутки. Каждые 3...6 часов медленно рассасывайте во рту один леденец.

Дети старше 12 лет

Рекомендуемая дозировка 3...4 леденца в сутки. Каждые 3...6 часов медленно рассасывайте во рту один леденец.

Дети в возрасте от 6 до 12 лет

Рекомендуемая дозировка 3 леденца в сутки. Каждые 3...6 часов медленно рассасывайте во рту один леденец.

Дети младше 6 лет

Детям в возрасте до 6 лет применение Септолете омни лимон и бузина противопоказано.

Не превышайте предусмотренной дозы.

Не принимайте Септолете омни лимон и бузина непосредственно до или после еды. Как минимум в течение 1 часа после приема лекарства не следует принимать пищу и жидкость. Препарат не рекомендуется принимать непосредственно до или сразу же после чистки зубов.

Длительность лечения

Не применяйте этот препарат дольше 7 дней. Если по истечении 3 дней симптомы заболевания усугубятся или не уменьшатся, или проявятся другие симптомы заболевания, например повысится температура, проконсультируйтесь с врачом.

Если симптомы повторяются или вы заметите, что в недавнее время произошли какие-либо изменения в симптомах, проконсультируйтесь с врачом.

Если вы применили больше Септолете омни лимон и бузина, чем предусмотрено

Если вы применили большую дозу Септолете омни лимон и бузина, чем предусмотрено, незамедлительно известите лечащего врача или обратитесь в ближайшую больницу.

Если вы забыли принять Септолете омни лимон и бузина

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен.

При наличии дополнительных вопросов о применении этого препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

4. Возможные побочные эффекты

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым подвержены не все.

Редко (им может быть подвержено до 1 человека из 1000):

- крапивница (уртикария), повышенная чувствительность кожи к солнечному свету (светочувствительность),
- внезапное, неконтролируемое сужение дыхательных путей (бронхоспазм).

Очень редко (им может быть подвержено до 1 человека из 10 000):

- местное раздражение полости рта, чувство жжения во рту.

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно):

- аллергическая реакция (гиперчувствительность): тяжелая аллергическая реакция (анафилактический шок) с такими симптомами, как затруднение дыхания, боль или стеснение в груди и / или головокружение / слабость, сильный кожный зуд или сыпь на коже, отек лица, губ, языка и / или горла, который может быть потенциально опасным для жизни,
- чувство жжения слизистой рта, онемение слизистой рта (анестезия).

Эти побочные симптомы как правило являются преходящими. Если они все же проявятся, рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом или аптекарем.

Соблюдая инструкции, которые приведены в информационном листке, вы снизите риск возникновения побочных эффектов.

Сообщение о побочных эффектах

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы сможете получить больше информации о безопасности препарата.

5. Как хранить Септолете омни лимон и бузина

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте.

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке после отметки «Kõlblik kuni». Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца.

Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от света месте.

Данный лекарственный препарат не требует особой температуры хранения.

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Данные меры содействуют охране окружающей среды.

6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит Септолете омни лимон и бузина

- Действующие вещества: гидрохлорид бензидамина и хлорид цетилпиридиния. В одном леденце содержится 3 мг гидрохлорида бензидамина и 1 мг хлорида цетилпиридиния.
- Прочие компоненты: мятное масло, левоментол, сукралоза (E955), лимонная кислота (E330), изомальтитол (E953), лимонный ароматизатор (содержит бутилгидроксианизол (E320)), ароматизатор бузины, куркумин (E100) (содержит бензоат натрия (E211)), хлорофиллиновые комплексы меди (E141). См. раздел 2 «Септолете омни лимон и бузина содержит изомальтитол (E953), бутилгидроксианизол (E320) и бензоат натрия (E211)».

Как выглядит Септолете омни лимон и бузина что содержится в упаковке

Бледно-зеленые или зеленые круглые леденцы со скошенными краями и шершавой поверхностью. На леденцах могут наблюдаться белые пятна, неравномерная окраска, воздушные пузырьки в массе «твердой конфеты» и небольшие зазубрины на краях. Диаметр леденцов: 18 мм ... 19 мм, толщина: 7 мм ... 8 мм.

Септолете омни лимон и бузина доступны в блистерах по 8, 16, 24, 32 или 40 леденцов, в коробке.

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов.

Держатель торговой лицензии и изготовитель

Держатель торговой лицензии

KRKA, d. d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Словения

Изготовители

KRKA, d. d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Словения

TAD Pharma GmbH
Heinz-Lohmann-Straße 5
27472 Cuxhaven
Германия

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии.

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Тел.: +372 6671658

Последнее обновление информационного листка датируется июлем 2018 г.