

## VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

**KARP**

### 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Actifed 30 mg/1,25 mg/5 ml siirup  
*Pseudoephedrini hydrochloridum/Tripolidini hydrochloridum*

### 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

5 ml siirupit sisaldab 30 mg pseudoefedriinvesinikkloriidi ja 1,25 mg triprolidinvesinikkloriidi.

### 3. ABIAINED

Sisaldab sahharoosi, metüülparahüdroksübensoaati (E218), päikeseloojangukollast FCF (E110) ja naatriumbensoaati (E211).

### 4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Siirup

100 ml

Pakend sisaldab mõõtelusikat.

### 5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.  
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

### 6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

### 7. TEISESED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

ETTEVAATUST! Võib põhjustada unisust. Tuleb hoiduda autojuhtimisest ja masinate käsitlemisest. Ravi ajal vältida alkoholi tarbimist.

### 8. KÕLBLIKUSAEG

Kõlblik kuni:

### 9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

### 10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

**11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

McNeil Healthcare (Ireland) Limited  
Airton Road, Tallaght, Dublin 24, Iirimaa

**12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

Müügiloa nr: 107195

**13. PARTII NUMBER**

Partii nr:

**14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED**

Käsimüügiravim.

**15. KASUTUSJUHEND**

Actifed siirup on näidustatud nina limaskesta turse vähendamiseks nohu korral, sh allergilise nohu korral.

Annustamine:  
täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: 10 ml siirupit iga 4...6 tunni järel kuni 4 korda ööpäevas.

**16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)**

actifed siirup

**17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood**

Ei kohaldata.

**18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED**

Ei kohaldata.

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL  
SISEPAKENDIL**

**PUDELI SILT**

**1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)**

Actifed 30 mg/1,25 mg/5 ml siirup  
*Pseudoephedrini hydrochloridum/Tripolidini hydrochloridum*

Suukaudne.

**2. MANUSTAMISVIIS**

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**3. KÕLBLIKKUSAEG**

Kõlblik kuni:

**4. PARTII NUMBER**

Partii nr:

**5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI**

100 ml

**6. MUU**

5 ml siirupit sisaldab 30 mg pseudoefedriinvesinikkloriidi ja 1,25 mg triproliidiinvesinikkloriidi.  
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.  
Käsimeetiravim.  
Müügiloa nr: 107195

*[McNeil Healthcare (Ireland) Limited logo]*