

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED**Kartongkarp ja etikett (360 ml ja 3 x 360 ml)****1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Altresyn 4 mg/ml suukaudne lahus sigadele
Altrenogest

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab 4 mg altrenogesti.

3. RAVIMVORM

Suukaudne lahus

4. PAKENDI SUURUS

360 ml
3 x 360 ml

5. LOOMALIIGID

Siga (suguküpsed emised).

6. NÄIDUSTUS(ED)**7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)**

Suukaudne.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.
Mitte loksutada enne kasutamist, et vältida ravimi segunemist rõhu all olevasse mahutisse lisatud lämmastikuga.

8. KEELUAEG

Keeluaeg:
Liha ja söödavad koed: 9 päeva

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Ravitud loomade sõnniku laotamisel peab rangelt kinni pidama riiklike või kohalike eeskirjadega määratud minimaalsest kaugusest pinnaveest, sest sõnnik võib sisaldada altrenogesti, mis võib vesikeskkonnale kahjulikult mõjuda.

10. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida otsese päikesevalguse eest kaitstult, temperatuuril mitte üle 50°C. Mitte purustada ega põletada mahutit, isegi mitte pärast tühjaks saamist.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Pole nõutav vahetul sisepakendil.

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED
VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Ceva Santé Animale
10 av. de La Ballastière
33500 Libourne
Prantsusmaa

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 1527

17. TOOTJAPPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Mahuti 540 ml ja 1080 ml

[Etikett ilma välise pappkarbi ja pakendi infolehta]

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Altresyn 4 mg/ml suukaudne lahus sigadele
Altrenogest

2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml sisaldab 4 mg altrenogesti, 0,07 mg butüülhüdrosüanisool (E320) ja 0,07 mg butüülhüdrosütolueen (E321).
Selge, kahvatukollane, lõhnatu lahus.

3. RAVIMVORM

Suukaudne lahus.

4. PAKENDI SUURUS

540 ml
1080 ml

5. LOOMALIIGID

Siga (suguküpsed emised).

6. NÄIDUSTUS(ED)

Östruse sünkroniseerimiseks suguküpsedel emistel.

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Manustamisviis ja meetod

Suukaudne manustamine söödale lisatuna.

20 mg altrenogesti looma kohta, s.o 5 ml looma kohta üks kord päevas, 18 järjestikusel päeval.

Nõuanded korrektse manustamise kohta

Ravimit tohib manustada ainult Altresyn'i annustajaga.

Annustaja ettevalmistamine:

- Pange pudel horisontaalsesse asendisse nii, et annustaja otsik on suunatud ülespoole.
- Vajutage aeglaselt nupule, kuni otsiku tippu tekib tilk.

Seejärel väljastab annustaja iga täieliku nupulevajutusega 5 ml annuse. Regulaarseks manustamiseks hoidke viaali vertikaalselt tagurpidi.

Annustaja peab pudeli külge jääma kogu kasutusajaks. Kasutusperioodide vahel säilitamiseks tuleb kasutada lukustussüsteemi.

Loomad tuleb eraldada ja annustada individuaalselt.

Ravim tuleb lisada sööda pinnale mõõtepumba vahendusel vahetult enne loomade söötmist.

Tagada, et manustataks korrektne päevane annus, sest alaannustamine võib põhjustada munasarja tsüstide moodustumist.

8. KEELUAEG

Keeluaeg:

Lihale ja söödavatele kudedele: 9 päeva.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Ravitud loomade sõnniku laotamisel peab rangelt kinni pidama riiklike või kohalike eeskirjadega määratud minimaalsest kaugusest pinnaveest, sest sõnnik võib sisaldada altrenogesti, mis võib vesikeskkonnale kahjulikult mõjuda.

Vastunäidustused

Mitte manustada emakapõletikuga loomadele.

Mitte manustada isasloomadele.

Vt lõik „Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil“.

Kõrvaltoimed

Ei ole teada.

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti.

Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Lisada veterinaarravim söödale vahetult enne söötmist. Hävitada söömata jäänud sööt.

Kasutada ainult suguküpsel emistel, kellel on üks östrus juba olnud.

Osaliselt tarbitud sööt tuleb ohutult ära visata ja mitte anda teistele loomadele.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomade manustavale isikule

Hoiduda ravimi otsesest kokkupuutest nahaga. Preparaati käsitsedes tuleb kanda personaalset kaitseriietust (kindad ja üleriietus).

Poorsed kindad võivad ravimit nahani läbi lasta. Kui ravim puutub kinda all nahaga kokku, võivad oklusiivsed materjalid, nagu lateks- või kummikindad, suurendada ravimi transkutaanset imendumist.

Juhuslikul silma või nahale sattumisel loputada koheselt rohke veega.

Pesta käsi pärast selle preparaadiga ravi läbiviimist ja enne söögikordi.

Rasedad ja fertiilses eas naised peavad hoiduma kokkupuutest selle ravimiga või olema ravimi käsitlemisel äärmiselt ettevaatlikud.

Inimesed, kellel esineb progesteron-sõltuvaid kasvajaid (teadaolevaid või eeldatavaid) või trombemboolilisi häireid, ei tohi ravimit käsitseda.

Ravimiga kokkupuutumisel tekkiv toime: juhuslik imendumine võib viia menstruatsioonitsükli katkemiseni, emaka või alakõhu krampideni, emakaverejooksu suurenemise või vähenemiseni, raseduse pikenemiseni või peavaludeni. Hoiduda ravimi otsesest kokkupuutest nahaga. Ravimiga kokkupuutumisel pöörduda abi saamiseks arsti poole.

Tiinus ja laktatsioon

Mitte kasutada tiinetel ja lakteerivatel loomadel.

Koostoimed, üleannustamine, sobimatus

Ei ole teada.

10. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Pärast esmast avamist kasutada 2 kuud kuni ...

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Altresyn ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele. Kasutamata jäänud veterinaarravim või selle jäätmel tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Ceva Santé Animale
10 av. de La Ballastière
33500 Libourne
Prantsusmaa

Partii vabastamise eest vastutav tootja:

Ceva Santé Animale
Z.I. Très le Bois
22603 Loudéac
Prantsusmaa

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 1527

17. TOOTJAPPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

Lisainfo

Pakendi suurus:

Pappkarp ühe 360 ml mahutiga.
Pappkarp kolme 360 ml mahutiga.
540 ml mahuti.
1080 ml mahuti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Pakendi infolehe viimase koostöölastamise kuupäev 04/2019