

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Septolete omni 1,5 mg/5 mg/ml suuõõnesprei, lahus
benzýdamini hydrochloridum/cetylpyridinii chloridum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks ml suuõõnesprei lahust sisaldab 1,5 mg bensüdamiinvesinikkloriidi ja 5 mg tsetüülpüridiinkloriidi.

Üks pihustus sisaldab 0,1 ml suuõõnesprei lahust, milles on 0,15 mg bensüdamiinvesinikkloriidi ja 0,5 mg tsetüülpüridiinkloriidi.

3. ABIAINED

Abiained: 96% etanool, glütserool (E422), makrogoolglütseroolhüdrosüstearaat, naatriumsahhariin (E954), piparmündiõli ja puhastatud vesi.
Lisainfo saamiseks vt pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Suuõõnesprei, lahus

30 ml suuõõnesprei lahust

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Kasutamisyjuhend



Enne kasutamist eemaldage plastkork.



Avage oma suu, suunake spreid otsik neelu poole ja vajutage pihustipead 1...2 korda. Pihustamise ajal hoidke hinge kinni.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.
Orofarüngeaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Pärast pakendi esmakordset avamist võib ravimit kasutada 12 kuu jooksul, hoides seda temperatuuril kuni 25°C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER

Müügiloa nr: 884615

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Käsimüügiravim.

15. KASUTUSJUHEND

Septolete omni't kasutatakse põletikuvastaseks, valuvaigistavaks ja antiseptiliseks raviks:

- neelu, suuõõne ja igemete ärrituse korral,
- igeme- ja neelupõletiku korral ning
- enne ja pärast hamba eemaldamist.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid

Ühekordse annuse manustamiseks tuleb pihustit vajutada **üks kuni kaks korda**. Seda võib korrata iga 2 tunni järel, 3...5 korda päevas.

Lapsed vanuses 6 kuni 12 aastat

Ühekordse annuse manustamiseks tuleb pihustit vajutada **üks kord**. Seda võib korrata iga 2 tunni järel, 3...5 korda päevas.

16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Septolete omni 1,5 mg/5 mg/ml

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötкод

Ei kohaldata.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

Ei kohaldata.

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL
SISEPAKENDIL**

PUDELI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Septolete omni 1,5 mg/5 mg/ml suuõõnesprei, lahus

Mitmekeelsel pakendil:

Septolete omni 1,5 mg/5 mg/ml suuõõnesprei

benzydameni hydrochloridum/cetylpyridinii chloridum

Orofariingeaalne

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

30 ml suuõõnesprei lahust

Mitmekeelsel pakendil:

30 ml suuõõnespreid

6. MUU

KRKA