

**VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED**

Kartongkarp

**1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Spasmiium comp. 500 mg/ml + 4 mg/ml süstelahus

**2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS**

1 ml sisaldab

Naatriummetamisoolmonohüdraat (vastab 443 mg metamisoolile)	500,0 mg
--	----------

Hüostsiinbutüülbromiid (vastab 2,76 mg hüostsiinile)	4,0 mg
---	--------

**3. RAVIMVORM**

Süstelahus

**4. PAKENDI SUURUS(ED)**

100 ml

5 × 100 ml

**5. LOOMALIIGID**

Hobune, veis, siga, koer.

**6. NÄIDUSTUS(ED)****7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)**

Intravenoosne või intramuskulaarne.  
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**8. KEELUAEG**

Keeluaeg

Lihale ja söödavatele kudedele

Hobune, veis (i.v.): 12 päeva.

Siga (i.m.): 15 päeva.

Piimale

Veis (i.v.): 96 tundi.

Ei ole lubatud kasutamiseks märadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

**9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK**

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**10. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP

Pärast esmast avamist kasutada kuni 28 päeva.

**11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Pärast vahetu pakendi esmakordset avamist hoida temperatuuril kuni 25 °C.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD  
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI  
PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON  
KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

**14. MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

**15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADDRESS**

Richter Pharma AG, Wels, Austria

**16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

Müügiloa nr: 1932

**17. TOOTJAPPOOLNE PARTII NUMBER**

Lot

**SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED**

100 ml II tüüpi merevaikkollasest klaasist vialal bromobutüülkummist korgi ja alumiiniumkattega

**1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Spasmiium comp. 500 mg/ml + 4 mg/ml süstelahus

**2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS**

Naatriummetamisoolmonohüdraat	500,0 mg/ml
Hüostsiinbutüülbromiid	4,0 mg/ml

**3. RAVIMVORM**

Süstelahus

**4. PAKENDI SUURUS(ED)**

100 ml

**5. LOOMALIIGID**

Hobune, veis, siga, koer.

**6. NÄIDUSTUS(ED)****7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)**

Intravenoosne või intramuskulaarne.  
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**8. KEELUAEG**

Keeluaeg  
Lihale ja söödavatele kudedele  
Hobune, veis (i.v.): 12 päeva.  
Siga (i.m.): 15 päeva.

Piimale  
Veis (i.v.): 96 tundi.

Ei ole lubatud kasutamiseks märadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

**9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK**

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**10. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP  
Pärast pakendi avamist kasutada kuni ...

**11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Pärast esmakordset avamist hoida temperatuuril kuni 25 °C.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD  
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI  
PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON  
KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

**14. MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

**15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Richter Pharma AG, Wels, Austria

**16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

Müügiloa nr: 1932

**17. TOOTJAPOLNE PARTII NUMBER**

Lot