

## VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

**Karp**  
**Spreikonteiner**

### 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Animedazon, 2,45% w/w nahasprei, suspensioon veistele, lammastele ja sigadele  
Kloortetratsükliinvesinikkloriid

### 2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Üks spreikonteiner sisaldab:

**Toimeaine:**

Kloortetratsükliinvesinikkloriid 3,210 g (vastab 2,45% w/w)  
(vastab 2,983 g kloortetratsükliinile)

**Abiained:**

Patentsinine V 85% (E131) 0,23 g  
Isobutaan (propellent) 92,2 g

### 3. RAVIMVORM

Nahasprei, suspensioon

### 4. PAKENDI SUURUS

211 ml  
12 x211 ml

### 5. LOOMALIIGID

Veis, lammas, siga.

### 6. NÄIDUSTUS(ED)

### 7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Kasutamiseks nahal.

Mahutit tuleb hoida ligikaudu 15...20 cm kaugusel pihustatavast piirkonnast; pihustage 3 sekundit, kuni ravitav ala on ühtlaselt värviga kaetud.

**Sõrainfektsioonid:** 30 sekundi möödudes korrake protseduuri.

**Sõramädanik ja varvastevahenaha põletik:** 2 pihustamist 30 sekundiliste vahedega, üks või kaks korda päevas. Sõltuvalt vigastuse tõsidusest ja paranemismäärast tuleb ravi korrata 1...3 päeva möödumisel.

**Pindmised haavad:** ühekordne manustamine, kui haavad on saastunud kloortetratsükliinile tundlike mikroorganismidega.

**Digitaalne dermatiit:** kaks pihustamist 30 sekundiliste vahedega 3 järjestikusel päeval, üks või kaks korda päevas.

Enne pihustamist tuleb mahutit hoolega raputada.

## **8. KEELUAEG**

Lihale ja söödavatele kudedele, piimale : 0 päeva.  
Ei ole lubatud kasutada lakteerivate loomade udaratel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

## **9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK**

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

See ravim võib põhjustada tõsist silmaärritust. Kaitske silmi ja nägu. Kasutage mitteläbilaskvaid kaitsekindaid.

Vältige pihustatava ravimi aurude sissehingamist. Manustage ravimit ainult õues või hästi ventileeritud ruumis. Juhuslikul ravimi silma sattumisel või allaneelamisel pöörduge viivitamatult arsti poole ja näidake talle käesolevat mahutit.

Eriti tuleohtlik aerosool. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.

Kaitsta otsese päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C.

Hoida eemal soojusallikatest / kuumadest pindadest / sädemetest / lahtisest tulest ja teistest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

Mitte pihustada lahtise tule ega muu süüteallika suunas.

Mitte purustada ega põletada mahutit isegi pärast kasutamist.

## **10. KÕLBLIKKUSAEG**

Kõlblik kuni:

## **11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.  
 Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas.

## **12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

## **13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

## **14. MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Oht!



Tähis „Eriti tuleohtlik”.

**15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADDRESS**

aniMedica GmbH  
Im Südfeld 9  
48308 Senden-Bösensell  
Saksamaa

**16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

Müügiloa nr: 1913

**17. TOOTJAPOLNE PARTII NUMBER**

Partii nr: