

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ACC Long 600 mg suukaudne pulber kotikeses
Acetylcysteinum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kotike sisaldab 600 mg atsetüülsüsteiini.

3 ABIAINED

Sisaldab aspartaami, sorbitooli, ksülitooli.
Lisainformatsiooni lugege pakendi infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Suukaudne pulber

8 kotikest
10 kotikest
14 kotikest
20 kotikest
30 kotikest
60 kotikest
90 kotikest

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne
Mitte närida.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

**10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST
TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE**

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sandoz d.d.
Verovškova 57
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 945117

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Käsimüügiravim.

15. KASUTUSJUHEND

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Kasutatakse täiskasvanutel **rõga lahtistamiseks** ja **väljakõhimise kergendamiseks** hingamisteede haiguste korral, millega kaasneb **viskoosne lima**.

Mitte kasutada alla 2-aastastel lastel.

Soovitav annus on 1 kotike ööpäevas, kui arst ei ole määranud teisiti.

Annustamine:

ACC Long suukaudne pulber tuleb asetada otse keelele. Pulber stimuleerib süljeeritust, seetõttu on seda kerge neelata.

Suukaudset pulbrit enne neelamist mitte närida. Võib võtta ilma veeta.

16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

acc long 600 mg pulber

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötкод

Lisatud on 2D-vöötкод, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:
SN:
NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA SISEPAKENDIL

Kotike

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

ACC Long 600 mg suukaudne pulber kotikeses
Acetylcysteinum
Suukaudne.

2. MANUSTAMISVIIS

Mitte närida.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1,6 g

6. MUU

Täiskasvanutele.
Mitte kasutada alla 2 aastastel lastel.