

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp

1. VETERINAARPREPARAADI NIMETUS

Advantix täpilahus koertele kuni 4 kg
Advantix täpilahus koertele üle 4 kg kuni 10 kg
Advantix täpilahus koertele üle 10 kg kuni 25 kg
Advantix täpilahus koertele üle 25 kg kuni 40 kg
Advantix täpilahus koertele üle 40 kg kuni 60 kg
Imidaclopridum/Permethrinum

2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Üks 0,4 ml pipett sisaldab:
40 mg imidaklopriidi ja 200 mg permetriini.
Üks 1,0 ml pipett sisaldab:
100 mg imidaklopriidi ja 500 mg permetriini.
Üks 2,5 ml pipett sisaldab:
250 mg imidaklopriidi ja 1250 mg permetriini.
Üks 4,0 ml pipett sisaldab:
400 mg imidaklopriidi ja 2000 mg permetriini.
Üks 6,0 ml pipett sisaldab:
600 mg imidaklopriidi ja 3000 mg permetriini.

3. RAVIMVORM

Täpilahus.

4. PAKENDI SUURUS(ED)

1 pipett	(1x 0,4 ml, 1x 1,0ml, 1x 2,5 ml, 1x 4,0ml, 1x 6,0ml)
2 pipetti	(2x 0,4 ml, 2x 1,0ml, 2x 2,5 ml, 2x 4,0ml, 2x 6,0ml)
3 pipetti	(3x 0,4 ml, 3x 1,0ml, 3x 2,5 ml, 3x 4,0ml, 3x 6,0ml)
4 pipetti	(4x 0,4 ml, 4x 1,0ml, 4x 2,5 ml, 4x 4,0ml, 4x 6,0ml)
6 pipetti	(6x 0,4 ml, 6x 1,0ml, 6x 2,5 ml, 6x 4,0ml, 6x 6,0ml)

5. LOOMALIIGID

Koer.

6. NÄIDUSTUS(ED)

[Karbile: tekst esiküljele (ainult) karbil]

- Kirbunakkuse raviks ning profülaktikaks; koeraväivi ja puuginakkuse raviks.
- Peletab puugid, pistesääsed, moskiitod ja pistekärbsed.

[Karbile: tekst tagaküljele (ainult) karbil]

- Kirbunakkuse raviks ning profülaktikaks; võib kasutada kirpudest tingitud allergilise dermatiidi (FAD) vastase ravistrateegia osana.
- Hävitab koeraväivid.

- Koeraväivi ja puuginakkuse raviks. Peletava ja surmava toime tõttu vähendab koerte vektorite poolt siirutatud haiguste (nt borrelioos, riketsioos ja erlihhoos) edasikandumise ohtu.
- Peletab pistesäased ja moskiitod; vähendades koerte vektorite poolt siirutatud haiguste nagu leišmanioos, edasikandumise ohtu.
- Peletab pistekärbsed; aidates ära hoida kärbseshammustustest põhjustatud dermatiiti.

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.


Hoida fooliumpakend blisteritega välispakendis.



0,4 ml



1,0 ml



2,5 ml



4,0 ml



6,0 ml

8. KEELUAEG

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Mitte kasutada alla 7 nädala vanustel või alla 1,5 kg kaaluvatel kutsikatel.

Mitte kasutada alla 7 nädala vanustel või alla 4 kg kaaluvatel kutsikatel.

Mitte kasutada alla 7 nädala vanustel või alla 10 kg kaaluvatel kutsikatel.

Mitte kasutada alla 7 nädala vanustel või alla 25 kg kaaluvatel kutsikatel.

Mitte kasutada alla 7 nädala vanustel või alla 40 kg kaaluvatel kutsikatel.

Mitte manustada kassidele.



10. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kasutada 24 kuu jooksul pärast fooliumpakendi avamist või enne EXP lõppu kui see on lühem). (0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml, 4,0 ml)

Kasutada 12 kuu jooksul pärast fooliumpakendi avamist või enne EXP lõppu kui see on lühem). (6,0 ml)

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Mitte lasta külmuda.

Pärast fooliumpakendi avamist hoida kuivas kohas temperatuuril kuni 30 °C.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE "AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS" NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.
Käsimüügiravim.

14. MÄRGE "HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS"

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügi loa hoidja:
Bayer Animal Health GmbH
51368 Leverkusen
Saksamaa

Tootja:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324, 24106, Kiel
Saksamaa

16. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EE 1173
EE 2084

17. TOOTJAPPOOLNE PARTII NUMBER

Lot



[Pipeti kujutis, koera foto, Bayer logo ja rist]

Lisainfo:

- Toime säilib kui koer saab märjaks.
- Omab larvitsiidset toimet ravitud koerte vahetus ümbruses olevatesse kirpudesse.
- Lubatud kasutada nii tiinetel kui imetavatel koertel.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Pipeti etikett

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Advantix

2. TOIMEAINE(TE) KOGUS

100 mg/ml imidaclopridum, 500 mg/ml permethinum

3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

0,4 ml
1,0 ml
2,5 ml
4,0 ml
6,0 ml

4. MANUSTAMISVIIS(ID)

5. KEELUAEG

6. PARTII NUMBER

Lot:

7. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

8. MÄRGE“AINULTVETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”



≤4 kg



>4 kg ≤ 10 kg



>10 kg ≤ 25 kg



>25 kg ≤ 40 kg



>40 kg ≤ 60 kg



MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blisterpakend

1. VETERINAARPREPARAADI NIMETUS

Advantix

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI



3. KÕLBLIKKUSAEG

4. PARTII NUBER

5. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”



0.4 ml
≤4 kg



1.0 ml
>4 kg ≤ 10 kg



2.5 ml
>10 kg ≤ 25 kg



4.0 ml
>25 kg ≤ 40 kg



6.0 ml
>40 kg ≤ 60 kg



MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Fooliumkotike

1. VETERINAARPREPARAADI NIMETUS

Advantix

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI



3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUBER

Lot

5. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”



$\leq 4 \text{ kg}$
0,4 ml



$>4 \text{ kg} \leq 10 \text{ kg}$
1,0 ml



$>10 \text{ kg} \leq 25 \text{ kg}$
2,5 ml



$>25 \text{ kg} \leq 40 \text{ kg}$
4,0 ml



$>40 \text{ kg} \leq 60 \text{ kg}$
6,0 ml



6. MUU



0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml, 4,0 ml

Kasutada 24 kuu jooksul pärast fooliumpakendi avamist või enne EXP lõppu kui see on lühem.

6,0 ml

Kasutada 12 kuu jooksul pärast fooliumpakendi avamist või enne EXP lõppu kui see on lühem).