

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Voltaren Emulgel 11,6 mg/g geel
Diclofenacum diethylaminum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 g geeli sisaldab 11,6 mg diklofenakdietüülamiini, mis vastab 10 mg diklofenaknaatriumile.

3. ABIAINED

Abiained: *Carbomera, Macrogoli aether cetostearylicus, Cocoylis caprylocapras, Diethylaminum, Alcohol isopropylicus, Propylenglycolum, Paraffinum liquidum, Aroma 45 (cum benzylis benzoas), Aqua purificata.*

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Geel

20 g geeli
50 g geeli
75 g geeli
100 g geeli
150 g geeli

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Kutaanne.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Ärge kasutage seda ravimit, kui teil on esinenud allergiline reaktsioon pärast diklofenaki või mõne teise valu ja põletikku leevendava ravimi kasutamist nagu ibuprofeen või atsetüülsalitsüülhape.

8. KÕLBLIKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTTEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE**11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited
Knockbrack
Dungarvan
Co Waterford
Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 061794

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Käsimüügiravim.

15. KASUTUSJUHEND

Valu paikne leevendamine pehmete kudede valulike ja põletikuliste seisundite korral.
Täiskasvanud ja üle 14-aastased lapsed: hõõruda geeli 3...4 korda päevas valutavale kohale.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

voltaren emulgel 11,6 mg/g

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Ei kohaldata.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

Ei kohaldata.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Tuub

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Voltaren Emulgel 11,6 mg/g geel
Diclofenacum diethylaminum
Kutaanne

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

20 g geeli
50 g geeli
75 g geeli
100 g geeli
150 g geeli

6. MUU

Valu paikne leevendamine pehmete kudede valulike ja põletikuliste seisundite korral.
1 g geeli sisaldab 11,6 mg diklofenakdietüülamiini, mis vastab 10 mg diklofenaknaatriumile.
GlaxoSmithKline Dungarvan Limited
Knockbrack
Dungarvan
Co Waterford
Iirimaa

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Voltaren Emulgel 11,6 mg/g geel
Diclofenacum diethylaminum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 g geeli sisaldab 11,6 mg diklofenakdietüülamiini, mis vastab 10 mg diklofenaknaatriumile.

3. ABIAINED

Abiained: *Carbomera, Macrogoli aether cetostearylicus, Cocoylis caprylocapras, Diethylaminum, Alcohol isopropylicus, Propylenglycolum, Paraffinum liquidum, Aroma 45 (cum benzylis benzoas), Aqua purificata.*

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Geel

50 ml geeli

75 ml geeli

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Kutaanne.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Ärge kasutage seda ravimit, kui teil on esinenud allergiline reaktsioon pärast diklofenaki või mõne teise valu ja põletikku leevendava ravimi kasutamist nagu ibuprofeen või atsetüülsalitsüülhape.

8. KÕLBLIKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C. Konteiner on rõhu all, hoida otsese päikese kiirguse eest kaitstult, pärast kasutamist mitte avada või põletada.

**10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST
TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE**

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADDRESS

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited
Knockbrack
Dungarvan
Co Waterford
Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 061794

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Käsimüügiravim.

15. KASUTUSJUHEND

Valu paikne leevendamine pehmete kudede valulike ja põletikuliste seisundite korral.
Täiskasvanud ja üle 14-aastased lapsed: hõõruda geeli 3...4 korda päevas valutavale kohale.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

voltaren emulgel

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Ei kohaldata.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

Ei kohaldata.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Rõhukonteiner

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Voltaren Emulgel 11,6 mg/g geel
Diclofenacum diethylaminum
Kutaanne

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

50 ml geeli
75 ml geeli

6. MUU

Valu paikne leevendamine pehmete kudede valulike ja põletikuliste seisundite korral.
1 g geeli sisaldab 11,6 mg (1,16%) diklofenakdietüülamiini, mis vastab 10 mg diklofenaknaatriumile.
GlaxoSmithKline Dungarvan Limited
Knockbrack
Dungarvan
Co Waterford
Iirimaa