

## VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pappkarp 24 süstlaga  
Pappkarp 60 süstlaga  
Pappkarp 120 süstlaga  
Pappkarp 24 süstlaga + 24 puhastuslapiga  
Pappkarp 60 süstlaga + 60 puhastuslapiga  
Pappkarp 120 süstlaga + 120 puhastuslapiga

### 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

FATROSEAL 2,6 g intramammaarsuspensioon kinnislehmadele  
Raske vismutsubnitraat

### 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 4 g intramammaarsüstal sisaldab:  
**Toimeaine:** Raske vismutsubnitraat 2,6 g (vastab 1,858 g raskele vismutile).

### 3. RAVIMVORM

Intramammaarsuspensioon

### 4. PAKENDI SUURUS(ED)

24 x 4 g  
60 x 4 g  
120 x 4 g

### 5. LOOMALIIGID

Veis (piimalehm kinnijätmisel).

### 6. NÄIDUSTUS(ED)

Uute intramammaarsete infektsioonide vältimine kinnisperioodil. Lehmadele, kellel teadaolevalt ei ole udaranakkust, võib mastiidi ärahoidmiseks kinnijätmisel manustada ainult vismutsubnitraati.

### 7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intramammaarne.  
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Manustada ühe intramammaarsüstla sisu iga udaraveerandi nisajuhasse kohe pärast laktatsiooniperioodi viimast lüpsi (kinnijätmisel). Mitte masseerida nisa või udarat pärast ravimi manustamist, sest on oluline, et kaitsekork jääks niasse ja ei satuks udarasse.

Manustamisjärgse mastiidi riski vähendamiseks tuleb vältida udarapatogeenide sattumist niasse ravimi manustamise ajal.

Jahedates tingimustes võib lasta ravimil soojeneda toatemperatuurini, et soodustada manustatavust.

### 8. KEELUAEG

Keeluaeg:

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.

Piimale: 0 tundi.

## **9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK**

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Mitte kasutada seda ravimit ainsa ravimina lehmadel, kellel on kinnijätmisel diagnoositud subkliiniline mastiit (lisateabe saamiseks vt pakendi infolehe lõiku „Erihoiatused”).

Mitte kasutada lehmadel, kellel on kinnisperioodi algul kliiniline mastiit. Mitte kasutada lakteerivatel lehmadel. Pärast ravimi manustamist ei tohi lehmale manustada teisi intramammaarseid ravimeid. Lehmadel, kellel võib esineda subkliiniline mastiit, võib ravimit kasutada pärast sobiva kinnisperioodi antibiootikumi manustamist nakatunud udaraveerandisse.

Saastumise riski vähendamiseks mitte kasta intramammaarsüstalt vette.

Süstal on ühekordseks kasutamiseks.

Vismutisoolad on seotud ülitundlikkusreaktsioonidega.

Inimesed, kellel on teadaolev ülitundlikkus (allergia) vismutisoolade suhtes, peaksid vältima kokkupuudet veterinaarravimiga.

Ravim võib põhjustada naha ja silmade ärritust. Vältida ravimi sattumist nahale ja silma.

Silma või nahale sattumisel pesta ravimiga kokkupuutunud piirkonda põhjalikult veega.

Ärrituse püsimisel pöörduda arsti poole ja näidata pakendi infolehte.

Kaasasolevad puhastuslapid võivad põhjustada mõnel inimesel naha ja silmade ärritust isopropüülalkoholi ja kloorheksidiini diglükonaadi sisalduse tõttu. Vältida nahale või silma sattumist.

Pärast kasutamist pesta käed.

## **10. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP

## **11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

## **12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

## **13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Käsimüügiravim.

## **14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

## **15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

LABORATORIOS SUPPORT PHARMA S.L.

General Álvarez de Castro, 39 - 28010 Madrid, Hispaania

**16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

Müügiloa nr: 2353

**17. TOOTJAPOLNE PARTII NUMBER**

Lot:

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL  
SISEPAKENDIL**

**4 g intramammaarsüstla silt**

**1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

FATROSEAL 2,6 g intramammaarsuspensioon kinnislehmadele  
Raske vismutsubnitraat

**2. TOIMEAINE(TE) KOGUS**

Raske vismutsubnitraat 2,6 g

**3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI**

4 g

**4. MANUSTAMISVIIS(ID)**

Intramammaarne

**5. KEELUAEG**

Keeluaeg:

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.

Piimale: 0 tundi.

**6. PARTII NUMBER**

Lot:

**7. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP:

**8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.