

## PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

### Pakendi infoleht: teave kasutajale

#### Otomize

Deksametasoon + neomütsiin + jää-äädikhape, 0,1%+0,5%+2%, kõrvasprei

**Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.**

**Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

#### Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Otomize ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Otomize kasutamist
3. Kuidas Otomizet kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Otomizet säilitada
6. Muu teave

#### 1. Mis ravim on Otomize ja milleks seda kasutatakse

Otomize sisaldab toimeainetena deksametasooni, neomütsiini ja jää-äädikhapet. Deksametasoon on paikselts kasutatav kortikosteroid (hormoon), mida kasutatakse põletikuliste protsesside pärssimiseks. Neomütsiin on laua toimespektriga antibiootikum (bakterite vastane aine). Jää-äädikhape on antibakteriaalse toimega aine, mis aitab piirkonda desinfitseerida. Otomizet kasutatakse kõrva väliskuumekäigu põletikuliste haiguste raviks.

#### 2. Mida on vaja teada enne otomize kasutamist

##### Ärge kasutage Otomizet:

- kui olete deksametasooni, neomütsiini või jää-äädikhappe või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline
- kusagil mujal kui kõrvas, st ärge manustage seda ravimit suhu või ninna, vältige selle ravimi sattumist silma.
- kui teil on kõrva trummikile perforatsioon (trummikile katki) või trummikile šunteeritud
- alla 2-aastastel lastel

#### Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Otomize kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

- kui teil on kõrva vigastus. Selle ravimi kasutamine (eriti suurtes kogustes ja pikaajaliselt) vigastatud nahaga kõrvas võib põhjustada kuulumise kaotust. Eriti oluline on seda silmas pidada laste puhul.
- seda ravimit ei tohi alla neelata. Kui keegi (eriti laps) on seda ravimit alla neelanud, siis pöörduge koheselt arsti poole.

#### Lapsed ja noorukid

Seda ravimit ei tohi kasutada alla 2-aastastel lastel.  
Suuremate laste puhul on selle ravimi kasutamisel vajalik eriline ettevaatus.

### **Muud ravimid ja Otomize**

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Koostoimetest teiste ravimitega ei ole teatatud.

### **Rasedus, imetamine ja viljakus**

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Selle ravimi täpne toime kasutatuna raseduse ja imetamise ajal ei ole teada.

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Ei ole teada, et selle ravimi kasutamine mõjutaks auto juhtimise või masinatega töötamise võimet.

## **3. Kuidas Otomizet kasutada**

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimi esmakordsel kasutamisel:

Loksutage pudelit enne ravimi kasutamist

Teadke, et enne esmakorset kasutamist peate tõenäoliselt vajutama pumbale mitu korda enne, kui sellest ravimit pihustub.

Enne pumbale vajutamist veenduge, et pihusti otsik ei oleks suunatud teie või kellegi teise suunas.

Ravimi pideval kasutamisel pihustub igal pumable vajutusel pudelist üks annus ravimit.

Kui te pole ravimit rohkem kui nädala jooksul kasutanud, tuleb teil tõenäoliselt jälle mitu korda pumbale vajutada enne, kui sellest ravimit pihustub.

Otomize on ainult välispidiseks kasutamiseks.

Ravimi kasutamine täiskasvanul ja üle 2-aastaselt lapsel:

Ravimit manustama asudes loksutage esmalt pudelit.

Asetage pihusti otsik õrnalt haige kõrva väliskõlmele juurde.

Vajutage pumbale ja pihustage üks annus ravimit väliskõlmele.

Annustamine:

Tavaline annus on: 1 annus (1 vajutus pumbale) 3 korda päevas.

Kasutage Otomizet seni, kuni 2 päeva on möödunud haiguse sümptomite kadumisest.

Kui teie haigus pole paranenud või on süvenenud pärast 7 päevast ravimi kasutamist, lõpetage ravimi kasutamine ja pöörduge arsti poole k.

Ärge ületage soovitatavat annust.

### **Kui te kasutate Otomizet rohkem kui ette nähtud**

Pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda, kui teie või keegi teine on manustanud liiga suure annuse või võtnud suu kaudu seda ravimit. Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa selle ravimi pakend.

## **Kui te unustate Otomizet kasutada**

Kasutage unustatud annus niipea kui võimalik ja jätkake seejärel ravimi kasutamist tavapärasel viisil. Kui on juba peaaegu aeg kasutada järgmine annus, siis jätke unustatud annus vahele. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

## **Kui te lõpetate Otomize kasutamise.**

Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata. Kui te lõpetate selle ravimi kasutamise liiga vara, siis võib infektsioon uuesti süveneda.

Kasutage Otomizet seni, kuni 2 päeva on möödunud haiguse sümptomite kadumisest. Kui teie haigus pole paranenud või on süvenenud pärast 7 päevast ravimi kasutamist, siis lõpetage ravimi kasutamine ja pöörduge arsti poole

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

## **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage ravimi kasutamine kohe ja pöörduge arsti poole, kui teil tekib naha sügelemine, nahaärritus ja lööve piirkonnas, kuhu olete Otomizet pihustanud.

Otomize võib põhjustada ka järgmisi kõrvaltoimeid, kuid need on enamasti mööduvad: Torkimis- ja kõrvetustunne piirkonnad, kuhu ravimit on manustatud.

### **Kõrvaltoimetest teavitamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

## **5. Kuidas Otomizet säilitada**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale - Vaata pakendilt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **6. Muu teave**

### **Müügiloa hoidja**

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

**Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2017.**