

PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Perfenasiin

Tahke suukaudne ravimvorm, 2 mg, 4 mg ja 8 mg

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on perfenasiin ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne perfenasiini võtmist
3. Kuidas perfenasiini võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas perfenasiini säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on perfenasiin ja milleks seda kasutatakse

Perfenasiin on antipsühhootikum ehk ravim, mida kasutatakse enamasti raskete vaimsete häirete raviks. See leevendab psühhooosi sümptomeid nagu hallutsinatsioone ja pettekujutlusi. Ravimil on ka rahustav toime.

Perfenasiini kasutatakse psühhoside ja skisofreenia raviks. Muud terapeutilised näidustused on raskekujulise iivelduse ja oksendamise vältimine ja ravi.

2. Mida on vaja teada enne perfenasiini võtmist

Perfenasiini ei tohi võtta

- kui te olete ülitundlik (allergiline) perfenasiini või selle ravimi mõne koostisosa suhtes.
- kui teil on feokromotsütoom (neerupealise säsi kasvaja), luuüdi funktsiooni häired või ajukahjustus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige enne selle ravimi tarvitamist oma arstiga:

- kui teil on maksa-, südame või kopsupuudulikkus, suhkurtõbi, epilepsia, silma siserõhu tõus (glaukoom), dementsus või Parkinsoni tõbi.
- kui teil või mõnel teie sugulasel on esinenud verehüübeid, sest seda tüüpi ravimite kasutamine võib soodustada verehüüvete teket.
- kui teil on mõni südamehaigus.
- kui teil või mõnel teie sugulasel on esinenud QT-intervalli pikenemist, sest sellisel juhul on tegemist eelsoodumusega südame rütmihäirete tekkeks.
- kui teie südamelöögid on tavapärasest oluliselt aeglasemad (bradükardia).
- kui teil on suurenenud eesnääre.
- kui te kasutate samaaegselt teisi antipsühhootikume või kui mõni teine antipsühhootikum pole teile sobinud.

- kui teil on tugev või pikaajaline kõhulahtisus, oksendamine või kui te paastute pikemat aega.

QT-intervalli pikendavaid ja organismi soolade tasakaalu mõjutavaid ravimeid ei tohi kasutada koos perfenasiiniga. Seetõttu on eriti tähtis, et arst oleks teadlik kõigist ravimitest, mida te kasutate. Vt ka lõik „Kasutamine koos teiste ravimitega“.

Samuti peate oma arstile rääkima, kui teil on teisi haigusi või allergia.

Muud ravimid ja perfenasiin

Öelge oma arstile kui te võtate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mistahes muid ravimeid, sealhulgas ka ilma retseptita ostetud ravimid taimsed preparaadid ning loodustooted. Rääkige arstile kindlasti, kui olete hiljuti kasutanud mingit ravimit.

Ärge alustage uute ravimite kasutamist, kuni te ei ole koos oma arsti või apteekriga kontrollinud, kas neid ravimeid võib kasutada koos perfenasiiniga.

Teatud ravimite ja perfenasiini samaaegne kasutamine võib muuta nende ravimite efektiivsust või põhjustada kõrvaltoimeid. Selliste ravimite hulka kuuluvad

- antipsühhootikumid (tioridasiin, tsüklopentiksool, haloperidool, risperidoon)
- antidepressandid (amitriptülin, imipramiin, klomipramiin, nortriptülin, mianseriin, paroksetiin, fluoksetiin, fluvoksamiin, sertraliin, venlafaksiin)
- uinutid
- ärevuse ja distressi vastased ravimid
- adrenaliin
- alkohol
- allergiavastased ravimid (antihistamiinikumid)
- kõharavimid (deksrometorfaan)
- teatud hüpertensioonivastased ravimid (nt guanetidiin, klonidiin)
- teatud beetablokaatorid (nt alprenool, metoprolol, propranolol, timolool)
- epilepsiavastased ravimid (fenütoiin, valproaat, karbamasepiin, fenobarbitaal)
- antiarütmikumid (enkainiid, flekainiid, propafenoon, meksiletiin, kinidiin)
- tugevad valuvaigistid (nt tramadool ja kodeiin)
- mao happesust vähendavad ravimid (tsimetidiin, omeprasool)
- antabus (disulfiraam)
- suitsetamine

Rasedus ja imetamine

Perfenasiini tohib kasutada raseduse ajal vaid juhul, kui selleks on selge näidustus. Kui te olete rase või plaanite rasestuda või toidate last rinnaga, pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Perfenasiin eritub rinnapiima, kuid nii väikestes kogustes, et sellel puudub kahjulik toime imikule. Kui te soovite perfenasiinravi ajal last rinnaga toita, pidage nõu oma arstiga. Kui ema on viimase kolme raseduskuu jooksul kasutanud perfenasiini, võivad vastsündinul esineda sellised sümptomid nagu treemor, lihasjäikus või -nõrkus, somnolentsus, rahutus, hingamis- või toitmisprobleemid. Kui teie lapsel on sellised sümptomid, siis tuleb konsulteerida arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Perfenasiin võib halvendada autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet, eriti ravi alguses. Ravi alustamisel tuleb hoiduda autojuhtimisest ja masinate käsitsemisest, kuni te teate, kuidas see ravim just teile mõjub.

Oluline teave ravimi koostisainete suhtes

Teile määratud ravimis sisalduvate abiainetega kohta teavet, palun, küsige oma raviarstilt.

3. Kuidas perfenasiini võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Perfenasiini annustamine on individuaalne. Arst määrab sobiva annuse ja annab teile täpsed juhised.

Kui te tunnete, et ravimi toime on liiga nõrk või liiga tugev, ärge muutke iseseisvalt annust, vaid pidage nõu oma arstiga. Maksimaalset ööpäevast annust ei tohi ületada.

Ravimi regulaarne kasutamine aitab haiguse sümptomeid kontrolli all hoida.

Kui te võtate perfenasiini rohkem, kui ette nähtud

Kui teie või keegi teine, nt mõni laps, on kogemata võtnud liiga palju ravimit, pöörduge otsekohe arsti poole või haiglasse.

Perfenasiini tõsise üleannustamise sümptomiteks on kesknärvisüsteemi pidurdus ja lihaskrambid. Sümptomid on kõige tugevamad hiljemalt 24 tundi pärast üleannustamist.

Arsti juurde või haiglasse minnes võtke kaasa ravimi pakend.

Kui te unustate perfenasiini võtta

Kui unustate annuse võtmata, jätke see annus vahele ning võtke järgmine annus tavapärasel ajal.

Ärge kunagi võtke kahekordset annust kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate perfenasiini kasutamise

Annust vähendatakse järk-järgult vastavalt arsti soovitudele.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sage (rohkem kui ühel isikul 10st):

- kerged muutused valgete vereliblede vormelementide arvudes (leukotsütoos või leukopeenia)

Sage (vähem kui ühel isikul 10st):

- menstruaatsioonitsükli häired, rinnanäärmete suurenemine ja hellus, rinnanäärmete suurenemine meestel
- söögiisu ja kehakaalu muutused
- väsimus, seda eriti ravi algfaasis
- järsku tekkinud lihasliigutuste häired
- motoorne rahutus (st võimetus rahulikult paigal püsida)
- Parkinsoni tõvele viitavad sümptomid nagu värinad või lihasjäikus
- pikaajalisel ravil tahtmatud liigutused ja suuümbruse värinad
- madal vererõhk
- nahasümptomid (nt nõgestõbi, lööve, sügelus, valgustundlikkus või muud nahasümptomid)

Aeg-ajalt (vähem kui ühel isikul 100st):

- suukuivus
- urineerimistakistus
- halvenenud lähedale nägemine
- suletudnurga glaukoomi ägenemine

- südametöö kiirenemine
- kõhukinnisus
- erektsioonifunktsiooni kahjustus
- mäluhäired
- vererõhu langusest tingitud pearinglus püsti tõusmisel
- püsiv valulik erektsioon ja ejakulatsioonihäired
- krambiläve alanemine

Harv (vähem kui ühel isikul 1000st):

- glükoositaluvuse muutused
- sündroom, mis hõlmab krampe, palavikku, lihasjäikust ja teadvustaseme langust (maliigne neuroleptiline sündroom)
- nägemishäired
- südame rütmihäired
- libiido muutused, orgasmi hilinemine

Väga harv (vähem kui ühel isikul 10 000st):

- tõsised muutused vere vormelementide arvudes (agranulotsütoos, aplastiline aneemia)
- tõsised südame rütmihäired
- südameseiskus
- suurenenud karvakasv

Esinemissagedus teadmata

- Verehüübed eeskätt jalaveenides (sümptomiteks on sääre turse, valu ja punetus), mis võivad liikuda piki veresoonte kulgu kopsudesse, kus põhjustavad valu rinnus ja hingamisraskust. Kui märkate mõnda nendest sümptomitest, pöörduge otsekohe arsti poole.

Eakatel dementsusega patsientidel, kes saavad raviks antipsühhootikume, on teatatud surmajuhitudest veidi sagedamini kui patsientidel, kes antipsühhootikume ei kasuta.

Eriti ravi alguses võib perfenasiin põhjustada väsimust, mis siiski ravi jätkudes väheneb.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas perfenasiini säilitada

Vt säilitamise infot pakendilt.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „Kõlblik kuni“ või „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Müügiloa hoidja

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba.

Abiained

Abiained vt pakendilt.

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2022.