

## **RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE**

### **1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS**

Engystol, tabletid

### **2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS**

1 tablett sisaldab:

Toimeained:

1.Vincetoxicum hirundinaria	D6	75 mg
2.Vincetoxicum hirundinaria	D10	75 mg
3.Vincetoxicum hirundinaria	D30	75 mg
4.Sulfur	D4	37,5 mg
5.Sulfur	D10	37,5 mg

Abiained vaata lõik 6.1.

### **3. RAVIMVORM**

Suukaudsed tabletid

Engystol on valge kuni kollakas-valkjas tablett, ümmargune, sileda pinnaga ja töödeldud servadega.

### **4. KLIINILISED ANDMED**

#### **4.1 Näidustus**

Homöopaatiline preparaat.

#### **4.2 Annustamine ja manustamisviis**

Täiskasvanud ja lapsed alates 12 aasta vanusest: võtta 1 tablett 3 korda päevas.

Lapsed vanuses 6...11 aastat: võtta 1 tablett 2 korda päevas.

Lapsed vanuses 2...5 aastat: võtta 1 tablett 1...2 korda päevas.

Tabletid lasta sulada aeglaselt suus toidukordade vahel. Lastele manustamisel võib tabletti purustada ja lahustada väikeses koguses vees.

Engystol'i ohutus ja efektiivsus alla 2 aastase laste kasutamisel ei ole uuritud. Andmed puuduvad.

#### **4.3 Vastunäidustused**

Teadad olev allergia või ülitundlikkus Engystol'i toimeainete või mõne abiaine suhtes.

#### **4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel**

Ravim sisaldab laktoosi. Harvaesineva päriliku fruktoositalumatuse, galaktoositalumatuse, galaktoseemia või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

#### **4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed**

Koostoimest teiste ravimitega ei ole teavitatud, ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste tõttu.

#### **4.6 Rasedus ja imetamine**

Engystol'i mõju raseduse ja imetamise ajal ei ole kliiniliselt uuritud. Negatiivsetest mõjudest ei ole teavitatud.

#### **4.7 Toime reaktsioonikiirusele**

Engystol'i mõju autojuhtimisele või mehhanismidega ja masinatega töötamisele ei ole täheldatud, ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste tõttu.

#### **4.8 Kõrvaltoimed**

Väga harvadel juhtudel võib esineda allergilisi (ülitundlikkuse) reaktsioone (vähem kui 1 juhtum 10 000 kasutajate kohta).

#### **4.9 Üleannustamine**

Üleannustamise juhtudest ei ole teavitatud, ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste tõttu.

### **5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED**

#### **5.1 Farmakodünaamilised omadused**

Farmakoterapeutiline grupp: homöopaatiline ravim.  
Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

#### **5.2 Farmakokineetilised omadused**

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

#### **5.3 Prekliinilised ohutusandmed**

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

### **6. FARMATSEUTILISED ANDMED**

#### **6.1 Abiained**

Magneesium stearaat.

#### **6.2 Sobimatus**

Ei ole teada.

#### **6.3 Kõlblikkusaeg**

5 aastat.

#### **6.4 Säilitamise eritingimused**

Engystol ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

### **6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu**

Plastikpurk pappkarbis. Pakendis on 50 või 250 tabletti.

### **6.6 Kasutamise- ja käsitlemisjuhend**

Erilisi nõudeid ei ole.

## **7. MÜÜGILOA HOIDJA**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4  
DE-76532 Baden-Baden  
Saksamaa  
Tel. +49 7221 501-00  
Faks. +49 7221 501 485  
E-mail: info@heel.de

## **8. MÜÜGILOA NUMBER**

448204

## **9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV**

28.04.2004/4.05.2012

## **10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV**

Ravimiametis kinnitatud juunis 2012