

Teie ravimi nimetus on _____

Ravimi toimeaine on **agomelatiin**

Soovitused maksaga seotud kõrvaltoimete vältimiseks

Agomelatiin võib põhjustada kõrvaltoimeid, sealhulgas muutusi teie maksafunktsioonis.

See juhend annab teile soovitusi ja nõuandeid, kuidas vältida maksa kõrvaltoimeid ning mida teha, kui sellised kõrvaltoimed ilmnevad agomelatiinravi ajal.

Lisateabe saamiseks pidage nõu oma arstiga.

Agomelatiin on antidepressant, mis aitab teil ravida depressiooni.

Ohutu ravi tagamiseks järgige oma arstilt saadud juhiseid agomelatiini kasutamise kohta (annus, ravi kestus ja sellega seonduv jälgimine nagu kokkulepitud visiidid, vereanalüüsid).

MIDA TEHA ENNE AGOMELATIINI VÕTMIST?

- **Öelge oma arstile, kui te teate, et teie maks ei tööta korralikult: sellisel juhul ärge võtke agomelatiini.**
- **Võib olla ka muid põhjuseid, miks agomelatiin teile ei sobi.**
Palun pidage oma arstiga nõu järgmistel juhtudel:
 - Kui teil on esinenud probleeme maksaga,
 - Kui te olete rasvunud või ülekaaluline,
 - Kui teil on diabeet,
 - Kui te tarbite alkoholi,
 - Kui te võtate teisi ravimeid (millest mõned teadaolevalt mõjutavad maksa).

MIDA TEHA MAKSAPROBLEEMIDE VÄLTIMISEKS RAVI AJAL?

➤ Regulaarselt teostada vereanalüüse

- Miks?

Enne ravi alustamist kontrollib arst, kas teie maks töötab normaalselt. Arsti poolt määratud vereanalüüsid näitavad arstile, kuidas teie maks töötab ja kas agomelatiin on teile sobilik ravim.

Osadel patsientidel suureneb agomelatiinravi ajal maksaensüümide aktiivsus veres. Nende maksaensüümide tase näitab, kas teie maks töötab hästi või mitte ning on väga oluline teie arsti jaoks teie ravi jälgimisel.

- Millal?

	Enne ravi alustamist või annuse suurendamisel	Ligikaudu 3 nädala pärast	Ligikaudu 6 nädala pärast	Ligikaudu 3 kuu pärast	Ligikaudu 6 kuu pärast
Vereanalüüs	✓	✓	✓	✓	✓

Kui teie arst suurendab annust 50 mg-ni, tuleb analüüsid teostada uuesti.

Ärge unustage arsti juurde kaasa võtta **MEELDETULETUST VEREANALÜÜSIDE ANDMISEKS** (vt järgmine lehekülg)

Teavitage oma arsti otsekohe, kui te saate mingit teavet, et teie maksaensüümide tase veres on RAVI AJAL suurenenud.

➤ Olge tähelepanelik maksaprobleemide sümptomite suhtes

Teie maks ei tööta ilmselt hästi, kui te täheldate mõnda järgmistest:

- Kollane nahk/silmad,
- Tume uriin,
- Hele väljaheide,
- Valu paremal pool ülakõhus,
- Ebatavaline väsimus (eriti kui kaasneb koos teiste, eespool loetletud sümptomitega)

⇒ Pidage otsekohe nõu arstiga, kes võib soovitada agomelatiini võtmise katkestada.

MEELDETULETUS VEREANALÜÜSIDE ANDMISEKS

PIDAGE MEELES

Kui te võtate agomelatiini, on oluline, et teil teostatakse regulaarselt vereanalüüse.

ALLOLEV TABEL AITAB TEIL JÄLGIDA VISIITIDE AEGU VEREANALÜÜSIDE ANDMISEKS

AGOMELATIIN 25 MG – ESMASE VÕTMISE KUUPÄEV:	
Vereanalüüside intervallid maksaensüümide määramiseks	Kuupäev
Esimese analüüsi kuupäev (<i>enne ravi alustamist</i>)	
Teise analüüsi kuupäev (<i>ligikaudu 3 nädala pärast</i>)	
Kolmanda analüüsi kuupäev (<i>ligikaudu 6 nädala pärast</i>)	
Neljanda analüüsi kuupäev (<i>ligikaudu 3 kuu pärast</i>)	
Viienda analüüsi kuupäev (<i>ligikaudu 6 kuu pärast</i>)	

Teie arst otsustab, kas on vajalik täiendav vereanalüüside teostamine.

ANNUSE SUURENDAMINE 50 MG-NI - ESMASE VÕTMISE KUUPÄEV:	
Vereanalüüside intervallid maksaensüümide määramiseks	Kuupäev
Esimese analüüsi kuupäev enne 50 mg agomelatiini võtmist	
Teise analüüsi kuupäev (<i>ligikaudu 3 nädala pärast</i>)	
Kolmanda analüüsi kuupäev (<i>ligikaudu 6 nädala pärast</i>)	
Neljanda analüüsi kuupäev (<i>ligikaudu 3 kuu pärast</i>)	
Viienda analüüsi kuupäev (<i>ligikaudu 6 kuu pärast</i>)	

Teie arst otsustab, kas on vajalik täiendav vereanalüüside teostamine.

Ärge unustage seda juhendit arsti juurde kaasa võtta.

Lisateabe saamiseks lugege agomelatiini pakendi infolehte.