

Ambrisentan Mylan (ambrisentaan) patsiendi meeldetuletuskaart

MIDA PEATE MEELES PIDAMA

Loomkatsetes on leitud, et ambrisentaan põhjustab sünnidefekte. Ambrisentaan võib kahjustada sündimata last, kui rasestusite enne ravi, ravi ajal või peagi pärast ravi.

Kui olete naine:

- **ei tohi te ambrisentaani kasutada, kui olete rase** või kavatsete rasestuda.
- **Rasestumisvõimelised naised peavad** ambrisentaani võtmise ajal kasutama usaldusväärset rasestumisvastast meetodit.
- Rasedustest tuleb teha kord kuus.
- Kui teil jääb menstruatsioon vahele või kui te kahtlustate rasedust, peate sellest otsekohe teavitama oma arsti.

Ambrisentaan võib põhjustada maksakahjustust. Tähtis on enne ravi alustamist ja ravi ajal regulaarselt teha vereanalüüse maksatalitluse kontrollimiseks.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida pakendi infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.