

EESTI HAIGEKASSA RAVIMITE LOETELU

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1539547 | abirateroon, 250mg | L02BX03 | ZYTIGA, tablett, 120TK | JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV | 100 | C61-C61 | Uroloog, Onkoloog | | | | metastaseerunud kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks heas üldseisundis (ECOG 0-1 või valusündroomist tingitud ECOG 2) patsientidele, kelle haigus on eelneva dotsetakseeli sisaldava kemoteeraapia vältel või pärast seda progresseerunud; soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi abiraterooniga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.10.2014. a. |
| 1011429 | adapaleen, 1mg 1g | D10AD03 | DIFFERIN, geel, 30g 1TK | GALDERMA INTERNATIONAL | 50 | | | | | | |
| 1011430 | adapaleen, 1mg 1g | D10AD03 | DIFFERIN, kreem, 30g 1TK | GALDERMA INTERNATIONAL | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|------------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1412334 | agomelatiin, 25mg | N06AX22 | VALDOXAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Les Laboratoires Servier | 50 | | | | | | |
| 1590106 | aklidiiniumbromiid, 322mcg 1annust | R03BB05 | BRETARIS GENUAIR, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J43-J44 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1593312 | aksitiniib, 1mg | L01XE17 | INLYTA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Pfizer Limited | 100 | C64-C64 | Onkoloog | | | | IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast esimese rea sunitiniib- või pasopaniibravi patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine aksitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1593345 | aksitiniib, 5mg | L01XE17 | INLYTA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Pfizer Limited | 100 | C64-C64 | Onkoloog | | | | IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast esimese rea sunitiniib- või pasopaniibravi patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine aksitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |
| 1240120 | alendroonhape, 70mg | M05BA04 | SEDRON, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK | Gedeon Richter Plc. | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused | |
|-----------------|--|----------|--|--------------------------------|------------------|---|------------------------------------|--------|-----------|------------|---|--|
| 1245338 | alendroonhape, 70mg | M05BA04 | ALENOTOP, tablett, 4TK | Teva Pharma B.V. | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna | |
| | | | | | 50 | | | | | | | |
| 1300026 | alendroonhape, 70mg | M05BA04 | ALENDRONIC ACID ACCORD 70MG, tablett, 4TK | Accord Healthcare Limited | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna | |
| 1339141 | alendroonhape+koleka ltsiferool, 70mg+5600RÜ | M05BB03 | FOSAVANCE, tablett, 4TK | Merck Sharp & Dohme Limited | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna | |
| 1163854 | alfa-2a-interferoon, 3000000RÜ 0.5ml | L03AB04 | ROFERON-A, süstelahus, 1TK | Roche Eesti OÜ | 100 | C82-C85, D47-D47, C91-C92, D45-D45, C64-C64 | Onkoloog, Hematoloog | | | | | |
| | | | | | 100 | C43-C43 | Onkoloog | | | | adjuvantraviks AJCC II staadiumi korral pärast kasvaja kirurgilist resektsiooni | |
| | | | | | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 100 | B18.2-B18.2 | Gastroenteroloog, Infektsionist | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|-------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1110384 | alfa-2a-peginterferoon, 135mcg 0.5ml | L03AB11 | PEGASYS, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK | Roche Registration Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | B18.0-B18.2 | Gastroenteroloog, Infektsionist | | | | kroonilise progresseeruva kuluga B- või C-viirushepatiidi raviks |
| 1110407 | alfa-2a-peginterferoon, 180mcg 0.5ml | L03AB11 | PEGASYS, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK | Roche Registration Limited | 100 | B18.0-B18.2 | Gastroenteroloog, Infektsionist | | | | kroonilise progresseeruva kuluga B- või C-viirushepatiidi raviks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1336519 | alfa-2b-peginterferoon, 100mcg | L03AB10 | PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Merck Sharp & Dohme | 100 | B18.2-B18.2 | Gastroenteroloog, Infektsionist | | | | kroonilise progresseeruva kuluga C-viirushepatiidi raviks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1336553 | alfa-2b-peginterferoon, 120mcg | L03AB10 | PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Merck Sharp & Dohme | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | B18.2-B18.2 | Gastroenteroloog, Infektsionist | | | | kroonilise progresseeruva kuluga C-viirushepatiidi raviks |
| 1336609 | alfa-2b-peginterferoon, 150mcg | L03AB10 | PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Merck Sharp & Dohme | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | B18.2-B18.2 | Infektsionist, Gastroenteroloog | | | | kroonilise progresseeruva kuluga C-viirushepatiidi raviks |
| 1336430 | alfa-2b-peginterferoon, 50mcg | L03AB10 | PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Merck Sharp & Dohme | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | B18.2-B18.2 | Gastroenteroloog, Infektsionist | | | | kroonilise progresseeruva kuluga C-viirushepatiidi raviks |
| 1336474 | alfa-2b-peginterferoon, 80mcg | L03AB10 | PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Merck Sharp & Dohme | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | B18.2-B18.2 | Gastroenteroloog, Infektsionist | | | | kroonilise progresseeruva kuluga C-viirushepatiidi raviks |
| 1207493 | alfadarbepoetiin, 100mcg 0.5ml | B03XA02 | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 100 | D46-D46, D47.1- D47.1 | Hematoloog | | | | |
| | | | | | 100 | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog, Pediaater | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|-----------------------------------|----------|---|-------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1207527 | alfadarbepoetiin, 150mcg 0.3ml | B03XA02 | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 100 | D63-D63, T86-T86 | Pediaater, Uroloog, Nefroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 100 | D46-D46, D47.1- D47.1 | Hematoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1176218 | alfadarbepoetiin, 20mcg 0.5ml | B03XA02 | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 100 | D63-D63, T86-T86 | Pediaater, Uroloog, Nefroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | D46-D46, D47.1- D47.1 | Hematoloog | | | | |
| 1207314 | alfadarbepoetiin, 30mcg 0.3ml | B03XA02 | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 100 | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Pediaater, Uroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 100 | D46-D46, D47.1- D47.1 | Hematoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1207370 | alfadarbepoetiin, 40mcg 0.4ml | B03XA02 | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.4ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | D63-D63, T86-T86 | Pediaater, Nefroloog, Uroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 100 | D46-D46, D47.1- D47.1 | Hematoloog | | | | |
| 1207415 | alfadarbepoetiin, 50mcg 0.5ml | B03XA02 | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 100 | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Pediaater, Uroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 100 | D46-D46, D47.1- D47.1 | Hematoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1207437 | alfadarbepoetiin, 60mcg 0.3ml | B03XA02 | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 100 | D63-D63, T86-T86 | Pediaater, Uroloog, Nefroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 100 | D46-D46, D47.1- D47.1 | Hematoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|--------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|--------|-----------|--|----------|
| 1207471 | alfadarbepoetiin, 80mcg 0.4ml | B03XA02 | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.4ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | D46-D46, D47.1- D47.1 | Hematoloog | | | | |
| | | | | | 100 | D63-D63, T86-T86 | Pediaater, Uroloog, Nefroloog | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral | |
| 1022960 | alfadornaas, 1mg 1ml | R05CB13 | PULMOZYME, nebuliseeritav lahus, 2.5ml 6TK | Roche Eesti OÜ | 100 | E84-E84 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1644904 | alfafollitropiin, 150RÜ 0.25ml | G03GA05 | BEMFOLA, süstelahus pen- süstlis, 0.25ml 1TK | Finnox Biotech AG | 50 | | | | | | |
| 1644915 | alfafollitropiin, 225RÜ 0.375ml | G03GA05 | BEMFOLA, süstelahus pen- süstlis, 0.375ml 1TK | Finnox Biotech AG | 50 | | | | | | |
| 1173855 | alfafollitropiin, 300RÜ 0.5ml | G03GA05 | GONAL-F, süstelahus pen- süstlis, 0.5ml 1TK | Merck Serono Europe Limited | 50 | | | | | | |
| 1644926 | alfafollitropiin, 300RÜ 0.5ml | G03GA05 | BEMFOLA, süstelahus pen- süstlis, 0.5ml 1TK | Finnox Biotech AG | 50 | | | | | | |
| 1213513 | alfafollitropiin, 450RÜ 0.75ml | G03GA05 | GONAL-F, süstelahus pen- süstlis, 0.75ml 1TK | Merck Serono Europe Limited | 50 | | | | | | |
| 1644937 | alfafollitropiin, 450RÜ 0.75ml | G03GA05 | BEMFOLA, süstelahus pen- süstlis, 0.75ml 1TK | Finnox Biotech AG | 50 | | | | | | |
| 1035784 | alfafollitropiin, 75RÜ | G03GA05 | GONAL-F, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Merck Serono Europe Limited | 50 | | | | | | |
| 1644892 | alfafollitropiin, 75RÜ 0.125ml | G03GA05 | BEMFOLA, süstelahus pen- süstlis, 0.125ml 1TK | Finnox Biotech AG | 50 | | | | | | |
| 1173866 | alfafollitropiin, 900RÜ 1.5ml | G03GA05 | GONAL-F, süstelahus pen- süstlis, 1.5ml 1TK | Merck Serono Europe Limited | 50 | | | | | | |
| 1327834 | alfafollitropiin+alfalutro- piin, 150RÜ+75RÜ | G03GA30 | PERGOVERIS, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Merck Serono Europe Limited | 50 | | | | | | |
| 1580969 | alfakooriongonadotropi- in, 250mcg 0.5ml | G03GA08 | OVITRELLE, süstelahus pen- süstlis, 0.5ml 1TK | Merck Serono Europe Limited | 50 | | | | | | |
| 1459357 | alfakorifollitropiin, 100mcg 0.5ml | G03GA09 | ELONVA, süstelahus, 0.5ml 1TK | Merck Sharp & Dohme Ltd | 50 | | | | | | |
| 1459391 | alfakorifollitropiin, 150mcg 0.5ml | G03GA09 | ELONVA, süstelahus, 0.5ml 1TK | Merck Sharp & Dohme Ltd | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|-----------|------------|----------|
| 1046810 | alfalutropiin, 75RÜ | G03GA07 | LUVERIS, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Merck Serono Europe Limited | 50 | | | | | | |
| 1064247 | alfusosiin, 10mg | G04CA01 | XATRAL SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50 | | | | | | |
| 1278176 | alfusosiin, 10mg | G04CA01 | ALFUZOSIN-TEVA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| 1001619 | allopurinool, 100mg | M04AA01 | ALLOPURINOL NYCOMED, tablett, 50TK | Takeda Pharma AS | 75 | M10-M10, N20-N23 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1001686 | allopurinool, 300mg | M04AA01 | ALLOPURINOL NYCOMED, tablett, 50TK | Takeda Pharma AS | 75 | M10-M10, N20-N23 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1064472 | amantadiin, 100mg | N04BB01 | PK-MERZ 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Merz Pharmaceuticals GmbH | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1064517 | amantadiin, 100mg | N04BB01 | AMANTADIN-RATIOPHARM 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | ratiopharm GmbH | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|---|
| 1349872 | ambrisentaan, 10mg | C02KX02 | VOLIBRIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Glaxo Group Ltd. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog, Pediaater, Reumatoloog, Kardioloog | | | | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
| 1349850 | ambrisentaan, 5mg | C02KX02 | VOLIBRIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Glaxo Group Ltd. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | Reumatoloog, Kardioloog, Pulmonoloog, Pediaater | | | | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|----------|--------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1016244 | amiodaroon, 200mg | C01BD01 | CORDARONE 200 MG, tablett, 30TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1044616 | amiodaroon, 200mg | C01BD01 | AMIOKORDIN, tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1041141 | amisulpriid, 200mg | N05AL05 | SOLIAN, tablett, 30TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1342213 | amisulpriid, 200mg | N05AL05 | AMISAN 200 MG, tablett, 30TK | PRO. MED. CS. PRAHA a.s | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1343438 | amisulpriid, 400mg | N05AL05 | AMISAN 400 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | PRO. MED. CS. PRAHA a.s | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1008661 | amitriptülin, 10mg | N06AA09 | AMITRIPTYLINE NYCOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | Takeda Pharma AS | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | G62.0-G62.0, G63- G63 | | | | | |
| 1107391 | amitriptülin, 10mg | N06AA09 | AMITRIPTYLINE-GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | AS Grindeks | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | G62.0-G62.0, G63- G63 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1012475 | amitriptülin, 25mg | N06AA09 | AMITRIPTYLINE-GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | AS Grindeks | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | G62.0-G62.0, G63- G63 | | | | | |
| 1068634 | amitriptülin, 25mg | N06AA09 | AMITRIPTYLINE NYCOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Takeda Pharma AS | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | G62.0-G62.0, G63- G63 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1005848 | amitriptüliin, 50mg | N06AA09 | SAROTEN RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 100TK | H. LUNDBECK A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | G62.0-G62.0, G63- G63 | | | | | |
| 1087905 | amlodipiin, 10mg | C08CA01 | AMLOCARD 10MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| 1109900 | amlodipiin, 10mg | C08CA01 | AGEN 10MG, tablett, 30TK | Zentiva k.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| 1122972 | amlodipiin, 10mg | C08CA01 | HIPRES, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| 1147003 | amlodipiin, 10mg | C08CA01 | AMLODIPIN-RATIOPHARM 10 MG, tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1241514 | amlodipiin, 10mg | C08CA01 | AMLODIGAMMA 10MG, tablett, 30TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| 1295748 | amlodipiin, 10mg | C08CA01 | AMLODIPINE MEDOCHEMIE, tablett, 30TK | Medochemie Ltd. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| 1318946 | amlodipiin, 10mg | C08CA01 | AMLODIPINE TEVA, tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|---------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1318980 | amlodipiin, 10mg | C08CA01 | AMLODIPINE TEVA, tablett, 90TK | Teva Pharma B.V. | 75 | I15-I15, I10-I13, I20-I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1416934 | amlodipiin, 10mg | C08CA01 | AMLODIPINE ACTAVIS, tablett, 30TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20-I20 | | | | | |
| 1445396 | amlodipiin, 10mg | C08CA01 | AMLODIPINE VITABALANS, tablett, 30TK | VITABALANS OY | 75 | I15-I15, I10-I13, I20-I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1445408 | amlodipiin, 10mg | C08CA01 | AMLODIPINE VITABALANS, tablett, 60TK | VITABALANS OY | 75 | I15-I15, I10-I13, I20-I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1525665 | amlodipiin, 10mg | C08CA01 | AMLODIPINE ACCORD 10MG, tablett, 30TK | Accord Healthcare Limited | 75 | I15-I15, I10-I13, I20-I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1551406 | amlodipiin, 10mg | C08CA01 | HIPRES, tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20-I20 | | | | | |
| 1087871 | amlodipiin, 5mg | C08CA01 | AMLOCARD 5 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 75 | I15-I15, I10-I13, I20-I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1109775 | amlodipiin, 5mg | C08CA01 | AMLODIPIN-RATIOPHARM 5 MG, tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20-I20 | | | | | |
| 1109887 | amlodipiin, 5mg | C08CA01 | AGEN 5MG, tablett, 30TK | Zentiva k.s. | 75 | I15-I15, I10-I13, I20-I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1122961 | amlodipiin, 5mg | C08CA01 | HIPRES, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | I15-I15, I10-I13, I20-I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1241424 | amlodipiin, 5mg | C08CA01 | AMLODIGAMMA 5MG, tablett, 30TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20-I20 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1295737 | amlodipiin, 5mg | C08CA01 | AMLODIPINE MEDOCHEMIE, tablett, 30TK | Medochemie Ltd. | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1318834 | amlodipiin, 5mg | C08CA01 | AMLODIPINE TEVA, tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| 1318878 | amlodipiin, 5mg | C08CA01 | AMLODIPINE TEVA, tablett, 90TK | Teva Pharma B.V. | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1416899 | amlodipiin, 5mg | C08CA01 | AMLODIPINE ACTAVIS, tablett, 30TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| 1445284 | amlodipiin, 5mg | C08CA01 | AMLODIPINE VITABALANS, tablett, 30TK | VITABALANS OY | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| 1445295 | amlodipiin, 5mg | C08CA01 | AMLODIPINE VITABALANS, tablett, 60TK | VITABALANS OY | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| 1525597 | amlodipiin, 5mg | C08CA01 | AMLODIPINE ACCORD 5MG, tablett, 30TK | Accord Healthcare Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| 1551383 | amlodipiin, 5mg | C08CA01 | HIPRES, tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| 1008919 | amoksitsilliin, 1000mg | J01CA04 | AMOXICILLIN- RATIOPHARM 1000 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | ratiopharm GmbH | 75 | H66-H66, J13-J15 | | | | 16,00 | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1066058 | amoksitsilliin, 1000mg | J01CA04 | AMOXICILLIN SANDOZ, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK | Sandoz GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | H66-H66, J13-J15 | | | | 16,00 | |
| 1066463 | amoksitsilliin, 1000mg | J01CA04 | AMOXICILLIN- RATIOPHARM 1000 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | ratiopharm GmbH | 75 | H66-H66, J13-J15 | | | | | 16,00 |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1306921 | amoksitsilliin, 1000mg | J01CA04 | OSPAMOX, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75 | J13-J15, H66-H66 | | | | 16,00 | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1000551 | amoksitsilliin, 500mg | J01CA04 | AMOXICILLIN- RATIOPHARM 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | ratiopharm GmbH | 75 | J13-J15, H66-H66 | | | | 16,00 | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1066047 | amoksitsilliin, 500mg | J01CA04 | AMOXICILLIN SANDOZ, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK | Sandoz GmbH | 75 | H66-H66, J13-J15 | | | | 16,00 | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1066496 | amoksitsilliin, 500mg | J01CA04 | AMOXICILLIN- RATIOPHARM 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | ratiopharm GmbH | 75 | H66-H66, J13-J15 | | | | 16,00 | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1306820 | amoksitsilliin, 500mg | J01CA04 | OSPAMOX, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75 | J13-J15, H66-H66 | | | | 16,00 | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1000382 | amoksitsilliin, 50mg 1ml | J01CA04 | AMOXICILLIN-RATIOPHARM TS, suukaudse suspensiooni pulber, 100ml 1TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J13-J15, H66-H66 | | | | 16,00 | |
| 1182002 | amoksitsilliin, 50mg 1ml | J01CA04 | OSPAMOX 250 MG/5 ML, suukaudse suspensiooni pulber, 100ml 1TK | Sandoz GmbH | 75 | J13-J15, H66-H66 | | | | 16,00 | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1000450 | amoksitsilliin, 750mg | J01CA04 | AMOXICILLIN- RATIOPHARM 750 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | H66-H66, J13-J15 | | | | 16,00 | |
| 1028630 | amoksitsilliin+klavulaa nhape, 500mg+125mg | J01CR02 | AUGMENTIN, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | SmithKline Beecham Limited | 50 | | | | | | |
| 1066722 | amoksitsilliin+klavulaa nhape, 500mg+125mg | J01CR02 | AMOKSIKLAV, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50 | | | | | | |
| 1028685 | amoksitsilliin+klavulaa nhape, 80mg+11,4mg 1ml | J01CR02 | AUGMENTIN, suukaudse suspensiooni pulber, 70ml 1TK | SmithKline Beecham Limited | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|---|------------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1066711 | amoksitsilliin+klavulaa nhape, 80mg+11,4mg 1ml | J01CR02 | AMOKSIKLAV, suukaudse suspensiooni pulber, 70ml 1TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50 | | | | | | |
| 1066700 | amoksitsilliin+klavulaa nhape, 875mg+125mg | J01CR02 | AMOKSIKLAV, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50 | | | | | | |
| 1066733 | amoksitsilliin+klavulaa nhape, 875mg+125mg | J01CR02 | AUGMENTIN, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | SmithKline Beecham Limited | 50 | | | | | | |
| 1175431 | amoksitsilliin+klavulaa nhape, 875mg+125mg | J01CR02 | AMOKSIKLAV, dispergeeruv/suus dispergeeruv tablett, 14TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50 | | | | | | |
| 1009572 | amorolfiin, 50mg 1ml | D01AE16 | LOCERYL, ravimküünelakk, 2.5ml 1TK | GALDERMA INTERNATIONAL | 50 | | | | | | |
| 1065978 | ampitsilliin, 500mg | J01CA01 | STANDACILLIN, kõvakapsel, 12TK | Sandoz GmbH | 50 | | | | | | |
| 1208359 | anagreliid, 0,5mg | L01XX35 | XAGRID, kõvakapsel, 100TK | Shire Pharmaceutical Contracts Limited | 100 | D47.3-D47.3 | Hematoloog | | | | patsientidele, kellel ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: esmalaliku ravi (hüdroksüürea annuses vähemalt 2g päevas vähemalt 3 kuu jooksul või alfainterferoon) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning esineb trombotsütoos 1000x109/l või on ilmnenud trombohemorraagilised juhud |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1033546 | anastrosool, 1mg | L02BG03 | ARIMIDEX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | AstraZeneca UK Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C50-C50 | Üldkirurg, Onkoloog, Günekoloog | | | | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks |
| 1240490 | anastrosool, 1mg | L02BG03 | ANASTROZOLE SANOSWISS 1 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | UAB SanoSwiss | 100 | C50-C50 | Günekoloog, Onkoloog, Üldkirurg | | | | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1240771 | anastrosool, 1mg | L02BG03 | ANASTROZOLE ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 100 | C50-C50 | Üldkirurg, Günekoloog, Onkoloog | | | | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1244438 | anastrosool, 1mg | L02BG03 | ANASTROZOLE-TEVA 1MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 100 | C50-C50 | Onkoloog, Günekoloog, Üldkirurg | | | | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1293870 | anastrosool, 1mg | L02BG03 | ANASTROZOLE ACCORD 1MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Accord Healthcare Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C50-C50 | Günekoloog, Onkoloog, Üldkirurg | | | | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks |
| 1299023 | anastrosool, 1mg | L02BG03 | AXASTROL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | AS Grindeks | 100 | C50-C50 | Günekoloog, Onkoloog, Üldkirurg | | | | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1531437 | apiksabaan, 2,5mg | B01AF02 | ELIQUIS, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG | 75 | S72.0-S72.2, S72.7- S72.7, M16-M17 | | | | | kuni 30 päevaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1531448 | apiksabaan, 2,5mg | B01AF02 | ELIQUIS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG | 75 | S72.0-S72.2, S72.7- S72.7, M16-M17 | | | | | kuni 30 päevaks |
| | | | | | 75 | I48-I48 | | | | | patsientidele, kellele varfariin on kõrval- või koostoimete tõttu vastunäidustatud, kellel esineb varfariini toime ebastabiilsus (ravi on läbi viidud vähemalt 4 kuu jooksul, millest viimase 3 kuu jooksul on INRi mõõdetud vähemalt 10 korral ja INR on jäänud terapeutilisse vahemikku <60% mõõtmiskordadest) või resistentsus varfariinile (varfariini igapäevane annus >12mg) |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1603741 | apiksabaan, 5mg | B01AF02 | ELIQUIS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I48-I48 | | | | | patsientidele, kellele varfariin on kõrval- või koostoimete tõttu vastunäidustatud, kellel esineb varfariini toime ebastabiilsus (ravi on läbi viidud vähemalt 4 kuu jooksul, millest viimase 3 kuu jooksul on INRi mõõdetud vähemalt 10 korral ja INR on jäänud terapeutilisse vahemikku <60% mõõtmiskordadest) või resistentsus varfariinile (varfariini igapäevane annus >12mg) |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1504808 | apomorfiin, 10mg 1ml | N04BC07 | APO-GO, süstelahus pen- süstlis, 3ml 5TK | Britannia Pharmaceuticals | 100 | G20-G20 | Neuroloog | | | | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellel esineb vaatamata optimaalsele suukaudsele ravile raskekujuline motoorikahäire kestvate või sagedaste mootorsete fluktuatsioonidega (MDS UPDRS III skoor off-perioodis on >40 punkti, off-perioodi kestus >25% ärkvelolekuajast) ning ravivastus apomorfiinile on hea (MDS-UPDRS III skoor paraneb >40%) |
| 1649796 | aripiprasool, 10mg | N05AX12 | ZYKALOR, tablett, 30TK | Medochemie Ltd. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1203578 | aripiprasool, 15mg | N05AX12 | ABILIFY, tablett, 28TK | Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1649370 | aripiprasool, 15mg | N05AX12 | LEMILVO, suus dispergeeruv tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1649651 | aripiprasool, 15mg | N05AX12 | ARIPIPRAZOLE TEVA, tablett, 28TK | Teva B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1649853 | aripiprasool, 15mg | N05AX12 | ZYKALOR, tablett, 30TK | Medochemie Ltd. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1650271 | aripiprasool, 15mg | N05AX12 | ARISPPA, tablett, 60TK | Focus Care Pharmaceuticals B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1651643 | aripiprasool, 15mg | N05AX12 | PAXIFOR, tablett, 28TK | AS Grindeks | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1691962 | aripiprasool, 15mg | N05AX12 | ARIPIPRAZOLE ZENTIVA, tablett, 28TK | Zentiva k.s. | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1650349 | aripiprasool, 30mg | N05AX12 | ARISPPA, tablett, 30TK | Focus Care Pharmaceuticals B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--|--------|-----------|------------|----------|
| 1004500 | asatiopriin, 50mg | L04AX01 | IMURAN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Aspen Pharma Trading Limited | 75 | L40-L40 | Dermatoveneroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 100 | G70-G70 | Neuroloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | K50-K51, K73-K74 | Gastroenteroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 75 | N00-N08 | Nefroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 75 | L12-L12, L13.0- L13.0, L10-L10 | Dermatoveneroloog, Allergoloog- immunoloog, Pediaater | | | | |
| 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | Reumatoloog, Pediaater | | | | | | | | | |
| 1667325 | asatiopriin, 50mg | L04AX01 | ATSIMUTIN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | PharmaSwiss Ceska republika s.r.o | 75 | L40-L40 | Dermatoveneroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | L12-L12, L13.0- L13.0, L10-L10 | Pediaater, Allergoloog- immunoloog, Dermatoveneroloog | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | Pediaater, Reumatoloog | | | | |
| | | | | | 75 | N00-N08 | Pediaater, Nefroloog | | | | |
| | | | | | 75 | K50-K51, K73-K74 | Pediaater, Gastroenteroloog | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| 100 | G70-G70 | Pediaater, Neuroloog | esmane | | | | | | | | |
| 1005736 | aselaiinhape, 200mg 1g | D10AX03 | SKINOREN, kreem, 30g 1TK | Bayer Pharma AG | 50 | | | | | | |
| 1019809 | asitromütsiin, 20mg 1ml | J01FA10 | SUMAMED, suukaudse suspensiooni pulber, 20ml 1TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E84-E84 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1019775 | asitromütsiin, 250mg | J01FA10 | SUMAMED, kõvakapsel, 6TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E84-E84 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1184914 | asitromütsiin, 250mg | J01FA10 | AZITHROMYCIN SANDOZ 250MG, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK | Sandoz GmbH | 100 | E84-E84 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1614439 | asitromütsiin, 250mg | J01FA10 | AZITHROMYCIN KRKA, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK | KRKA d.d., Novo mesto | 100 | E84-E84 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1373396 | asitromütsiin, 2g | J01FA10 | ZITRAVAL, suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 1TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E84-E84 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1168130 | asitromütsiin, 40mg 1ml | J01FA10 | SUMAMED FORTE, suukaudse suspensiooni pulber, 15ml 1TK | Teva Pharma B.V. | 100 | E84-E84 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1267309 | asitromütsiin, 40mg 1ml | J01FA10 | SUMAMED FORTE, suukaudse suspensiooni pulber, 30ml 1TK | Teva Pharma B.V. | 100 | E84-E84 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1019797 | asitromütsiin, 500mg | J01FA10 | SUMAMED, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK | Teva Pharma B.V. | 100 | E84-E84 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1113398 | asitromütsiin, 500mg | J01FA10 | AZITROX 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK | Zentiva k.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E84-E84 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1184992 | asitromütsiin, 500mg | J01FA10 | AZITHROMYCIN SANDOZ 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK | Sandoz GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E84-E84 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1549548 | asitromütsiin, 500mg | J01FA10 | AZITHROMYCIN GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK | AS Grindeks | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E84-E84 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1563342 | asitromütsiin, 500mg | J01FA10 | AZITHROMYCIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E84-E84 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|--|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1614451 | asitromütsiin, 500mg | J01FA10 | AZITHROMYCIN KRKA, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK | KRKA d.d., Novo mesto | 100 | E84-E84 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1045796 | aspart-insuliin, 100ühik 1ml | A10AB05 | NOVORAPID PENFILL, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK | Novo Nordisk A/S | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1084788 | aspart-insuliin, 100ühik 1ml | A10AD05 | NOVOMIX 30 FLEXPEN, süstesuspensioon pen-süstlis, 3ml 5TK | Novo Nordisk A/S | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1092541 | aspart-insuliin, 100ühik 1ml | A10AB05 | NOVORAPID FLEXPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK | Novo Nordisk A/S | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1007851 | atenolool, 100mg | C07AB03 | ATENOLOL-RATIOPHARM 100MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| 1007895 | atenolool, 25mg | C07AB03 | ATENOLOL-RATIOPHARM 25MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| 1007873 | atenolool, 50mg | C07AB03 | ATENOLOL-RATIOPHARM 50MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1190708 | atomoksetiin, 10mg | N06BA09 | STRATTERA, kõvakapsel, 28TK | Eli Lilly Holdings Limited | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | | 6,00 | 20,00 | ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19- aastastele lastele ja noorukitele aktiivsus- ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C- GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on vastunäidustatud, |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| | | | | | | | | | | | ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00 | | vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1190742 | atomoksetiin, 18mg | N06BA09 | STRATTERA, kõvakapsel, 28TK | Eli Lilly Holdings Limited | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | | 6,00 | 20,00 | ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19- aastastele lastele ja noorukitele aktiivsus- ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C- GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on vastunäidustatud, |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| | | | | | | | | | | | ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00 | | vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1190786 | atomoksetiin, 25mg | N06BA09 | STRATTERA, kõvakapsel, 28TK | Eli Lilly Holdings Limited | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | | 6,00 | 20,00 | ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19- aastastele lastele ja noorukitele aktiivsus- ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C- GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on vastunäidustatud, |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| | | | | | | | | | | | ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00 | | vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1190821 | atomoksetiin, 40mg | N06BA09 | STRATTERA, kõvakapsel, 28TK | Eli Lilly Holdings Limited | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | | 6,00 | 20,00 | ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19- aastastele lastele ja noorukitele aktiivsus- ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C- GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on vastunäidustatud, |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| | | | | | | | | | | | ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00 | | vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1190865 | atomoksetiin, 60mg | N06BA09 | STRATTERA, kõvakapsel, 28TK | Eli Lilly Holdings Limited | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00 | | vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20- aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| | | | | | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | | 6,00 | 20,00 | ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19-aastastele lastele ja noorukitele aktiivsuse ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| | | | | | | | | | | | vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1299618 | atomoksetiin, 80mg | N06BA09 | STRATTERA, kõvakapsel, 28TK | Eli Lilly Holdings Limited | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | | 6,00 | 20,00 | ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19- aastastele lastele ja noorukitele aktiivsus- ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoterapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C- GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on vastunäidustatud, |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|---|
| | | | | | | | | | | | ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00 | | vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul |
| 1138047 | atorvastatiin, 10mg | C10AA05 | ATORIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | I11-I12 | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | | alates III staadiumist |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused | |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|--|--|
| 1180213 | atorvastatiin, 10mg | C10AA05 | TORVACARD 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva k.s. | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | | |
| 1253607 | atorvastatiin, 10mg | C10AA05 | ATORVASTATIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Actavis Group Hf | 75 | I11-I12 | | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | | |
| | | | | | 50 | | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1397741 | atorvastatiin, 10mg | C10AA05 | TULIP 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |
| 1410657 | atorvastatiin, 10mg | C10AA05 | ATORVASTATIN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused | |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|------------------------|
| 1492185 | atorvastatiin, 10mg | C10AA05 | ATORVASTATIN MEDOCHEMIE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Medochemie Ltd. | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | | |
| 1541911 | atorvastatiin, 10mg | C10AA05 | ATORVASTATIN BILLEV, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Billev Pharma ApS | 100 | N18-N18 | | | | | | alates III staadiumist |
| | | | | | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|--|
| 1138058 | atorvastatiin, 20mg | C10AA05 | ATORIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | I11-I12 | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1180235 | atorvastatiin, 20mg | C10AA05 | TORVACARD 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva k.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1253742 | atorvastatiin, 20mg | C10AA05 | ATORVASTATIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Actavis Group Hf | 100 | N18-N18 | | | | | alates III staadiumist |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| 1397909 | atorvastatiin, 20mg | C10AA05 | TULIP 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75 | I11-I12 | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1397932 | atorvastatiin, 20mg | C10AA05 | TULIP 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| 1410792 | atorvastatiin, 20mg | C10AA05 | ATORVASTATIN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|------------------------|
| 1492679 | atorvastatiin, 20mg | C10AA05 | ATORVASTATIN MEDOCHEMIE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Medochemie Ltd. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | | alates III staadiumist |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |
| 1542057 | atorvastatiin, 20mg | C10AA05 | ATORVASTATIN BILLEV, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Billev Pharma ApS | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused | |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|---|
| 1220993 | atorvastatiin, 40mg | C10AA05 | ATORIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 50 | | | | | | | |
| 1253887 | atorvastatiin, 40mg | C10AA05 | ATORVASTATIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Actavis Group Hf | 75 | I11-I12 | | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
| | | | | | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|------------------------|
| 1410927 | atorvastatiin, 40mg | C10AA05 | ATORVASTATIN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 100 | N18-N18 | | | | | alates III staadiumist |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |
| 1492826 | atorvastatiin, 40mg | C10AA05 | ATORVASTATIN MEDOCHEMIE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Medochemie Ltd. | 100 | N18-N18 | | | | | alates III staadiumist |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused | |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|---|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|---|
| 1542192 | atorvastatiin, 40mg | C10AA05 | ATORVASTATIN BILLEV, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Billev Pharma ApS | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | | | alates III staadiumist |
| | | | | | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| 1124996 | atorvastatiin, 80mg | C10AA05 | SORTIS 80 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pfizer Europe MA EEIG | 100 | N18-N18 | | | | | | alates III staadiumist |
| | | | | | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| 1039250 | atsetüültsüsteiin, 600mg | R05CB01 | ACC LONG, kihisev tablett, 10TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50 | J84-J84 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E84-E84 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | | | |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-------------|--|----------|---|--|--------------|---|------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1013623 | atsikloviir, 200mg | J05AB01 | ACIC 200 MG, tablett, 25TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 100 | D60-D64 | Pediaater, Hematoloog | | | | |
| 1006625 | atsikloviir, 30mg 1g | S01AD03 | ZOVIRAX, silmasalv, 4.5g 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 50 | | | | | | |
| 1165384 | atsikloviir, 400mg | J05AB01 | ACIC 400 MG, tablett, 35TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 100 | D60-D64 | Pediaater, Hematoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| 1000731 | atsitreiin, 10mg | D05BB02 | NEOTIGASON, kõvakapsel, 30TK | Actavis Group PTC ehf | 75 | L40-L40, M07-M07, L86-L86, Q80-Q80, Q82.8-Q82.8 | Dermatoveneroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1019483 | batsitrasiin+neomütsiin, 250RÜ+5000RÜ 1g | D06AX80 | BANEOCIN, salv, 20g 1TK | Sandoz GmbH | 50 | | | | | | |
| 1212893 | beeta-1a-interferoon, 30mcg 0.5ml | L03AB07 | AVONEX, süstelahus, 0.5ml 4TK | Biogen Idec Limited | 100 | G35-G35 | Neuroloog | esmane | | | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks |
| 1117640 | beeta-1a-interferoon, 44mcg 0.5ml | L03AB07 | REBIF, süstelahus süstlis, 0.5ml 12TK | Merck Serono Europe Limited | 100 | G35-G35 | Neuroloog | esmane | | | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks |
| 1430671 | beeta-1a-interferoon, 44mcg 0.5ml | L03AB07 | REBIF, süstelahus kolbampullis, 1.5ml 4TK | Merck Serono Europe Limited | 100 | G35-G35 | Neuroloog | esmane | | | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks |
| 1591286 | beeta-1a-interferoon, 60mcg 1ml | L03AB07 | AVONEX PEN, süstelahus pen-süstlis, 0.5ml 4TK | Biogen Idec Limited | 100 | G35-G35 | Neuroloog | esmane | | | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|-------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1657953 | beeta-1a- peginterferoon, 125mcg 0.5ml | L03AB13 | PLEGRIDY, süstelahus, 0.5ml 2TK | Biogen Idec Limited | 100 | G35-G35 | Neuroloog | esmane | | | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1657975 | beeta-1a- peginterferoon, 63mcg/94mcg 0.5ml | L03AB13 | PLEGRIDY, süstelahus, 1TK / 1TK | Biogen Idec Limited | 100 | G35-G35 | Neuroloog | esmane | | | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1071245 | beeta-1b-interferoon, 250mcg 1ml | L03AB08 | BETAFERON, süstelahuse pulber ja lahusti, 15TK | Bayer Pharma AG | 100 | G35-G35 | Neuroloog | esmane | | | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks |
| 1361393 | beeta-1b-interferoon, 300mcg | L03AB08 | EXTAVIA, süstelahuse pulber ja lahusti, 15TK | Novartis Europharm Limited | 100 | G35-G35 | Neuroloog | esmane | | | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks |
| 1205435 | beetaepoetiin, 10000RÜ 0.6ml | B03XA80 | NEORECORMON, süstelahus süstlis, 0.6ml 6TK | Roche Registration Limited | 100 | D46-D46, D47.1- D47.1 | Hematoloog | | | | |
| | | | | | 100 | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Pediaater, Uroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1066384 | beetaepoetiin, 2000RÜ 0.3ml | B03XA80 | NEORECORMON, süstelahus süstlis, 0.3ml 6TK | Roche Registration Limited | 100 | D46-D46, D47.1- D47.1 | Hematoloog | | | | |
| | | | | | 100 | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Pediaater, Nefroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|------------------------------------|----------|---|---|------------------|--------------------------|----------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1061389 | beetaepoetiin, 4000RÜ 0.3ml | B03XA80 | NEORECORMON, süstelahus süstlis, 0.3ml 6TK | Roche Registration Limited | 100 | D46-D46, D47.1- D47.1 | Hematoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog, Pediaater | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| 1061367 | beetaepoetiin, 6000RÜ 0.3ml | B03XA80 | NEORECORMON, süstelahus süstlis, 0.3ml 6TK | Roche Registration Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog, Pediaater | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 100 | D46-D46, D47.1- D47.1 | Hematoloog | | | | |
| 1099403 | beetafollitropiin, 300RÜ 0.36ml | G03GA06 | PUREGON, süstelahus, 0.525ml 1TK | Merck Sharp & Dohme Ltd | 50 | | | | | | |
| 1064045 | beetafollitropiin, 50RÜ 0.5ml | G03GA06 | PUREGON, süstelahus, 0.5ml 5TK | Merck Sharp & Dohme Ltd | 50 | | | | | | |
| 1215111 | beetafollitropiin, 900RÜ 1.08ml | G03GA06 | PUREGON, süstelahus, 1.23ml 1TK | Merck Sharp & Dohme Ltd | 50 | | | | | | |
| 1236912 | beetahistiin, 16mg | N07CA01 | BETAHISTINE ACTAVIS, tablett, 60TK | Actavis Group Hf | 50 | H81-H81 | | | | | |
| 1480878 | beetahistiin, 16mg | N07CA01 | VERTIMED 16MG, tablett, 60TK | Medochemie Ltd. | 50 | H81-H81 | | | | | |
| 1115738 | beetahistiin, 24mg | N07CA01 | BETASERC, tablett, 50TK | BGP Products B.V. | 50 | H81-H81 | | | | | |
| 1480957 | beetahistiin, 24mg | N07CA01 | VERTIMED 24MG, tablett, 50TK | Medochemie Ltd. | 50 | H81-H81 | | | | | |
| 1515833 | beetahistiin, 24mg | N07CA01 | BETAHISTINE ACTAVIS, tablett, 50TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | H81-H81 | | | | | |
| 1620245 | beetahistiin, 24mg | N07CA01 | BETASERC, suus dispergeeruv tablett, 60TK | BGP Products SIA | 50 | | | | | | |
| 1004263 | beetametasoon, 1mg 1g | D07AC01 | BETNOVATE OINTMENT, salv, 15g 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 50 | | | | | | |
| 1004870 | beetametasoon, 1mg 1g | D07AC01 | BETNOVATE CREAM, kreem, 15g 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|-----------------------------|------------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1018448 | beetametasoon, 1mg 1g | D07AC01 | CELESTODERM-V, kreem, 30g 1TK | Merck Sharp & Dohme B.V. | 50 | | | | | | |
| 1018459 | beetametasoon, 1mg 1g | D07AC01 | CELESTODERM-V, salv, 30g 1TK | Merck Sharp & Dohme B.V. | 50 | | | | | | |
| 1007514 | beetametasoon+fusidii nhape, 1mg+20mg 1g | D07CC80 | FUCICORT, kreem, 15g 1TK | LEO Pharma A/S | 50 | | | | | | |
| 1062403 | beetametasoon+salitsü ülhape, 0,5mg+20mg 1g | D07BC80 | DIPROSALIC, nahalahus, 50ml 1TK | Merck Sharp & Dohme B.V. | 50 | | | | | | |
| 1034042 | betaksolool, 2,5mg 1ml | S01ED02 | BETOPTIC S, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK | s.a. Alcon-Couvreur N.V. | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1012194 | bikalutamiid, 150mg | L02BB03 | CASODEX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | AstraZeneca UK Limited | 100 | C61-C61 | Uroloog, Onkoloog | | | | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosset kastratsioonist) |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1258017 | bikalutamiid, 150mg | L02BB03 | BICALUTAMIDE - TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 100 | C61-C61 | Onkoloog, Uroloog | | | | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosset kastratsioonist) |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1266173 | bikalutamiid, 150mg | L02BB03 | BICALUTAMID ACTAVIS 150MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 100 | C61-C61 | Onkoloog, Uroloog | | | | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosset kastratsioonist) |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1026560 | bikalutamiid, 50mg | L02BB03 | CASODEX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | AstraZeneca UK Limited | 100 | C61-C61 | Onkoloog, Uroloog | | | | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoossest kastratsioonist) |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1257803 | bikalutamiid, 50mg | L02BB03 | BICALUTAMIDE - TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 50 | C61-C61 | Onkoloog, Uroloog | | | | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoossest kastratsioonist) |
| | | | | | 100 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1265891 | bikalutamiid, 50mg | L02BB03 | BICALUTAMID ACTAVIS 50MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 100 | C61-C61 | Onkoloog, Uroloog | | | | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosest kastratsioonist) |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1293791 | bikalutamiid, 50mg | L02BB03 | BICALUTAMIDE ACCORD 50MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Accord Healthcare Limited | 50 | C61-C61 | Onkoloog, Uroloog | | | | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosest kastratsioonist) |
| | | | | | 100 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1258983 | bisoprolool, 10mg | C07AB07 | BISOPROLOL VITABALANS, tablett, 30TK | VITABALANS OY | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1596427 | bisoprolool, 10mg | C07AB07 | SOBYCOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| 1258905 | bisoprolool, 5mg | C07AB07 | BISOPROLOL VITABALANS, tablett, 30TK | VITABALANS OY | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1596326 | bisoprolool, 5mg | C07AB07 | SOBYCOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|---|
| 1586718 | bosentaan, 125mg | C02KX01 | BOSENTAN NORAMEDA 125 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | UAB Norameda | 100 | I27.0-I27.0 | Pediaater, Pulmonoloog, Kardioloog, Reumatoloog | | | | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1586684 | bosentaan, 62,5mg | C02KX01 | BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | UAB Norameda | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | Kardioloog, Pulmonoloog, Reumatoloog, Pediaater | | | | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1612055 | bosutiniib, 100mg | L01XE14 | BOSULIF, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Pfizer Limited | 100 | C92.1-C92.1 | Hematoloog | | | | konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru bosutiniibravi foonil). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi bosutiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.07.2016. a. |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1612077 | bosutiniib, 500mg | L01XE14 | BOSULIF, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Pfizer Limited | 100 | C92.1-C92.1 | Hematoloog | | | | konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru bosutiniibravi foonil). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi bosutiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.07.2016. a. |
| 1042782 | brinsolamiid, 10mg 1ml | S01EC04 | AZOPT, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK | Alcon Laboratories (UK) Ltd. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|---------------------|--|------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1657694 | brinsolamiid+brimonidii n, 10mg+1,3mg 1ml | S01EC80 | SIMBRINZA, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK | Alcon Laboratories Ltd | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | kui monoteeraapia sh prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku ja beeta-adrenoblokaator on vastunäidustatud |
| 1008098 | bromokriptiin, 2,5mg | G02CB01; N04BC01 | BROMOCRIPTIN-RICHTER, tablett, 30TK | Gedeon Richter Plc. | 100 | E24-E24, E22-E22 | Pediaater, Endokrinoloog | esmane | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1057542 | budesoniid, 0,1mg 1annust | R03BA02 | PULMICORT TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 200annust 1TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |
| 1038316 | budesoniid, 0,25mg 1ml | R03BA02 | PULMICORT, nebuliseeritav suspensioon, 2ml 20TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |
| 1114827 | budesoniid, 0,2mg 1annust | R03BA02 | PULMICORT TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 100annust 1TK | AstraZeneca AB | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1124390 | budesoniid, 200mcg | R03BA02 | MIFLONIDE, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 60TK | Novartis Finland OY | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |
| 1174160 | budesoniid, 200mcg 1annust | R03BA02 | GIONA EASYHALER, inhalatsioonipulber, 200annust 1TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |
| 1124413 | budesoniid, 400mcg | R03BA02 | MIFLONIDE, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 60TK | Novartis Finland OY | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1174182 | budesoniid, 400mcg 1annust | R03BA02 | GIONA EASYHALER, inhalatsioonipulber, 100annust 1TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |
| 1011070 | budesoniid, 50mcg 1annust | R01AD05 | BUDESONID SANDOZ, ninasprei, suspensioon, 200annust 1TK | Sandoz GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J30-J30 | | | | 17,00 | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused | |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|------------|-----------------|---|
| 1043389 | budesoniid, 64mcg 1annust | R01AD05 | RHINOCORT AQUA, ninasprei, suspensioon, 120annust 1TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | | |
| 1232660 | bupropioon, 150mg | N06AX12 | ELONTRIL, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 30TK | Glaxo Group Ltd. | 50 | F33-F33, F32-F32 | | | | | | |
| 1232693 | bupropioon, 300mg | N06AX12 | ELONTRIL, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 30TK | Glaxo Group Ltd. | 50 | F33-F33, F32-F32 | | | | | | |
| 1005006 | busulfaan, 2mg | L01AB01 | MYLERAN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Aspen Pharma Trading Limited | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | Hematoloog, Pediaater, Onkoloog | | | | | |
| 1343382 | dabigatraaneteksilat, 110mg | B01AE07 | PRADAXA, kõvakapsel, 10TK | Boehringer Ingelheim International GmbH | 75 | S72.0-S72.2, S72.7- S72.7, M16-M17 | | | | | kuni 30 päevaks | |
| | | | | | 50 | | | | | | | |
| 1343393 | dabigatraaneteksilat, 110mg | B01AE07 | PRADAXA, kõvakapsel, 30TK | Boehringer Ingelheim International GmbH | 75 | I48-I48 | | | | | | patsientidele, kellele varfariin on kõrval- või koostoimete tõttu vastunäidustatud, kellel esineb varfariini toime ebastabiilsus (ravi on läbi viidud vähemalt 4 kuu jooksul, millest viimase 3 kuu jooksul on INRi mõõdetud vähemalt 10 korral ja INR on jäänud terapeutilisse vahemikku <60% mõõtmiskordadest) või resistentsus varfariinile (varfariini igapäevane annus >12mg) |
| | | | | | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 75 | S72.0-S72.2, S72.7- S72.7, M16-M17 | | | | | kuni 30 päevaks | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1343405 | dabigatraaneteksilat, 110mg | B01AE07 | PRADAXA, kõvakapsel, 60TK | Boehringer Ingelheim International GmbH | 75 | S72.0-S72.2, S72.7- S72.7, M16-M17 | | | | | kuni 30 päevaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I48-I48 | | | | | patsientidele, kellele varfariin on kõrval- või koostoimete tõttu vastunäidustatud, kellel esineb varfariini toime ebastabiilsus (ravi on läbi viidud vähemalt 4 kuu jooksul, millest viimase 3 kuu jooksul on INRi mõõdetud vähemalt 10 korral ja INR on jäänud terapeutilisse vahemikku <60% mõõtmiskordadest) või resistentsus varfariinile (varfariini igapäevane annus >12mg) |
| 1538759 | dabigatraaneteksilat, 150mg | B01AE07 | PRADAXA, kõvakapsel, 60TK | Boehringer Ingelheim International GmbH | 75 | I48-I48 | | | | | patsientidele, kellele varfariin on kõrval- või koostoimete tõttu vastunäidustatud, kellel esineb varfariini toime ebastabiilsus (ravi on läbi viidud vähemalt 4 kuu jooksul, millest viimase 3 kuu jooksul on INRi mõõdetud vähemalt 10 korral ja INR on jäänud terapeutilisse vahemikku <60% mõõtmiskordadest) või resistentsus varfariinile (varfariini igapäevane annus >12mg) |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|----------|--------|-----------|------------|--|
| 1343359 | dabigatraaneteksilaat, 75mg | B01AE07 | PRADAXA, kõvakapsel, 10TK | Boehringer Ingelheim International GmbH | 75 | S72.0-S72.2, S72.7- S72.7, M16-M17 | | | | | kuni 30 päevaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1343360 | dabigatraaneteksilaat, 75mg | B01AE07 | PRADAXA, kõvakapsel, 30TK | Boehringer Ingelheim International GmbH | 75 | S72.0-S72.2, S72.7- S72.7, M16-M17 | | | | | kuni 30 päevaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1624160 | dabrafeniib, 75mg | L01XE23 | TAFINLAR, kõvakapsel, 120TK | Novartis Europharm Limited | 100 | C43-C43 | Onkoloog | | | | konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) otsuse alusel BRAF V600 mutatsiooniga kaugelearenenud mitteresetseeritava või metastaatilise (IIIc-IV st) melanoomi raviks juhul, kui patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ning eelneva 3 ravikuu järel (ravi alustamisel) ja edaspidi 3-kuulise intervalliga hinnatuna püsib haigus vähemalt stabiilsena (KT- või/ja muu asjakohase uuringu alusel hinnatuna haiguse progressiooni ei esine). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi dabrafeniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.01.2016. |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1598654 | dapaglifloosin, 10mg | A10BX09 | FORXIGA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | AstraZeneca AB | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1598665 | dapaglifloosin, 10mg | A10BX09 | FORXIGA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | AstraZeneca AB | 50 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| | | | | | 75 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|-------------|------------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1675694 | dasabuviir, 250mg | J05AX16 | EXVIERA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | AbbVie Ltd | 100 | B18.2-B18.2 | Infektsionist, Gastroenteroloog | | | | 1. ja 4. genotüübi kroonilise progresseeruva C- viirushepatiidi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel esineb mõõdukas või raske maksafibroos (F2-4) ja kompenseeritud maksahaigus |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1275768 | dasatiniib, 50mg | L01XE06 | SPRYCEL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | 100 | C92.1-C92.1 | Hematoloog | | | | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine dasatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: näidustatud on tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600 mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi), dasatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi dasatiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2009. a. |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|--|--|--------|-----------|------------|---|
| 1258646 | deferasiroks, 250mg | V03AC03 | EXJADE, dispergeeruv tablett, 28TK | Novartis Europharm Limited | 100 | D57-D57, D47.1- D47.1, D56-D56, D60-D61, C81-C96, D46-D46 | Hematoloog | | | | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel järgmistele kriteeriumidele vastavate patsientide raviks: seerumi ferritiinitase on >1000 mcg/l; esineb jätkuv regulaarne vereülekannete vajadus (vähemasti 1 aasta jooksul on manustatud vähemasti 2 erütrotsüütide doosi kuu kohta ning sarnane vereülekannete vajadus püsib) või plaanitakse vereloome tüvirakkude siirdamist; müelodüsplastilise sündroomi või müelofibroosiga (D46, D47.1) patsientide riskiskoor on madal või madal-mõõdukas (IPSS 0-1) |
| 1014972 | deksametasoon, 0,5mg | H02AB02 | DEXAMETHASON KRKA, tablett, 10TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10- L10, L20-L20 | Pediaater, Dermatoveneroloog, Allergoloog- immunoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 100 | E89.6-E89.6, E27- E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25 | Endokrinoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| 1007479 | deksametasoon, 1mg 1ml | S01BA01 | OFTAN DEXA, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK | SANTEN OY | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|-----------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1124288 | deksametasoon, 1mg 1ml | S01BA01 | MAXIDEX, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK | s.a. Alcon-Couvreur N.V. | 50 | | | | | | |
| 1008414 | deksametasoon, 4mg 1ml | H02AB02 | DEXAMETHASON KRKA, süstelahus, 1ml 25TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| 1044379 | deksametasoon+kloor amfenikool, 1mg+2mg 1g | S01CA82 | OFTAN DEXA-CHLORA, silmasalv, 3.5g 1TK | SANTEN OY | 50 | | | | | | |
| 1044368 | deksametasoon+kloor amfenikool, 1mg+2mg 1ml | S01CA82 | OFTAN DEXA-CHLORA, silmatilgad, lahus, 10ml 1TK | SANTEN OY | 50 | | | | | | |
| 1124301 | deksametasoon+neom ütsiin+polümüksiin B, 1mg+3500RÜ+6000R Ü 1ml | S01CA80 | MAXITROL, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK | s.a. Alcon-Couvreur N.V. | 50 | | | | | | |
| 1150276 | deksametasoon+tobra mütsiin, 1mg+3mg 1g | S01CA81 | TOBRADEX, silmasalv, 3.5g 1TK | s.a. Alcon-Couvreur N.V. | 50 | | | | | | |
| 1124266 | deksametasoon+tobra mütsiin, 1mg+3mg 1ml | S01CA81 | TOBRADEX, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK | s.a. Alcon-Couvreur N.V. | 50 | | | | | | |
| 1481857 | denosumab, 60mg 1ml | M05BX04 | PROLIA, süstelahus süstlis, 1ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna ja kellel esineb kaasvalt raske neerupuudulikkus või söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20) |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1513763 | desloratadiin, 5mg | R06AX27 | DESLORATADINE ZENTIVA 5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva k.s. | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|-----------------------|------------------|-------------|--------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1550797 | desloratadiin, 5mg | R06AX27 | DASSELTA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| 1554140 | desloratadiin, 5mg | R06AX27 | DESLORATADINE ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| 1064348 | desmopressiin, 10mcg 1annust | H01BA02 | MINIRIN, ninasprei, lahus, 2.5ml 1TK | FERRING GmbH | 100 | E23.2-E23.2 | Pediaater, Endokrinoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1225594 | desmopressiin, 120mcg | H01BA02 | MINIRIN, suukaudne lüofilisaat, 30TK | FERRING GmbH | 100 | E23.2-E23.2 | Endokrinoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1225561 | desmopressiin, 60mcg | H01BA02 | MINIRIN, suukaudne lüofilisaat, 30TK | FERRING GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E23.2-E23.2 | Endokrinoloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1063303 | desogestrel, 75mcg | G03AC09 | CERAZETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK | N.V. ORGANON | 50 | | | | | | |
| 1505450 | desogestrel, 75mcg | G03AC09 | DESIRETT 75 MCG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | UAB EXELTIS BALTICS | 50 | | | | | | |
| 1589519 | desogestrel, 75mcg | G03AC09 | CERAZETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK | First Pharma OÜ | 50 | | | | | | |
| 1062908 | desogestrel+etünnüülö stradiool, 0,15mg+0,02mg | G03AA09 | MERCILON, tablett, 63TK | N.V. ORGANON | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1062920 | desogestrel+etünnüülö stradiool, 0,15mg+0,02mg | G03AA09 | NOVYNETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK | Gedeon Richter Plc. | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1062863 | desogestrel+etünnüülö stradiool, 0,15mg+0,03mg | G03AA09 | MARVELON, tablett, 63TK | N.V. ORGANON | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|---------------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1062931 | desogestreel+etüünüülö stradiool, 0,15mg+0,03mg | G03AA09 | REGULON, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1584749 | desogestreel+etüünüülö stradiool, 150mcg+20mcg | G03AA09 | DESTELE, tablett, 63TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1584772 | desogestreel+etüünüülö stradiool, 150mcg+30mcg | G03AA09 | DESTELE, tablett, 63TK | Teva Pharma B.V. | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1161458 | desogestreel+etüünüülö stradiool, 25mcg+40mcg/125mc g+30mcg | G03AB05 | GRACIAL, tablett, 21TK / 45TK | Aspen Pharma Trading Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1208045 | detemir-insuliin, 100ühik 1ml | A10AE05 | LEVEMIR FLEXPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK | Novo Nordisk A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| 1007659 | diasepaam, 10mg 2.5ml | N05BA01 | DIAZEPAM DESITIN, rektaallahus, 5TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 50 | | | | | | |
| 1007682 | diasepaam, 5mg 2.5ml | N05BA01 | DIAZEPAM DESITIN, rektaallahus, 5TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 50 | | | | | | |
| 1385276 | dienogest, 2mg | G03DB08 | VISANNETTE, tablett, 28TK | Bayer Pharma AG | 50 | | | | | | |
| 1066834 | dienogest+etüünüülöstr adiool, 2mg+0,03mg | G03AA16 | JEANINE, kaetud tablett, 21TK | Bayer Pharma AG | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1305818 | dienogest+etüünüülöstr adiool, 2mg+0,03mg | G03AA16 | AMMILY 2 MG / 0,03 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK | UAB Orivas | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused | |
|-----------------|---|----------|---|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|---|--|
| 1587146 | dienogest+etüüülöstr adiool, 2mg+0,03mg/0+0 | G03AA16 | SIBILLA PLUS, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK / 21TK | Gedeon Richter Plc. | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral | |
| | | | | | 50 | | | | | | | |
| 1070592 | digoksiin, 0,25mg | C01AA05 | DIGOXIN-GRINDEKS, tablett, 50TK | AS Grindeks | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | | |
| 1222209 | digoksiin, 0,25mg | C01AA05 | DIGOXIN NYCOMED 0,25 MG, tablett, 60TK | Takeda Pharma AS | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | | |
| 1222197 | digoksiin, 62,5mcg | C01AA05 | DIGOXIN NYCOMED 62,5 MCG, tablett, 60TK | Takeda Pharma AS | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | | |
| 1361786 | dihüdrokodeiin, 60mg | N02AA08 | DHC CONTINUS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 10TK | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. | 50 | | | | | | | |
| 1016109 | diklofenak, 100mg | M01AB05 | DICLOBERL RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | | 63,00 | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | | |
| 1017133 | diklofenak, 100mg | M01AB05 | DICLOFENAC-RATIOPHARM 100 MG, rektaalsuposiit, 10TK | ratiopharm GmbH | 75 | M15-M19 | | | | 63,00 | | |
| | | | | | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | | |
| 1032589 | diklofenak, 100mg | M01AB05 | DICLOMELAN RETARD 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | | 63,00 | | | |
| 1039632 | diklofenak, 100mg | M01AB05 | OLFEN DEPOCAPS, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 20TK | MEPHA Lda. | 75 | M15-M19 | | | | 63,00 | | |
| | | | | | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1078163 | diklofenak, 100mg | M01AB05 | DICLAC 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | 63,00 | | | |
| 1594425 | diklofenak, 100mg | M01AB05 | NAKLOFEN SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | 63,00 | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | | | | | |
| 1594436 | diklofenak, 100mg | M01AB05 | NAKLOFEN SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | M15-M19 | | | 63,00 | | |
| | | | | | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1071920 | diklofenak, 150mg | M01AB05 | DICLAC ID 150 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 20TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75 | M15-M19 | | | 63,00 | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1071942 | diklofenak, 150mg | M01AB05 | DICLAC ID 150 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 100TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | 63,00 | | | |
| 1072279 | diklofenak, 150mg | M01AB05 | DICLOFENAC-RATIOPHARM UNO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 20TK | ratiopharm GmbH | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | 63,00 | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1072280 | diklofenak, 150mg | M01AB05 | DICLOFENAC-RATIOPHARM UNO, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 50TK | ratiopharm GmbH | 75 | M15-M19 | | | 63,00 | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| 1002520 | diklofenak, 50mg | M01AB05 | CATAFLAM, kaetud tablett, 20TK | Novartis Finland OY | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | | 63,00 | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | | | | | |
| 1032590 | diklofenak, 50mg | M01AB05 | DICLOMELAN 50 MG, gastroresistentne tablett, 10TK | G.L. Pharma GmbH | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | | 63,00 | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| 1072213 | diklofenak, 50mg | M01AB05 | DICLOFENAC-RATIOPHARM 50MG, gastroresistentne tablett, 50TK | ratiopharm GmbH | 75 | M15-M19 | | | 63,00 | | |
| | | | | | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1073999 | diklofenak, 50mg 1g | M02AA15 | DICLAC 5%, geel, 100g 1TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50 | | | | | | |
| 1012048 | diklofenak, 75mg | M01AB05 | OLFEN DEPOTABS, toimeainet prolongeeritud vabastav tablett, 30TK | MEPHA Lda. | 75 | M15-M19 | | | 63,00 | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | | | | | |
| 1071986 | diklofenak, 75mg | M01AB05 | DICLAC ID 75 MG, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 100TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | | 63,00 | | |
| | | | | | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|----------------------------|------------------|-------------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1088399 | diklofenak+misoprosto ol, 50mg+0,2mg | M01AB80 | ARTHROTEC, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 60TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| 1031634 | diltiaseem, 180mg | C08DB01 | DILTIAZEM LANNACHER, toimeainet prolongeeritud vabastav tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1031645 | diltiaseem, 90mg | C08DB01 | DILTIAZEM LANNACHER, toimeainet prolongeeritud vabastav tablett, 20TK | G.L. Pharma GmbH | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1028214 | doksasosiin, 2mg | C02CA04 | CARDURA, tablett, 30TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| 1071391 | doksasosiin, 2mg | C02CA04 | KAMIREN, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| 1028225 | doksasosiin, 4mg | C02CA04 | CARDURA, tablett, 30TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| 1071379 | doksasosiin, 4mg | C02CA04 | KAMIREN, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| 1129799 | doksasosiin, 4mg | C02CA04 | CARDURA XL 4MG, toimeainet prolongeeritud vabastav tablett, 30TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| 1205895 | doksasosiin, 4mg | C02CA04 | DOXALFA, toimeainet prolongeeritud vabastav tablett, 28TK | Stada Arzneimittel AG | 50 | | | | | | |
| 1325360 | doksasosiin, 4mg | C02CA04 | DOXAZOSIN TEVA 4 MG, toimeainet prolongeeritud vabastav tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| 1018303 | doksütsükliin, 100mg | J01AA02 | DOXYCYCLIN STADA, tablett, 10TK | Stada Arzneimittel AG | 100 | A50-A53 | Dermatoveneroloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1065877 | doksütsükliin, 100mg | J01AA02 | DOXYCYCLINE VITABALANS, tablett, 10TK | VITABALANS OY | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | A50-A53 | Dermatoveneroloog | | | | |
| 1065899 | doksütsükliin, 100mg | J01AA02 | DOXYLAN, tablett, 10TK | G.L. Pharma GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | A50-A53 | Dermatoveneroloog | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1144976 | doksütsükliin, 100mg | J01AA02 | DOXY-M-RATIOPHARM 100 MG, tablett, 10TK | ratiopharm GmbH | 100 50 | A50-A53 | Dermatoveneroloog | | | | |
| 1240366 | domperidoon, 10mg | A03FA03 | DOMPERIDON ACTAVIS, tablett, 30TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| 1324662 | domperidoon, 10mg | A03FA03 | OROPERIDYS 10 MG, suus dispergeeruv tablett, 30TK | Pierre Fabre Medicament | 50 | | | | | | |
| 1292206 | donepesiil, 10mg | N06DA02 | DONEPEZIL ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| 1313053 | donepesiil, 10mg | N06DA02 | DONEPEZIL ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| 1391217 | donepesiil, 10mg | N06DA02 | DONEPEZIL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Accord Healthcare Limited | 50 | | | | | | |
| 1453924 | donepesiil, 10mg | N06DA02 | YASNAL Q-TAB, suus dispergeeruv tablett, 28TK | Krka, d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| 1481240 | donepesiil, 10mg | N06DA02 | DIVARE 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Zentiva k.s. | 50 | | | | | | |
| 1292105 | donepesiil, 5mg | N06DA02 | DONEPEZIL ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| 1312535 | donepesiil, 5mg | N06DA02 | DONEPEZIL ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| 1391116 | donepesiil, 5mg | N06DA02 | DONEPEZIL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Accord Healthcare Limited | 50 | | | | | | |
| 1453823 | donepesiil, 5mg | N06DA02 | YASNAL Q-TAB, suus dispergeeruv tablett, 28TK | Krka, d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| 1481105 | donepesiil, 5mg | N06DA02 | DIVARE 5MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Zentiva k.s. | 50 | | | | | | |
| 1014961 | dorsolamiid, 2% | S01EC03 | TRUSOPT, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|--------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1420108 | dorsolamiid, 20mg 1ml | S01EC03 | DORZOLAMIDE ELVIM, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK | SIA ELVIM | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1454093 | dronedaroon, 400mg | C01BD07 | MULTAQ, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | sanofi-aventis groupe | 50 | | Kardioloog | esmane | | | ravimi esmase väljakirjutamise õigus kardioloogil siinusrütmi säilitamiseks kodade virvendusarütmia puhul pärast kardioversiooni, kui teised antiarütmikumid on ebasobivad (IC klassi antiarütmikumid ja sotalool on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning amiodaroon on vastunäidustatud) ning patsiendil ei esine südamepuudulikkust ega vasaku vatsakese düsfunktsiooni |
| 1220487 | drospirenoon+etünnüülö stradiool, 3mg+0,02mg | G03AA12 | YASMINELLE, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK | Bayer Pharma AG | 50 | | | | | | |
| 1330759 | drospirenoon+etünnüülö stradiool, 3mg+0,02mg | G03AA12 | MADELEINE, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1331019 | drospirenoon+etünnüülö stradiool, 3mg+0,02mg | G03AA12 | JANGEE 0,02 MG/3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK | Ladee Pharma Baltics UAB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1316090 | drospirenoon+etünnüülö stradiool, 3mg+0,02mg/0+0 | G03AA12 | YAZ, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK / 24TK | Bayer Pharma AG | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|-----------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1043536 | drospirenoon+etünnüülö stradiool, 3mg+0,03mg | G03AA12 | YARINA, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK | Bayer Pharma AG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1331053 | drospirenoon+etünnüülö stradiool, 3mg+0,03mg | G03AA12 | JANGEE 0,03 MG/3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK | Ladee Pharma Baltics UAB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1165711 | drospirenoon+östradiool, 2mg+1mg | G03FA17 | ANGELIQ, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Bayer Pharma AG | 50 | | | | | | |
| 1195624 | duloksetiin, 30mg | N06AX21 | CYMBALTA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK | Eli Lilly Nederland B.V. | 50 | | | | | | |
| 1660643 | duloksetiin, 30mg | N06AX21 | DULSEVIA, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK | Krka, d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| 1660834 | duloksetiin, 30mg | N06AX21 | DULOXETINE TEVA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK | Teva B.V. | 50 | | | | | | |
| 1694921 | duloksetiin, 30mg | N06AX21 | DULOXETINE ZENTIVA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK | Zentiva k.s. | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1195635 | duloksetiin, 60mg | N06AX21 | CYMBALTA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK | Eli Lilly Nederland B.V. | 75 | G63.2-G63.2 | Endokrinoloog, Neuroloog | esmane | | | ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1660733 | duloksetiin, 60mg | N06AX21 | DULSEVIA, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK | Krka, d.d., Novo mesto | 75 | G63.2-G63.2 | Neuroloog, Endokrinoloog | esmane | | | ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1661015 | duloksetiin, 60mg | N06AX21 | DULOXETINE TEVA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK | Teva B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | G63.2-G63.2 | Endokrinoloog, Neuroloog | esmane | | | ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
| 1694954 | duloksetiin, 60mg | N06AX21 | DULOXETINE ZENTIVA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK | Zentiva k.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | G63.2-G63.2 | Endokrinoloog, Neuroloog | esmane | | | ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
| 1155440 | dutasteriid, 0,5mg | G04CB02 | AVODART, pehmekapsel, 30TK | GlaxoSmithKline Eesti OÜ | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|-------------------------|------------------|--|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1054752 | düdrogesteron, 10mg | G03DB01 | DUPHASTON, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | BGP Products B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97 | Endokrinoloog, GÜnekoloog | esmane | | 50,00 | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana |
| 1529344 | düdrogesteron, 10mg | G03DB01 | DUPHASTON, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | First Pharma OÜ | 100 | E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97 | GÜnekoloog, Endokrinoloog | esmane | | 50,00 | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1013803 | düdrogesteron+östra diool, 0+1mg/10mg+1mg | G03FB08 | FEMOSTON, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK / 14TK | BGP Products B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97 | Endokrinoloog, GÜnekoloog | esmane | | 50,00 | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana |
| 1375332 | düdrogesteron+östra diool, 2,5mg+0,5mg | G03FA14 | FEMOSTON CONTI 0,5 MG/2,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Mylan Healthcare GmbH | 100 | E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97 | GÜnekoloog, Endokrinoloog | esmane | | 50,00 | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1082528 | düdrogesteron+östra diool, 5mg+1mg | G03FA14 | FEMOSTON CONTI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | BGP Products B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97 | GÜnekoloog, Endokrinoloog | esmane | | 50,00 | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana |
| 1077937 | ebastiin, 20mg | R06AX22 | KESTINE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Almirall S.A | 50 | | | | | | |
| 1127898 | efavirens, 600mg | J05AG03 | STOCRIN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Merck Sharp & Dohme Ltd | 50 | | Infektsionist | | | | HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega |
| 1020373 | ekonasool, 150mg | G01AF05 | GYNO-PEVARYL, vaginaalsuposiit, 3TK | Johnson & Johnson UAB | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1039036 | ekonasool, 50mg | G01AF05 | GYNO-PEVARYL, vaginaalsuposiit, 15TK | Johnson & Johnson UAB | 50 | | | | | | |
| 1011148 | eksemestaan, 25mg | L02BG06 | AROMASIN, kaetud tablett, 30TK | Pfizer Enterprises SARL | 100 | C50-C50 | Üldkirurg, Günekoloog, Onkoloog | | | | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1392780 | eksemestaan, 25mg | L02BG06 | ESCEPRAN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Krka d.d. Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C50-C50 | Günekoloog, Onkoloog, Üldkirurg | | | | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks |
| 1392960 | eksemestaan, 25mg | L02BG06 | EXEMESTANE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Accord Healthcare Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C50-C50 | Onkoloog, Günekoloog, Üldkirurg | | | | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks |
| 1395772 | eksemestaan, 25mg | L02BG06 | EXEMESTANE TEVA 25MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C50-C50 | Üldkirurg, Onkoloog, Günekoloog | | | | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks |
| 1423134 | eksemestaan, 25mg | L02BG06 | EXEMESTANE ALVOGEN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Alvogen IPCo S.ar.l. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C50-C50 | Onkoloog, Üldkirurg, Günekoloog | | | | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks |
| 1453632 | eksemestaan, 25mg | L02BG06 | EXEMESTANE SANOSWISS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | UAB SanoSwiss | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C50-C50 | Üldkirurg, Onkoloog, Günekoloog | | | | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1270459 | eksenatiid, 10mcg 40mcl | A10BX04 | BYETTA, süstelahus pen- süstlis, 2.4ml 1TK | AstraZeneca AB | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi raviks rasvumusega patsientidel (KMI \geq 35kg/m ²), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes taluvates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud |
| | | | | | 50 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1533787 | eksenatiid, 2mg | A10BX04 | BYDUREON, toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti pen-süstlis, 4TK | AstraZeneca AB | 50 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi raviks rasvumusega patsientidel (KMI \geq 35kg/m ²), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes taluvates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1270437 | eksenatiid, 5mcg 20mcl | A10BX04 | BYETTA, süstelahus pen- süstlis, 1.2ml 1TK | AstraZeneca AB | 50 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi raviks rasvumusega patsientidel (KMI \geq 35kg/m ²), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes taluvates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|-------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1462003 | eltrombopaag, 25mg | B02BX05 | REVOLADE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Novartis Europharm Limited | 100 | D69.4-D69.4 | | | | | patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektoomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh splenektoomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20 000/µl |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1649000 | empaglifloosin, 10mg | A10BX12 | JARDIANCE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Boehringer Ingelheim International GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| 1649134 | empaglifloosin, 25mg | A10BX12 | JARDIANCE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Boehringer Ingelheim International GmbH | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1010620 | enalapriil, 10mg | C09AA02 | ENAHEXAL 10 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1013599 | enalapriil, 10mg | C09AA02 | BERLIPRIL 10 MG, tablett, 30TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1133929 | enalapriil, 10mg | C09AA02 | ENAP, tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1359974 | enalapriil, 10mg | C09AA02 | ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 30TK | VITABALANS OY | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1010631 | enalapriil, 20mg | C09AA02 | ENAHXAL 20 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1013601 | enalapriil, 20mg | C09AA02 | BERLIPRIL 20 MG, tablett, 30TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1074259 | enalapriil, 20mg | C09AA02 | RENITEC FORTE, tablett, 28TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1087512 | enalapriil, 20mg | C09AA02 | EDNYT, tablett, 30TK | Gedeon Richter Plc. | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1133952 | enalapriil, 20mg | C09AA02 | ENAP, tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1360033 | enalapriil, 20mg | C09AA02 | ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 30TK | VITABALANS OY | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1371080 | enalapriil, 20mg | C09AA02 | RENITEC FORTE, tablett, 98TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1074080 | enalapriil, 5mg | C09AA02 | BERLIPRIL 5 MG, tablett, 50TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|---------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1074226 | enalapriil, 5mg | C09AA02 | RENITEC, tablett, 28TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1087499 | enalapriil, 5mg | C09AA02 | EDNYT, tablett, 30TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1133895 | enalapriil, 5mg | C09AA02 | ENAP, tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1359918 | enalapriil, 5mg | C09AA02 | ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 30TK | VITABALANS OY | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1147564 | enalapriil+hüdrokloroti asiid, 10mg+12,5mg | C09BA02 | ENAP-HL, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1147575 | enalapriil+hüdrokloroti asiid, 10mg+12,5mg | C09BA02 | ENAP-HL, tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1074899 | enalapriil+hüdrokloroti asiid, 10mg+25mg | C09BA02 | CO-RENITEC, tablett, 30TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1147597 | enalapriil+hüdrokloroti asiid, 10mg+25mg | C09BA02 | ENAP-H, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1147609 | enalapriil+hüdrokloroti asiid, 10mg+25mg | C09BA02 | ENAP-H, tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1074888 | enalapriil+hüdrokloroti asiid, 20mg+12,5mg | C09BA02 | CO-RENITEC, tablett, 28TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1129159 | enalapriil+hüdrokloroti asiid, 20mg+12,5mg | C09BA02 | ENAHEXAL COMP 20 MG/12,5 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|-------------------------------------|------------------|---|------------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1151389 | enalapriil+hüdrokloroti asiid, 20mg+12,5mg | C09BA02 | ENAP-HL, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1615700 | enalapriil+hüdrokloroti asiid, 20mg+12,5mg | C09BA02 | CO-RENITEC, tablett, 28TK | First Pharma OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1074901 | enalapriil+hüdrokloroti asiid, 20mg+6mg | C09BA02 | RENITEC PLUS, tablett, 28TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1247509 | entekaviir, 0,5mg | J05AF10 | BARACLUDGE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | 100 | B18.0-B18.1 | Gastroenteroloog, Infektsionist | | | | kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks juhul, kui peginterferoon alfa-2a on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud või talumatu |
| 1247510 | entekaviir, 1mg | J05AF10 | BARACLUDGE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | 100 | B18.0-B18.1 | Gastroenteroloog, Infektsionist | | | | kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks juhul, kui peginterferoon alfa-2a on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud või talumatu |
| 1588844 | epinefriin (adrenaliin), 150mcg 0.3ml | C01CA24 | EPIPEN, süstelahus pen- süstlis, 2ml 1TK | SIA Meda Pharma | 100 | T88.6-T88.6, T78.0- T78.0, T88.2-T88.2, T80.5-T80.6, T78.2- T78.3, L50.0-L50.0 | | | | | |
| 1588866 | epinefriin (adrenaliin), 300mcg 0.3ml | C01CA24 | EPIPEN, süstelahus pen- süstlis, 2ml 1TK | SIA Meda Pharma | 100 | T88.6-T88.6, T78.0- T78.0, T88.2-T88.2, T80.5-T80.6, T78.2- T78.3, L50.0-L50.0 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---|------------------|-------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 7004955 | eritoitesegu, | | MONOGEN, pulber, 400g | Nutricia Ltd | 100 | E71.3-E71.3 | | | | | ravimi väljakirjutamise õigus pika ahelaga rasvhapete beeta-oksüdatsiooni defektide korral |
| 7004911 | eritoitesegu, | | Lipistart , suukaudse lahuse pulber, 400 g | Vitaflo | 100 | E71.3-E71.3 | | | | | ravimi väljakirjutamise õigus pika ahelaga rasvhapete beetaoksüdatsiooni defektide korral |
| 1163720 | erütromütsiin, 10mg 1ml | D10AF02 | AKNEFUG-EL, nahalahus, 50ml 1TK | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|------------------------|---------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|--|---|
| 1162965 | esetimiib, 10mg | C10AX09 | EZETROL, tablett, 28TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | | raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1422335 | esetimiib, 10mg | C10AX09 | EZOLETA, tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | | raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | | alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
| 1087949 | esomeprasool, 20mg | A02BC05 | NEXIUM, gastroresistentne tablett, 14TK | AstraZeneca AB | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1087950 | esomeprasool, 20mg | A02BC05 | NEXIUM, gastroresistentne tablett, 28TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1337891 | esomeprasool, 20mg | A02BC05 | NEXMEZOL 20 MG, gastroresistentne tablett, 28TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1395985 | esomeprasool, 20mg | A02BC05 | ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1396009 | esomeprasool, 20mg | A02BC05 | ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1542338 | esomeprasool, 20mg | A02BC05 | ESOMEPRAZOLE ACTAVIS, gastroresistentne tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1087972 | esomeprasool, 40mg | A02BC05 | NEXIUM, gastroresistentne tablett, 14TK | AstraZeneca AB | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1087983 | esomeprasool, 40mg | A02BC05 | NEXIUM, gastroresistentne tablett, 28TK | AstraZeneca AB | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1337981 | esomeprasool, 40mg | A02BC05 | NEXMEZOL 40 MG, gastroresistentne tablett, 14TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1338005 | esomeprasool, 40mg | A02BC05 | NEXMEZOL 40 MG, gastroresistentne tablett, 28TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 75 | | | | | | |
| 1396098 | esomeprasool, 40mg | A02BC05 | ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 75 | | | | | | |
| 1396111 | esomeprasool, 40mg | A02BC05 | ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 75 | | | | | | |
| 1542462 | esomeprasool, 40mg | A02BC05 | ESOMEPRAZOLE ACTAVIS, gastroresistentne tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1325023 | estsitalopraam, 10mg | N06AB10 | ESCITALOPRAM ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 100 | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1331648 | estsitalopraam, 10mg | N06AB10 | ESCITALOPRAM TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 100 | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1336676 | estsitalopraam, 10mg | N06AB10 | ESLOREX 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva k.s. | 50 | | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 100 | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | | | | | |
| 1336687 | estsitalopraam, 10mg | N06AB10 | ESLOREX 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Zentiva k.s. | 100 | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1400218 | estsitalopraam, 10mg | N06AB10 | ELICEA 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 100 | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1484018 | estsitalopraam, 10mg | N06AB10 | CIRASET 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 100 | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1488540 | estsitalopraam, 10mg | N06AB10 | ESCITALOPRAM ACCORD 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Accord Healthcare Limited | 100 | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1543137 | estsitalopraam, 10mg | N06AB10 | ESTAN, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Medochemie Ltd. | 100 | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1559987 | estsitalopraam, 10mg | N06AB10 | ELICEA Q-TAB 10MG, suus dispergeeruv tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 100 | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | | | | | |
| 1325225 | estsitalopraam, 20mg | N06AB10 | ESCITALOPRAM ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 100 | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1331907 | estsitalopraam, 20mg | N06AB10 | ESCITALOPRAM TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 100 | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|---|------------------|--------------------------|----------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1400320 | estsitalopraam, 20mg | N06AB10 | ELICEA 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 100 | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1488595 | estsitalopraam, 20mg | N06AB10 | ESCITALOPRAM ACCORD 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Accord Healthcare Limited | 100 | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1543407 | estsitalopraam, 20mg | N06AB10 | ESTAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Medochemie Ltd. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1560046 | estsitalopraam, 20mg | N06AB10 | ELICEA Q-TAB 20MG, suus dispergeeruv tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1589171 | etonogestreel, 68mg | G03AC08 | NEXPLANON, implantaat, 1TK | N.V. Organon | 50 | | | | | | |
| 1138621 | etonogestreel+etünüül östradiool, 11,7mg+2,7mg | G02BB01 | NUVARING, vaginaalravivahend, 1TK | N.V. Organon | 50 | | | | | | |
| 1036213 | etoposiid, 100mg | L01CB01 | VEPESID, pehmekapsel, 10TK | Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedelmi Kft. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | Onkoloog, Hematoloog | | | | |
| 1085352 | etorikoksiib, 120mg | M01AH05 | ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50 | | | | | | |
| 1127843 | etorikoksiib, 120mg | M01AH05 | ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50 | | | | | | |
| 1248421 | etorikoksiib, 30mg | M01AH05 | ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50 | | | | | | |
| 1085318 | etorikoksiib, 60mg | M01AH05 | ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50 | | | | | | |
| 1127865 | etorikoksiib, 60mg | M01AH05 | ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50 | | | | | | |
| 1085330 | etorikoksiib, 90mg | M01AH05 | ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1127854 | etorikoksiib, 90mg | M01AH05 | ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50 | | | | | | |
| 1433315 | everoliimus, 10mg | L01XE10 | AFINITOR, tablett, 30TK | Novartis Europharm Limited | 100 | C25-C25 | Onkoloog | | | | patsientidele, kellel ravi alustamine everoliimusega on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud kõrgelt diferentseerunud (täielikult) mitteresetseeritav progresseeruva kuluga pankreasest lähtunud neuroendokriinne kasvaja ning süsteemne keemiaravi ja/või ravi somatostatiini analoogiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|----------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1433281 | everoliimus, 5mg | L01XE10 | AFINITOR, tablett, 30TK | Novartis Europharm Limited | 100 | C25-C25 | Onkoloog | | | | patsientidele, kellel ravi alustamine everoliimusega on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelarenenud kõrgelt diferentseerunud (täielikult) mitteresetseeritav progresseeruva kuluga pankreasest lähtunud neuroendokriinne kasvaja ning süsteemne keemiaravi ja/või ravi somatostatiini analoogiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks |
| 1021330 | faktor VIII inhibiitorist mõõdamineva aktiivsusega hüübimisfaktorid, 1000ühik | B02BD03 | FEIBA, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Baxalta Innovations GmbH | 100 | D68.4-D68.4, D66-D66 | Hematoloog, Pediaater | | | | |
| 1021329 | faktor VIII inhibiitorist mõõdamineva aktiivsusega hüübimisfaktorid, 500ühik | B02BD03 | FEIBA, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Baxalta Innovations GmbH | 100 | D68.4-D68.4, D66-D66 | Hematoloog, Pediaater | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1349300 | febuksostaat, 120mg | M04AA03 | ADENURIC, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 75 | M10-M10 | | | | | juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid) |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1349287 | febuksostaat, 80mg | M04AA03 | ADENURIC, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 75 | M10-M10 | | | | | juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid) |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1012330 | felodipiin, 10mg | C08CA02 | PRESID, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | TEVA Czech Industries s.r.o. | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1019708 | felodipiin, 10mg | C08CA02 | PLENDIL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | AstraZeneca AB | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1174474 | felodipiin, 10mg | C08CA02 | FELODIPIN HEXAL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | HEXAL AG | 50 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | |
| 1012318 | felodipiin, 2,5mg | C08CA02 | PRESID, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | TEVA Czech Industries s.r.o. | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1012329 | felodipiin, 5mg | C08CA02 | PRESID, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | TEVA Czech Industries s.r.o. | 50 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | |
| 1019696 | felodipiin, 5mg | C08CA02 | PLENDIL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | AstraZeneca AB | 50 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|--|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1174373 | felodipiin, 5mg | C08CA02 | FELODIPIN HEXAL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | HEXAL AG | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1029495 | fenobarbitaal, 100mg | N03AA02 | PHENAEMAL, tablett, 50TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1026593 | fenofibraat, 200mg | C10AB05 | LIPANTHYL, kõvakapsel, 30TK | Mylan Medical SAS | 50 | | | | | | |
| 1020340 | fenoksümetüülpenitsillii n, 1000000RÜ | J01CE02 | OSPEN, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK | Sandoz GmbH | 75 | H66-H66, J13-J15 | | | | 16,00 | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1106536 | fenoksümetüülpenitsillii n, 1000000RÜ | J01CE02 | VEPICOMBIN NOVUM 1 000 000 RÜ, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | Takeda Pharma AS | 75 | H66-H66, J13-J15 | | | | 16,00 | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1105951 | fenoksümetüülpenitsillii n, 400000RÜ 5ml | J01CE02 | OSPEN, suukaudne suspensioon, 60ml 1TK | Sandoz GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | H66-H66, J13-J15 | | | | 16,00 | |
| 1044223 | fenoterool, 100mcg 1annust | R03AC04 | BEROTEC N, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annust 1TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 75 | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1009651 | fenoterool+ipratroopiu mbromiid, 50mcg+20mcg 1annust | R03AL01 | BERODUAL N, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annust 1TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 75 | J43-J44 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1346958 | fentanüül, 100mcg | N02AB03 | EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK | Teva B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | Neuroloog, Hematoloog, Anestesioloog, Reumatoloog, Onkoloog | esmane | | | <p>ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neurooloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu</p> |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1400948 | fentanüül, 100mcg | N02AB03 | LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | Onkoloog, Hematoloog, Neuroloog, Reumatoloog, Anestesioloog | esmane | | | <p>ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses</p> <p>opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu</p> |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1223165 | fentanüül, 100mcg 1h | N02AB03 | MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK | Takeda Pharma AS | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | R52.1-R52.1 | Anestesioloog, Reumatoloog, Neuroloog | esmane | | | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1223121 | fentanüül, 12mcg 1h | N02AB03 | MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK | Takeda Pharma AS | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist |
| | | | | | 100 | R52.1-R52.1 | Reumatoloog, Neuroloog, Anestesioloog | esmane | | | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1346970 | fentanüül, 200mcg | N02AB03 | EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK | Teva B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | Neuroloog, Anestesioloog, Reumatoloog, Hematoloog, Onkoloog | esmane | | | <p>ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu</p> |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1400959 | fentanüül, 200mcg | N02AB03 | LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK | Gedeon Richter Plc. | 100 | C00-D48 | Onkoloog, Neuroloog, Reumatoloog, Anestesioloog, Hematoloog | esmane | | | ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1514034 | fentanüül, 200mcg | N02AB03 | BREAKYL, bukaalravimküle, 10TK | Meda Pharma GmbH & Co. KG | 100 | C00-D48 | Neuroloog, Anestesioloog, Reumatoloog, Onkoloog, Hematoloog | esmane | | | ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1223132 | fentanüül, 25mcg 1h | N02AB03 | MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK | Takeda Pharma AS | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | R52.1-R52.1 | Neuroloog, Reumatoloog, Anestesioloog | esmane | | | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1400960 | fentanüül, 300mcg | N02AB03 | LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | Neuroloog, Reumatoloog, Onkoloog, Anestesioloog, Hematoloog | esmane | | | <p>ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neurooloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalentsust) annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu</p> |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1346992 | fentanüül, 400mcg | N02AB03 | EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK | Teva B.V. | 100 | C00-D48 | Neuroloog, Reumatoloog, Onkoloog, Hematoloog, Anestesioloog | esmane | | | ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1400971 | fentanüül, 400mcg | N02AB03 | LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK | Gedeon Richter Plc. | 100 | C00-D48 | Reumatoloog, Neuroloog, Anestesioloog, Hematoloog, Onkoloog | esmane | | | <p>ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalentsust) annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu</p> |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1586796 | fentanüül, 400mcg | N02AB03 | BREAKYL, bukaalravimküle, 10TK | Meda Pharma GmbH & Co. KG | 100 | C00-D48 | Onkoloog, Hematoloog, Neuroloog, Reumatoloog, Anestesioloog | esmane | | | ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opiooni ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1223143 | fentanüül, 50mcg 1h | N02AB03 | MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK | Takeda Pharma AS | 100 | R52.1-R52.1 | Anestesioloog, Reumatoloog, Neuroloog | esmane | | | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1347038 | fentanüül, 600mcg | N02AB03 | EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK | Teva B.V. | 100 | C00-D48 | Reumatoloog, Neuroloog, Onkoloog, Hematoloog, Anestesioloog | esmane | | | ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1400982 | fentanüül, 600mcg | N02AB03 | LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK | Gedeon Richter Plc. | 100 | C00-D48 | Onkoloog, Hematoloog, Reumatoloog, Neuroloog, Anestesioloog | esmane | | | ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1223154 | fentanüül, 75mcg 1h | N02AB03 | MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK | Takeda Pharma AS | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | R52.1-R52.1 | Anestesioloog, Reumatoloog, Neuroloog | esmane | | | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1347016 | fentanüül, 800mcg | N02AB03 | EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK | Teva B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | Anestesioloog, Neuroloog, Hematoloog, Reumatoloog, Onkoloog | esmane | | | <p>ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu</p> |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1400993 | fentanüül, 800mcg | N02AB03 | LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK | Gedeon Richter Plc. | 100 | C00-D48 | Neuroloog, Hematoloog, Onkoloog, Anestesioloog, Reumatoloog | esmane | | | ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opiooni ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1077050 | fenütoiin, 100mg | N03AB02 | PHENHYDAN, tablett, 100TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1300587 | finasteriid, 5mg | G04CB01 | FINASTERIDE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Accord Healthcare Limited | 50 | | | | | | |
| 1338724 | finasteriid, 5mg | G04CB01 | FINASTERIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| 1070637 | flekainiid, 100mg | C01BC04 | TAMBOCOR, tablett, 100TK | Meda AB | 50 | | | | | | |
| 1036954 | flukonasool, 150mg | J02AC01 | DIFLAZON, kõvakapsel, 1TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| 1140275 | flukonasool, 150mg | J02AC01 | FLUCONAZOL NYCOMED 150MG, kõvakapsel, 1TK | Takeda Pharma AS | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1140286 | flukonasool, 150mg | J02AC01 | FLUCONAZOL TAKEDA 150MG, kõvakapsel, 2TK | Takeda Pharma AS | 100 | B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1140703 | flukonasool, 150mg | J02AC01 | FLUCONAZOLE MEDOCHEMIE, kõvakapsel, 1TK | Medochemie Ltd. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| 1144842 | flukonasool, 150mg | J02AC01 | FLUCONAZOLE SANDOZ 150MG, kõvakapsel, 2TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 100 | B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1395165 | flukonasool, 150mg | J02AC01 | FLUCONAZOLE ELVIM, kõvakapsel, 1TK | SIA ELVIM | 100 | B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1395176 | flukonasool, 150mg | J02AC01 | FLUCONAZOLE ELVIM, kõvakapsel, 2TK | SIA ELVIM | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| 1395187 | flukonasool, 150mg | J02AC01 | FLUCONAZOLE ELVIM, kõvakapsel, 4TK | SIA ELVIM | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|--|--|
| 1490688 | flukonasool, 150mg | J02AC01 | FLUCONAZOLE ACTAVIS, kõvakapsel, 1TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44 | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks | |
| 1490699 | flukonasool, 150mg | J02AC01 | FLUCONAZOLE ACTAVIS, kõvakapsel, 2TK | Actavis Group PTC ehf | 100 | B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1531279 | flukonasool, 150mg | J02AC01 | FLUCONAZOLE MEDOCHEMIE, kõvakapsel, 2TK | Medochemie Ltd. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44 | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|-----------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1140691 | flukonasool, 50mg | J02AC01 | FLUCONAZOLE MEDOCHEMIE, kõvakapsel, 7TK | Medochemie Ltd. | 100 | B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1395660 | flukonasool, 50mg | J02AC01 | FLUCONAZOLE ELVIM, kõvakapsel, 7TK | SIA ELVIM | 50 | B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1167971 | fluokortoloon+lidokaiin, 1mg+20mg 1g | C05AA84 | DOLOPROCT 1MG/20MG/G REKTAALKREEM, rektaalkreem, 15g 1TK | Bayer Pharma AG | 50 | | | | | | |
| 1167948 | fluokortoloon+lidokaiin, 1mg+40mg | C05AA84 | DOLOPROCT 1MG/40MG REKTAALSUPOSIIDID, rektaalsuposiit, 10TK | Bayer Pharma AG | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1107122 | fluoksetiin, 20mg | N06AB03 | FLUX, kõvakapsel, 28TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1456691 | fluoksetiin, 20mg | N06AB03 | FLUOXETINE VITABALANS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | VITABALANS OY | 100 | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1456703 | fluoksetiin, 20mg | N06AB03 | FLUOXETINE VITABALANS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | VITABALANS OY | 100 | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1489765 | flupentiksool, 1mg | N05AF01 | FLUANXOL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | H. LUNDBECK A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1006175 | flupentiksool, 20mg 1ml | N05AF01 | FLUANXOL DEPOT, süstelahus, 1ml 1TK | H. LUNDBECK A/S | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1107201 | flupirtiin, 100mg | N02BG07 | KATADOLON, kõvakapsel, 10TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| 1115244 | flupirtiin, 100mg | N02BG07 | KATADOLON, kõvakapsel, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| 1115255 | flupirtiin, 100mg | N02BG07 | KATADOLON, kõvakapsel, 50TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| 1007840 | flutikasoon, 100mcg 1annust | R03BA05 | FLIXOTIDE DISKUS 100 MCG, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|---|------------------|------------------|--|--------|-----------|------------|----------|
| 1007884 | flutikasoon, 250mcg 1annust | R03BA05 | FLIXOTIDE DISKUS 250 MCG, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |
| 1006344 | flutikasoon, 500mcg 1g | D07AC17 | CUTIVATE CREAM, kreem, 15g 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 75 | L40-L40 | Pediaater, Dermatoveneroloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | L23-L23, L20-L20 | Allergoloog- immunoloog, Pediaater, Dermatoveneroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1007233 | flutikasoon, 50mcg 1annust | R01AD08 | FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, ninasprei, suspensioon, 120annust 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 50 | | | | | | |
| 1007862 | flutikasoon, 50mcg 1annust | R03BA05 | FLIXOTIDE DISKUS 50 MCG, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1130690 | flutikasoon, 50mcg 1annust | R03BA05 | FLIXOTIDE INHALER, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annust 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |
| 1004847 | flutikasoon, 50mcg 1g | D07AC17 | CUTIVATE OINTMENT, salv, 15g 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 75 | L40-L40 | Pediaater, Dermatoveneroloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | L23-L23, L20-L20 | Pediaater, Allergoloog- immunoloog, Dermatoveneroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1343034 | flutikasoonfuroaat, 27,5mcg 1annust | R01AD12 | AVAMYS, ninasprei, suspensioon, 120annust 1TK | Glaxo Group Ltd. | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused | |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|---|
| 1011126 | fluvastatiin, 80mg | C10AA04 | LESCOL XL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | Novartis Finland OY | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | | | alates III staadiumist |
| | | | | | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
| 1287187 | fluvastatiin, 80mg | C10AA04 | FLUVASTATIN ACTAVIS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | | | alates III staadiumist |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1529771 | fluvastatiin, 80mg | C10AA04 | FLUVASTATIN ACCORD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | Accord Healthcare Limited | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| 1678057 | fluvastatiin, 80mg | C10AA04 | LESCOL XL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | First Pharma OÜ | 75 | I11-I12 | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| 1039564 | fluvoksamiin, 100mg | N06AB08 | FEVARIN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | BGP Products B.V. | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|-----------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1087152 | formoterool, 12mcg | R03AC13 | FORADIL AEROLIZER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 60TK | Novartis Finland OY | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 75 | J43-J44 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1178939 | formoterool, 12mcg 1annust | R03AC13 | FOMEDA EASYHALER, inhalatsioonipulber, 120annust 1TK | Orion Corporation | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 75 | J43-J44 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1227620 | formoterool, 12mcg 1annust | R03AC13 | ATIMOS, inhalatsiooniaerosool, lahus, 120annust 1TK | Chiesi Pharmaceuticals GmbH | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 75 | J43-J44 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1034064 | formoterool, 4,5mcg 1annust | R03AC13 | OXIS TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK | AstraZeneca AB | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 75 | J43-J44 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1034075 | formoterool, 9mcg 1annust | R03AC13 | OXIS TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK | AstraZeneca AB | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J43-J44 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1669697 | formoterool+aklidiinium bromiid, 11,8mcg+396mcg 1annust | R03AL05 | BRIMICA GENUAIR, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J43-J44 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1314256 | formoterool+beklometa soon, 6mcg+100mcg 1annust | R03AK08 | FOSTER, inhalatsiooniaerosool, lahus, 180annust 1TK | Chiesi Pharmaceuticals GmbH | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J43-J44 | Pulmonoloog | esmane | | | III-IV staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel on viimase 3 aasta jooksul esinenud vähemalt 3 süsteemse glükokortikoidiga ravitud haiguse ägenemist |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|-------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1068443 | formoterool+budesonii d, 4,5mcg+160mcg 1annust | R03AK07 | SYMBICORT TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 120annust 1TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J43-J44 | Pulmonoloog | esmane | | | III-IV staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel on viimase 3 aasta jooksul esinenud vähemalt 3 süsteemse glükokortikoidiga ravitud haiguse ägenemist |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |
| 1611470 | formoterool+budesonii d, 4,5mcg+160mcg 1annust | R03AK07 | BUFOMIX EASYHALER, inhalatsioonipulber, 120annust 1TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J43-J44 | Pulmonoloog | esmane | | | III-IV staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel on viimase 3 aasta jooksul esinenud vähemalt 3 süsteemse glükokortikoidiga ravitud haiguse ägenemist |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |
| 1072505 | formoterool+budesonii d, 4,5mcg+80mcg 1annust | R03AK07 | SYMBICORT TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 120annust 1TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1156250 | formoterool+budesonii d, 9mcg+320mcg 1annust | R03AK07 | SYMBICORT TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 75 | J43-J44 | Pulmonoloog | esmane | | | III-IV staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel on viimase 3 aasta jooksul esinenud vähemalt 3 süsteemse glükokortikoidiga ravitud haiguse ägenemist |
| 1611481 | formoterool+budesonii d, 9mcg+320mcg 1annust | R03AK07 | BUFOMIX EASYHALER, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J43-J44 | Pulmonoloog | esmane | | | III-IV staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel on viimase 3 aasta jooksul esinenud vähemalt 3 süsteemse glükokortikoidiga ravitud haiguse ägenemist |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |
| 1027145 | fosinopriil, 10mg | C09AA09 | MONOPRIL, tablett, 28TK | PharmaSwiss Ceska republika s.r.o | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1193767 | fosinopriil, 10mg | C09AA09 | FOSINOPRIL ACTAVIS, tablett, 28TK | Actavis Nordic A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1027336 | fosinopriil, 20mg | C09AA09 | MONOPRIL, tablett, 28TK | PharmaSwiss Ceska republika s.r.o | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1193891 | fosinopriil, 20mg | C09AA09 | FOSINOPRIL ACTAVIS, tablett, 28TK | Actavis Nordic A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|---|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1107021 | fosinopriil+hüdrokloroti asiid, 20mg+12,5mg | C09BA09 | MONOZIDE, tablett, 28TK | PharmaSwiss Ceska republika s.r.o | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1250581 | fosinopriil+hüdrokloroti asiid, 20mg+12,5mg | C09BA09 | FOSINOPRIL HCT ACTAVIS, tablett, 30TK | Actavis Group Hf | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1161548 | frovatriptaan, 2,5mg | N02CC07 | MIGARD, õhukese polümeerikattega tablett, 2TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 50 | | | | | | |
| 1060399 | furosemiid, 40mg | C03CA01 | FUROSEMID NYCOMED 40 mg, tablett, 100TK | Takeda Pharma AS | 75 | I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| 1039362 | furosemiid, 60mg | C03CA01 | LASIX RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | |
| 1018606 | fusidiinhape, 10mg 1g | S01AA13 | FUCITHALMIC, silmatilgad, suspensioon, 5g 1TK | Amdipharm Limited | 50 | | | | | | |
| 1007727 | fusidiinhape, 20mg 1g | D06AX01 | FUCIDIN 20 mg/g salv, salv, 15g 1TK | LEO Pharma A/S | 50 | | | | | | |
| 1007750 | fusidiinhape, 20mg 1g | D06AX01 | FUCIDIN 20 mg/g kreem, kreem, 15g 1TK | LEO Pharma A/S | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|---|--|
| 1032815 | gabapentiin, 300mg | N03AX12 | NEURONTIN, kõvakapsel, 50TK | Pfizer Europe MA EEIG | 75 | G63.2-G63.2 | Endokrinoloog, Neuroloog | esmane | | | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti, ravimi esmase väljakirjutamise õigus valuravi arstil |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1126055 | gabapentiin, 300mg | N03AX12 | GABAGAMMA 300MG, kõvakapsel, 50TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | G63.2-G63.2 | Endokrinoloog, Neuroloog | esmane | | | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti, ravimi esmase väljakirjutamise õigus valuravi arstil |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müüjiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|--------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|--|---|
| 1125953 | gabapentiin, 400mg | N03AX12 | GABAGAMMA 400MG, kõvakapsel, 50TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | G63.2-G63.2 | Endokrinoloog, Neuroloog | esmane | | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti, ravimi esmase väljakirjutamise õigus valuravi arstil | |
| 1012059 | ganireliks, 0,25mg 0.5ml | H01CC01 | ORGALUTRAN, süstelahus, 0.5ml 1TK | Merck Sharp & Dohme Ltd | 50 | | | | | | |
| 1035098 | gestodeen+etünüülöstr adiool, 0,075mg+0,02mg | G03AA10 | LOGEST, kaetud tablett, 21TK | Bayer Pharma AG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z30-Z30 | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral | |
| 1115716 | gestodeen+etünüülöstr adiool, 0,075mg+0,02mg | G03AA10 | LINDYNETTE 20, kaetud tablett, 63TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z30-Z30 | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral | |
| 1023624 | gestodeen+etünüülöstr adiool, 0,075mg+0,03mg | G03AA10 | FEMODEN, kaetud tablett, 21TK | Bayer Pharma AG | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|---------------------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1115693 | gestodeen+etünüülöstr adiool, 0,075mg+0,03mg | G03AA10 | LINDYNETTE 30, kaetud tablett, 63TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1012149 | gestodeen+etünüülöstr adiool, 60mcg+15mcg | G03AA10 | MIRELLE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Bayer Pharma AG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1510030 | gestodeen+etünüülöstr adiool, 60mcg+15mcg | G03AA10 | VONILLE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Exeltis Baltics, UAB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1062953 | gestodeen+etünüülöstr adiool, 75mcg+20mcg | G03AA10 | HARMONET, kaetud tablett, 63TK | Pfizer Europe MA EEIG | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1364105 | gestodeen+etünüülöstr adiool, 75mcg+20mcg | G03AA10 | GESYTIL 75/20 MIKROGRAMMI, kaetud tablett, 63TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1364138 | gestodeen+etünüülöstr adiool, 75mcg+30mcg | G03AA10 | GESYTIL 75/30 MIKROGRAMMI, kaetud tablett, 63TK | ratiopharm GmbH | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1061334 | glargiin-insuliin, 100ühik 1ml | A10AE04 | LANTUS, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| 1265790 | glargiin-insuliin, 100ühik 1ml | A10AE04 | LANTUS SOLOSTAR, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1664939 | glargiin-insuliin, 100ühik 1ml | A10AE04 | ABASAGLAR, süstelahus kolbampullis, 3ml 10TK | Eli Lilly Regional Operations GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|-----------------------------------|----------|--|---------------------------------------|------------------|--|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1665053 | glargiin-insuliin, 100ühik 1ml | A10AE04 | ABASAGLAR KWIKPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK | Eli Lilly Regional Operations GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| 1684043 | glargiin-insuliin, 300ühik 1ml | A10AE04 | TOUJEO SOLOSTAR, süstelahus pen-süstlis, 1.5ml 5TK | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| 1241244 | glatirameeratsetaat, 20mg 1ml | L03AX13 | COPAXONE, süstelahus süstlis, 1ml 28TK | Teva Pharmaceuticals Limited | 100 | G35-G35 | Neuroloog | esmane | | | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks patsientidele, kellele beetainterferoon on meditsiiniliselt vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks või talumatuks. |
| 1618196 | glatirameeratsetaat, 40mg 1ml | L03AX13 | COPAXONE, süstelahus süstlis, 1ml 12TK | Teva Pharmaceuticals Limited | 100 | G35-G35 | Neuroloog | esmane | | | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks patsientidele, kellele beetainterferoon on meditsiiniliselt vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks või talumatuks |
| 1261066 | gliklasiid, 30mg | A10BB09 | GLICLADA 30 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1261101 | gliklasiid, 30mg | A10BB09 | GLICLADA 30 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 120TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1643778 | gliklasiid, 30mg | A10BB09 | GLICLAZIDE ACTAVIS, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK | Actavis Group PTC ehf | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1350054 | gliklasiid, 60mg | A10BB09 | DIAPREL MR 60MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK | Les Laboratories Servier | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1551822 | gliklasiid, 60mg | A10BB09 | GLICLADA 60 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1551855 | gliklasiid, 60mg | A10BB09 | GLICLADA 60 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 120TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1644601 | gliklasiid, 60mg | A10BB09 | GLICLAZIDE ACTAVIS, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1046405 | gliklasiid, 80mg | A10BB09 | DIAPREL, tablett, 60TK | Les Laboratories Servier | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1084957 | glimepiriid, 1mg | A10BB12 | AMARYL, tablett, 30TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1176948 | glimepiriid, 1mg | A10BB12 | OLTAR 1MG, tablett, 30TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1334821 | glimepiriid, 1mg | A10BB12 | GLIMEPIRIDE ACCORD, tablett, 30TK | Accord Healthcare Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1110328 | glimepiriid, 2mg | A10BB12 | AMARYL, tablett, 30TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1177039 | glimepiriid, 2mg | A10BB12 | OLTAR 2 MG, tablett, 30TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1191709 | glimepiriid, 2mg | A10BB12 | MEGLIMID, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1334865 | glimepiriid, 2mg | A10BB12 | GLIMEPIRIDE ACCORD, tablett, 30TK | Accord Healthcare Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|------------------------------------|----------|---|------------------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1671195 | glimepiriid, 2mg | A10BB12 | AMARYL, tablett, 30TK | First Pharma OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1110339 | glimepiriid, 3mg | A10BB12 | AMARYL, tablett, 30TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1177129 | glimepiriid, 3mg | A10BB12 | OLTAR 3 MG, tablett, 30TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1191787 | glimepiriid, 3mg | A10BB12 | MEGLIMID, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1334900 | glimepiriid, 3mg | A10BB12 | GLIMEPIRIDE ACCORD, tablett, 30TK | Accord Healthcare Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1670992 | glimepiriid, 3mg | A10BB12 | AMARYL, tablett, 30TK | First Pharma OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1125391 | glimepiriid, 4mg | A10BB12 | AMARYL, tablett, 30TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1191844 | glimepiriid, 4mg | A10BB12 | MEGLIMID, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1334944 | glimepiriid, 4mg | A10BB12 | GLIMEPIRIDE ACCORD, tablett, 30TK | Accord Healthcare Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1395121 | glimepiriid, 6mg | A10BB12 | AMARYL, tablett, 30TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1029338 | glipisiid, 10mg | A10BB07 | GLIBENESE GITS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1029349 | glipisiid, 5mg | A10BB07 | GLIBENESE GITS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1201396 | glulisiin-insuliin, 100ühik 1ml | A10AB06 | APIDRA, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1294398 | glulisiin-insuliin, 100ühik 1ml | A10AB06 | APIDRA SOLOSTAR, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|-------------------------------|------------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1165878 | glükagoon, 1mg | H04AA01 | GLUCAGEN 1MG HYPOKIT, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Novo Nordisk A/S | 50 | | | | | | |
| 1326653 | glükoosamiin, 1178mg | M01AX05 | GLUCOSAMIN- RATIOPHARM 1178 MG, suukaudse lahuse pulber, 20TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| 1183687 | glükoosamiin, 400mg | M01AX05 | GLUCOSAMINE PHARMA NORD, kõvakapsel, 90TK | PHARMA NORD ApS | 50 | | | | | | |
| 1183698 | glükoosamiin, 400mg | M01AX05 | GLUCOSAMINE PHARMA NORD, kõvakapsel, 270TK | PHARMA NORD ApS | 50 | | | | | | |
| 1220094 | glükoosamiin, 400mg | M01AX05 | GLUCADOL, õhukese polümeerikattega tablett, 180TK | Takeda Pharma AS | 50 | | | | | | |
| 1595954 | glükopürroonümbromii d, 55mcg 1annust | R03BB06 | SEEBRI BREEZHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 30TK | Novartis Europharm Limited | 75 | J43-J44 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1648403 | gosereliin, 10,8mg | L02AE03 | RESELIGO, implantaat süstlis, 1TK | Alvogen IPCo S.ar.l. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C61-C61 | Onkoloog, Uroloog | | | | lokaalse või lokaalselt levinud ja kõrge riskiga eesnäärmevähiga patsientidele (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel |
| | | | | | 75 | N80-N80 | Günekoloog | | | | III-IV astme endometriooosi põdevatele patsientidele |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------|------------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1002621 | gosereliin, 3,6mg | L02AE03 | ZOLADEX, implantaat, 1TK | AstraZeneca UK Limited | 75 | N80-N80 | Günekoloog | | | | III-IV astme endometriooosi põdevatele patsientidele |
| | | | | | 100 | C61-C61 | Uroloog, Onkoloog | | | | lokaalse või lokaalselt levinud ja kõrge riskiga eesnäärmevähiga patsientidele (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne reseksioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1648425 | gosereliin, 3,6mg | L02AE03 | RESELIGO, implantaat süstlis, 1TK | Alvogen IPCo S.ar.l. | 100 | C61-C61 | Onkoloog, Uroloog | | | | lokaalse või lokaalselt levinud ja kõrge riskiga eesnäärmevähiga patsientidele (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne reseksioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel |
| | | | | | 75 | N80-N80 | Günekoloog | | | | III-IV astme endometriooosi põdevatele patsientidele |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1023950 | granisetron, 1mg | A04AA02 | KYTRIL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Roche Eesti OÜ | 100 | C00-D48 | | | | | suukaudsest keemiaravist põhjustatud iivelduse ja oksendamise profülaktikaks ja raviks juhul, kui metoklopramiid ei ole esmase valikuna soovitatud või see on osutunud ebaefektiivseks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1014680 | haloperidool, 1,5mg | N05AD01 | HALOPERIDOL-RICHTER, tablett, 50TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F33.2-F33.3, F18.4- F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4- F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4- F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00-F09, F20-F29, F32.2- F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4- F12.7, F10.4-F10.7 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1014691 | haloperidool, 2mg 1ml | N05AD01 | HALOPERIDOL-RICHTER, suukaudsed tilgad, lahus, 10ml 1TK | Gedeon Richter Plc. | 100 | F33.2-F33.3, F18.4- F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4- F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4- F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00-F09, F20-F29, F32.2- F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4- F12.7, F10.4-F10.7 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1064674 | haloperidool, 50mg 1ml | N05AD01 | HALOPERIDOL DECANOATE-RICHTER, süstelahus, 1ml 5TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F33.2-F33.3, F18.4- F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4- F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4- F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00-F09, F20-F29, F32.2- F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4- F12.7, F10.4-F10.7 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1014679 | haloperidool, 5mg | N05AD01 | HALOPERIDOL-RICHTER, tablett, 50TK | Gedeon Richter Plc. | 100 | F33.2-F33.3, F18.4- F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4- F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4- F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00-F09, F20-F29, F32.2- F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4- F12.7, F10.4-F10.7 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1054055 | hõbesulfadiiin, 10mg 1g | D06BA01 | SULFARGIN, salv, 50g 1TK | AS Grindeks | 50 | | | | | | |
| 1015434 | hüdroklorotiasiid, 100mg | C03AA03 | HYPOTHIAZID, tablett, 20TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50 | | | | | |
| 1015478 | hüdroklorotiasiid, 25mg | C03AA03 | HYPOTHIAZID, tablett, 20TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50 | | | | | |
| 1008841 | hüdroklorotiasiid+amilo riid, 50mg+5mg | C03EA81 | MODURETIC, tablett, 30TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 100 | N25.1-N25.1 | | | | | |
| 1137013 | hüdrokortisoon, 10mg 1g | D07AA02 | HYDROCORTISONE DAK, salv, 30g 1TK | Takeda Pharma AS | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|--|------------------|---|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1018594 | hüdrokortisoon+fusidiin hape, 10mg+20mg 1g | D07CA83 | FUCIDIN H, kreem, 15g 1TK | LEO Pharma A/S | 50 | | | | | | |
| 1035403 | hüdrokortisoon+kloorh eksidiin, 10mg+10mg 1g | D07BA80 | SIBICORT, kreem, 20g 1TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| 1045145 | hüdrokortisoon+tsiprofl oksatsiin, 10mg+2mg 1ml | S02CA82 | CIPROBAY HC, kõrvatilgad, suspensioon, 10ml 1TK | Alcon Cusi S.A. | 50 | | | | | | |
| 1036022 | hüdroksükarbamiid, 500mg | L01XX05 | HYDREA, kõvakapsel, 100TK | Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | Onkoloog, Hematoloog | | | | |
| 1615698 | hüdroksükarbamiid, 500mg | L01XX05 | HYDREA, kõvakapsel, 100TK | First Pharma OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | Onkoloog, Hematoloog | | | | |
| 1027291 | hüdroksüklorokviin, 200mg | P01BA02 | PLAQUENIL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M45-M46, M08- M08, M30-M35, M05-M06 | Reumatoloog, Pediaater | | | | |
| 1529579 | hüdroksüklorokviin, 200mg | P01BA02 | PLAQUENIL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | First Pharma OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M45-M46, M08- M08, M30-M35, M05-M06 | Reumatoloog, Pediaater | | | | |
| 1566086 | hüdroksüklorokviin, 200mg | P01BA02 | PLAQUENIL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | First Pharma OÜ | 75 | M45-M46, M08- M08, M30-M35, M05-M06 | Reumatoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1400858 | ibandronhape, 150mg | M05BA06 | BAXOGAR, õhukese polümeerikattega tablett, 1TK | Alvogen IPCo S.ar.l. | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1498978 | ibandroonhape, 150mg | M05BA06 | IBANDRONIC ACID TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 1TK | Teva B.V. | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1498989 | ibandroonhape, 150mg | M05BA06 | IBANDRONIC ACID TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK | Teva B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |
| 1073012 | ibuprofeen, 400mg | M01AE01 | IBUMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | VITABALANS OY | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | | 63,00 | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| 1073089 | ibuprofeen, 400mg | M01AE01 | IBUMETIN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Takeda Pharma AS | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | | 63,00 | | |
| | | | | | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | | | | | |
| 1473588 | ibuprofeen, 400mg | M01AE01 | IBUPROFEN LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | G.L. Pharma GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | | 63,00 | | |
| | | | | | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| 1032714 | ibuprofeen, 600mg | M01AE01 | IBUPROFEN LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | | 63,00 | | |
| | | | | | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1073113 | ibuprofeen, 600mg | M01AE01 | IBUMETIN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Takeda Pharma AS | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | 63,00 | | | |
| | | | | | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1085194 | ibuprofeen, 600mg | M01AE01 | IBUMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | VITABALANS OY | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | 63,00 | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| 1085206 | ibuprofeen, 600mg | M01AE01 | IBUMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | VITABALANS OY | 75 | M15-M19 | | | 63,00 | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | | | | | |
| 1473599 | ibuprofeen, 600mg | M01AE01 | IBUPROFEN LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | G.L. Pharma GmbH | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | 63,00 | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|--|
| 1291890 | iloprost, 10mcg 1ml | B01AC11 | VENTAVIS, nebuliseeritav lahus, 1ml 30TK | Bayer Pharma AG | 100 | I27.0-I27.0 | Kardioloog, Pulmonoloog, Reumatoloog, Pediaater | | | | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1291902 | iloprost, 10mcg 1ml | B01AC11 | VENTAVIS, nebuliseeritav lahus, 1ml 168TK | Bayer Pharma AG | 100 | I27.0-I27.0 | Reumatoloog, Pulmonoloog, Pediaater, Kardioloog | | | | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|----------------------|------------|--------|-----------|---|--|
| 1548592 | imatiniiib, 100mg | L01XE01 | IMATINIB ZENTIVA 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | Zentiva k.s. | 100 | C49.9-C49.9, C16-C20 | Onkoloog | | | | patsientidele, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele:diagnoositud KIT-positiivne mitteopereeritav või metastaseerunud pahalooline gastrointestinaalne stromaalruumor ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C92.1-C92.1 | Hematoloog | | | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: näidustatud on tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru) | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1549009 | imatiniiib, 100mg | L01XE01 | IMATINIB SANOSWISS 100MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | UAB SanoSwiss | 100 | C92.1-C92.1 | Hematoloog | | | | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: näidustatud on tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru) |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C49.9-C49.9, C16- C20 | Onkoloog | | | | patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele:diagno ositud KIT-positiivne mitteopereeritav või metastaseerunud pahaloomuline gastrointestinaalne stromaaltruumor ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|----------------------|------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1566413 | imatiniib, 100mg | L01XE01 | MEAXIN, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | Krka d.d. Novo Mesto | 100 | C92.1-C92.1 | Hematoloog | | | | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: näidustatud on tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru) |
| | | | | | 100 | C49.9-C49.9, C16- C20 | Onkoloog | | | | patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele:diagno ositud KIT-positiivne mitteopereeritav või metastaseerunud pahaloomuline gastrointestinaalne stromaaltruumor ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1588417 | imatiniiib, 100mg | L01XE01 | IMATINIB GRINDEKS, kõvakapsel, 120TK | AS Grindeks | 100 | C49.9-C49.9, C16- C20 | Onkoloog | | | | patsientidele, kellele ravi alustamine ja jätkamine imatiniiibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele:diagnoositud KIT-positiivne mitteopereeritav või metastaseerunud pahaloomuline gastrointestinaalne stromaalruumor ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C92.1-C92.1 | Hematoloog | | | | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniiibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: näidustatud on tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniiibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru) |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1604900 | imatiniib, 100mg | L01XE01 | IMATINIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | Teva B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C92.1-C92.1 | Hematoloog | | | | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: näidustatud on tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru) |
| | | | | | 100 | C49.9-C49.9, C16- C20 | Onkoloog | | | | patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele:diagno ositud KIT-positiivne mitteopereeritav või metastaseerinud pahaloomuline gastrointestinaalne stromaaltruumor ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1619726 | imatiniiib, 100mg | L01XE01 | IMATINIB ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | Accord Healthcare Limited | 100 | C49.9-C49.9, C16- C20 | Onkoloog | | | | patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele:diagno ositud KIT-positiivne mitteopereeritav või metastaseerunud pahaloomuline gastrointestinaalne stromaalruumor ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |
| | | | | | 100 | C92.1-C92.1 | Hematoloog | | | | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: näidustatud on tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru) |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------|-----------------|------------------|----------------------|------------|--------|-----------|--|---|
| 1658448 | imatiniib, 100mg | L01XE01 | GLIPOX, kõvakapsel, 120TK | UAB Norameda | 100 | C92.1-C92.1 | Hematoloog | | | | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: näidustatud on tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru) |
| | | | | | 100 | C49.9-C49.9, C16-C20 | Onkoloog | | | patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele:diagnoositud KIT-positiivne mitteopereeritav või metastaseerunud pahaloomuline gastrointestinaalne stromaaltruumor ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1549043 | imatiniiib, 400mg | L01XE01 | IMATINIB SANOSWISS 400MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | UAB SanoSwiss | 100 | C49.9-C49.9, C16- C20 | Onkoloog | | | | patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele:diagno ositud KIT-positiivne mitteopereeritav või metastaseerunud pahaloomuline gastrointestinaalne stromaaltruumor ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C92.1-C92.1 | Hematoloog | | | | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: näidustatud on tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru) |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|----------------------|------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1566446 | imatiniib, 400mg | L01XE01 | MEAXIN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Krka d.d. Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C92.1-C92.1 | Hematoloog | | | | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: näidustatud on tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru) |
| | | | | | 100 | C49.9-C49.9, C16- C20 | Onkoloog | | | | patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele:diagno ositud KIT-positiivne mitteopereeritav või metastaseerinud pahaloomuline gastrointestinaalne stromaaltruumor ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|--|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1658471 | imatiniiib, 400mg | L01XE01 | GLIPOX, kõvakapsel, 30TK | UAB Norameda | 100 | C49.9-C49.9, C16-C20 | Onkoloog | | | | patsientidele, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniiibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele:diagnoositud KIT-positiivne mitteopereeritav või metastaseerunud pahaloomuline gastrointestinaalne stromaalruumor ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C92.1-C92.1 | Hematoloog | | | | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniiibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: näidustatud on tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniiibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru) |
| 7000063 | imikute toitesegu, | | Neocate (aminohapete segu) , pulber, 400 g | N.V. Nutricia | 75 | K52.2-K52.2, L20.8-L20.8, K90.4-K90.4, L27.2-L27.2 | | | 1,00 | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|-------------------------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 7000074 | imikute toitesegu, | | APTAMIL ALLERGY CARE (Aptamil Pepti), pulber, 450 g | N.V. Nutricia | 75 | K52.2-K52.2, L20.8- L20.8, K90.4-K90.4, L27.2-L27.2 | | | | 1,00 | |
| 7000085 | imikute toitesegu, | | APTAMIL DIGESTIVE CARE (Aptamil Pepti MCT), pulber, 450 g | N.V. Nutricia | 75 | K52.2-K52.2, L20.8- L20.8, K90.4-K90.4, L27.2-L27.2 | | | | 1,00 | |
| 7002313 | imikute toitesegu, | | MILUPA APTAMIL FMS, pulber, 200 g | N.V. Nutricia | 75 | P05-P05, E42-E42, P07-P07, P27.1- P27.1 | | | | 0,58 | |
| 7002863 | imikute toitesegu, | | FRISOLAC GOLD PEP AC, pulber, 400g | Friesland Foods BV | 75 | K52.2-K52.2, L20.8- L20.8, K90.4-K90.4, L27.2-L27.2 | | | | 1,00 | |
| 7002874 | imikute toitesegu, | | FRISOLAC GOLD PREMATURE, pulber, 400g | Friesland Foods BV | 75 | P05-P05, E42-E42, P07-P07, P27.1- P27.1 | | | | 0,58 | |
| 7002885 | imikute toitesegu, | | FRISOLAC GOLD PEP, pulber, 400g | Friesland Foods BV | 75 | K52.2-K52.2, L20.8- L20.8, K90.4-K90.4, L27.2-L27.2 | | | | 1,00 | |
| 7004933 | imikute toitesegu, | | APTAMIL PREMATIC, pulber, 400 g | Nutricia Cuijk BV. | 75 | P05-P05, E42-E42, P07-P07, P27.1- P27.1 | | | | 0,58 | |
| 1060322 | imikvimood, 5% | D06BB10 | ALDARA, kreem, 250mg 12TK | Meda AB | 50 | | | | | | |
| 1452169 | indakaterool, 150mcg | R03AC18 | ONBREZ BREEZHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 30TK | Novartis Europharm Limited | 75 | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1452215 | indakaterool, 300mcg | R03AC18 | ONBREZ BREEZHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 30TK | Novartis Europharm Limited | 75 | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1626555 | indakaterool+glükopürr ooniumbromiid, 85mcg+54mcg 1annust | R03AL04 | ULTIBRO BREEZHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 30TK | Novartis Europharm Limited | 75 | J43-J44 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1167780 | indapamiid, 1,5mg | C03BA11 | TERTENSIF SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Les Laboratories Servier | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|--|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1185230 | indapamiid, 1,5mg | C03BA11 | RAWEL SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| 1379741 | indapamiid, 1,5mg | C03BA11 | INDAMAX, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1019416 | indapamiid, 2,5mg | C03BA11 | TERTENSIF, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Les Laboratories Servier | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50 | | | | | |
| 1038383 | indapamiid, 2,5mg | C03BA11 | PROINDAP, kõvakapsel, 30TK | PRO. MED. CS. PRAHA a.s | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50 | | | | | |
| 1071841 | indometatsiin, 50mg | M01AB01 | INDOMET- RATIOPHARM 50MG, kõvakapsel, 50TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | 63,00 | | | |
| | | | | | 75 | M30-M33, M05- M08, M35-M35, M45-M46 | | | | | |
| 1105940 | ipratroopiumbromiid, 20mcg 1annust | R03BB01 | ATROVENT N, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annust 1TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 75 | J43-J44 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |
| 1000348 | isokonasool, 10mg 1g | D01AC05 | TRAVOGEN, kreem, 20g 1TK | Bayer Pharma AG | 50 | | | | | | |
| 1000416 | isokonasool+diflukortol oon, 10mg+1mg 1g | D01AC80 | TRAVOCORT, kreem, 15g 1TK | Bayer Pharma AG | 50 | | | | | | |
| 1015074 | isosorbiitdinitraat, 20mg | C01DA08 | ISDN-RATIOPHARM 20 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK | ratiopharm GmbH | 75 | I20-I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1008964 | isosorbiitdinitraat, 40mg | C01DA08 | ISDN-RATIOPHARM 40 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I20-I20 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|-------------|-------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1005028 | isosorbiitdinitraat, 5mg | C01DA08 | ISDN-RATIOPHARM 5 MG, tablett, 50TK | ratiopharm GmbH | 75 | I20-I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1003712 | isosorbiitmononitraat, 100mg | C01DA14 | MONO MACK DEPOT, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK | Pfizer Europe MA EEIG | 75 | I20-I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1006197 | isosorbiitmononitraat, 20mg | C01DA14 | MONO MACK 20 MG, tablett, 50TK | Pfizer Europe MA EEIG | 75 | I20-I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1146361 | isosorbiitmononitraat, 20mg | C01DA14 | ISOSORBIDE MONONITRATE VITABALANS, tablett, 30TK | VITABALANS OY | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I20-I20 | | | | | |
| 1146372 | isosorbiitmononitraat, 20mg | C01DA14 | ISOSORBIDE MONONITRATE VITABALANS, tablett, 100TK | VITABALANS OY | 75 | I20-I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1006221 | isosorbiitmononitraat, 40mg | C01DA14 | MONO MACK 40 MG, tablett, 50TK | Pfizer Europe MA EEIG | 75 | I20-I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1101913 | isosorbiitmononitraat, 40mg | C01DA14 | OLICARD 40 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK | Mylan Healthcare GmbH | 75 | I20-I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1046786 | isosorbiitmononitraat, 60mg | C01DA14 | IMDUR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I20-I20 | | | | | |
| 1101924 | isosorbiitmononitraat, 60mg | C01DA14 | OLICARD 60 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK | Mylan Healthcare GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I20-I20 | | | | | |
| 1127584 | isosorbiitmononitraat, 60mg | C01DA14 | ISOMONIT 60 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | HEXAL AG | 75 | I20-I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1252741 | isosorbiitmononitraat, 60mg | C01DA14 | ISOMONIT 60 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | HEXAL AG | 75 | I20-I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1004364 | isotretinoiin, 10mg | D10BA01 | ROACCUTANE 10 MG, pehmekapsel, 30TK | Roche Eesti OÜ | 75 | L70.1-L70.2 | Dermatoveneroloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1112230 | isotretinoiin, 20mg | D10BA01 | ROACCUTANE 20 MG, pehmekapsel, 30TK | Roche Eesti OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | L70.1-L70.2 | Dermatoveneroloog | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1164035 | ittrakonasool, 100mg | J02AC02 | PROKANAZOL, kõvakapsel, 4TK | PRO. MED. CS. PRAHA a.s | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| 1164057 | ittrakonasool, 100mg | J02AC02 | PROKANAZOL, kõvakapsel, 28TK | PRO. MED. CS. PRAHA a.s | 100 | B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1230488 | ittrakonasool, 100mg | J02AC02 | ITRACONAZOL ACTAVIS, kõvakapsel, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 100 | B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|--------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1219553 | ivabradiin, 5mg | C01EB17 | PROCORALAN, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Les Laboratoires Servier | 50 | | | | | | |
| 1219485 | ivabradiin, 7,5mg | C01EB17 | PROCORALAN, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Les Laboratoires Servier | 50 | | | | | | |
| 1038068 | IX hüübimisfaktor, 1200RÜ | B02BD04 | IMMUNINE, süste-/infusioonilahuse pulber ja lahusti, 1TK | Baxalta Innovations GmbH | 100 | D67-D67 | Hematoloog, Pediaater | | | | |
| 1038057 | IX hüübimisfaktor, 600RÜ | B02BD04 | IMMUNINE, süste-/infusioonilahuse pulber ja lahusti, 1TK | Baxalta Innovations GmbH | 100 | D67-D67 | Pediaater, Hematoloog | | | | |
| 1093340 | kaltsipotriool+beetamet asoon, 50mcg+0,5mg 1g | D05AX80 | DAIVOBET, salv, 30g 1TK | LEO Pharma A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | L40-L40 | Pediaater, Dermatoveneroloog | esmane | | | |
| 1408036 | kaltsipotriool+beetamet asoon, 50mcg+0,5mg 1g | D05AX80 | XAMIOL, geel, 30g 1TK | LEO Pharma A/S | 75 | L40-L40 | Dermatoveneroloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1534610 | kaltsipotriool+beetamet asoon, 50mcg+0,5mg 1g | D05AX80 | DAIVOBET, geel, 15g 1TK | LEO Pharma A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | L40-L40 | Pediaater, Dermatoveneroloog | esmane | | | |
| 1534621 | kaltsipotriool+beetamet asoon, 50mcg+0,5mg 1g | D05AX80 | DAIVOBET, geel, 30g 1TK | LEO Pharma A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | L40-L40 | Dermatoveneroloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1004599 | kaltsitriool, 0,25mcg | A11CC04 | ROCALTROL, pehmekapsel, 30TK | Roche Eesti OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E89.2-E89.2, E20-E20 | Pediaater, Endokrinoloog | | | | |
| | | | | | 100 | N25-N25, N18-N18 | Pediaater, Nefroloog | | | | |
| 1675931 | kaltsitriool, 0,25mcg | A11CC04 | ROCALTROL, pehmekapsel, 30TK | First Pharma OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | N25-N25, N18-N18 | Nefroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 100 | E89.2-E89.2, E20-E20 | Endokrinoloog, Pediaater | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|---------------------------------|------------------|---|-----------------------------|--------|-----------|---|--|
| 1392016 | kaltsium+kolekaltsifero ol, 500mg+400RÜ | A12AX80 | CALCIGRAN FORTE, närimistablett, 120TK | Takeda Pharma AS | 75 | M80-M80 | | | | | kombinatsioonravi osana patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | | |
| 1046337 | kaltsiumkarbonaat, 1250mg | A12AA04 | CALCIGRAN SINE, närimistablett, 100TK | Takeda Pharma AS | 100 | N18-N18 | | | | | |
| | | | | | 100 | E89.2-E89.2, E20- E20 | Pediaater, Endokrinoloog | | | | |
| 1129519 | kaltsiumnadropariin, 2850RÜ anti Xa 0.3ml | B01AB06 | FRAXIPARINE, süstelahus süstlis, 0.3ml 10TK | Aspen Pharma Trading Limited | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | | kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
| | | | | | 75 | M17-M17, S72.7- S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16- M16, S72.0-S72.0 | | | | kuni 30 päevaks | |
| | | | | | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1065664 | kaltsiumnadropariin, 3800RÜ anti Xa 0.4ml | B01AB06 | FRAXIPARINE, süstelahus süstlis, 0.4ml 10TK | Aspen Pharma Trading Limited | 75 | M17-M17, S72.7- S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16- M16, S72.0-S72.0 | | | | | kuni 30 päevaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel | |
| | | | | | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|---------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|-----------------|
| 1124110 | kaltsiumnadropariin, 5700RÜ anti Xa 0.6ml | B01AB06 | FRAXIPARINE, süstelahus süstlis, 0.6ml 10TK | Aspen Pharma Trading Limited | 75 | M17-M17, S72.7- S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16- M16, S72.0-S72.0 | | | | | kuni 30 päevaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |
| | | | | | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel | |
| 1129496 | kaltsiumnadropariin, 7600RÜ anti Xa 0.8ml | B01AB06 | FRAXIPARINE, süstelahus süstlis, 0.8ml 10TK | Aspen Pharma Trading Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel | |
| | | | | | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |
| | | | | | 75 | M17-M17, S72.7- S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16- M16, S72.0-S72.0 | | | | kuni 30 päevaks | |
| 1035908 | kandesartaan, 16mg | C09CA06 | ATACAND, tablett, 28TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |
| 1291058 | kandesartaan, 16mg | C09CA06 | PRESCANDEN 16MG, tablett, 30TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1455061 | kandesartaan, 16mg | C09CA06 | CANDESARTAN ACTAVIS, tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1475962 | kandesartaan, 16mg | C09CA06 | CANTAR, tablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1487572 | kandesartaan, 16mg | C09CA06 | CARZAN 16MG, tablett, 28TK | Zentiva k.s. | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1497630 | kandesartaan, 16mg | C09CA06 | CANOCORD 16 MG, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|--------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1183867 | kandesartaan, 32mg | C09CA06 | ATACAND, tablett, 28TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |
| 1396458 | kandesartaan, 32mg | C09CA06 | PRESCANDEN 32MG, tablett, 30TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1455140 | kandesartaan, 32mg | C09CA06 | CANDESARTAN ACTAVIS, tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 50 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1476110 | kandesartaan, 32mg | C09CA06 | CANTAR, tablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 75 50 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1487651 | kandesartaan, 32mg | C09CA06 | CARZAN 32MG, tablett, 28TK | Zentiva k.s. | 75 50 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1497719 | kandesartaan, 32mg | C09CA06 | CANOCORD 32 MG, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 50 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1497551 | kandesartaan, 8mg | C09CA06 | CANOCORD 8 MG, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 50 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1589665 | kandesartaan+amlodip iin, 16mg+10mg | C09DB07 | ZENICAMO, tablett, 28TK | Zentiva k.s. | 75 50 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1132591 | kandesartaan+hüdrokl orotiasiid, 16mg+12,5mg | C09DA06 | ATACAND PLUS, tablett, 28TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |
| 1355879 | kandesartaan+hüdrokl orotiasiid, 16mg+12,5mg | C09DA06 | PRESCANDEN HCT 16 MG/12,5 MG, tablett, 28TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1455375 | kandesartaan+hüdrokl orotiasiid, 16mg+12,5mg | C09DA06 | CANDESARTAN HCT ACTAVIS, tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 50 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1487819 | kandesartaan+hüdrokl orotiasiid, 16mg+12,5mg | C09DA06 | CARZAN HCT 16MG/12,5MG, tablett, 28TK | Zentiva k.s. | 50 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|-------------------------------|------------------|------------------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1501063 | kandesartaan+hüdrokl orotiasiid, 16mg+12,5mg | C09DA06 | CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLORO THIAZIDE TEVA, tablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1634419 | kandesartaan+hüdrokl orotiasiid, 16mg+12,5mg | C09DA06 | CANOCOMBI, tablett, 30TK | Krka, d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1634600 | kandesartaan+hüdrokl orotiasiid, 32mg+12,5mg | C09DA06 | CANOCOMBI, tablett, 30TK | Krka, d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1634329 | kandesartaan+hüdrokl orotiasiid, 32mg+25mg | C09DA06 | CANOCOMBI, tablett, 30TK | Krka, d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1634510 | kandesartaan+hüdrokl orotiasiid, 8mg+12,5mg | C09DA06 | CANOCOMBI, tablett, 30TK | Krka, d.d., Novo mesto | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1013319 | kapetsitabiin, 150mg | L01BC06 | XELODA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Roche Registration Limited | 100 | C18-C20 | Onkoloog | | | | kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliativseks monokemoteraapiaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1534205 | kapetsitabiin, 150mg | L01BC06 | CAPECITABINE NORAMEDA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | UAB Norameda | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C18-C20 | Onkoloog | | | | kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliativseks monokemoteraapiaks |
| 1567986 | kapetsitabiin, 150mg | L01BC06 | CAPECITABINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Accord Healthcare Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C18-C20 | Onkoloog | | | | kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliativseks monokemoteraapiaks |
| 1568156 | kapetsitabiin, 150mg | L01BC06 | CAPECITABINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Teva B.V. | 100 | C18-C20 | Onkoloog | | | | kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliativseks monokemoteraapiaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1013308 | kapetsitabiin, 500mg | L01BC06 | XELODA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | Roche Registration Limited | 100 | C18-C20 | Onkoloog | | | | kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliativseks monokemoteraapiaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1534216 | kapetsitabiin, 500mg | L01BC06 | CAPECITABINE NORAMEDA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | UAB Norameda | 100 | C18-C20 | Onkoloog | | | | kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliativseks monokemoteraapiaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1540099 | kapetsitabiin, 500mg | L01BC06 | CAPECITABINE ZENTIVA 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | Zentiva k.s. | 100 | C18-C20 | Onkoloog | | | | kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliativseks monokemoteraapiaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1568055 | kapetsitabiin, 500mg | L01BC06 | CAPECITABINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | Accord Healthcare Limited | 100 | C18-C20 | Onkoloog | | | | kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliativseks monokemoteraapiaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1568167 | kapetsitabiin, 500mg | L01BC06 | CAPECITABINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | Teva B.V. | 50 | C18-C20 | Onkoloog | | | | kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliativseks monokemoteraapiaks |
| | | | | | 100 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1077117 | karbamasepiin, 150mg | N03AF01 | TIMONIL 150 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | G50.0-G50.0 | | | | | |
| 1008649 | karbamasepiin, 200mg | N03AF01 | CARBAMAZEPINE NYCOMED, tablett, 50TK | Takeda Pharma AS | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | G50.0-G50.0 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1035942 | karbamasepiin, 200mg | N03AF01 | FINLEPSIN, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 50TK | Teva Pharma B.V. | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | G50.0-G50.0 | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1036055 | karbamasepiin, 200mg | N03AF01 | FINLEPSIN, tablett, 50TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | G50.0-G50.0 | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1042311 | karbamasepiin, 200mg | N03AF01 | CARBALEX 200 MG, tablett, 50TK | G.L. Pharma GmbH | 100 | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | G50.0-G50.0 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1077207 | karbamasepiin, 300mg | N03AF01 | TIMONIL 300 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | G50.0-G50.0 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1115592 | karbamasepiin, 300mg | N03AF01 | CARBALEX RETARD 300 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK | G.L. Pharma GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | G50.0-G50.0 | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 100 | F18.4-F18.7, F33.2- F33.3, F70-F79, F00-F09, F15.4- F15.7, F14.4-F14.7, F12.4-F12.7, F30- F31, F11.4-F11.7, F60.3-F60.3, F10.4- F10.7, F16.4-F16.7, F32.2-F32.3, F13.4- F13.7, F20-F29, F19.4-F19.7 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1035953 | karbamasepiin, 400mg | N03AF01 | FINLEPSIN, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 50TK | Teva Pharma B.V. | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | G50.0-G50.0 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1042322 | karbamasepiin, 400mg | N03AF01 | CARBALEX 400 MG, tablett, 50TK | G.L. Pharma GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | G50.0-G50.0 | | | | | |
| 1007716 | karbamasepiin, 600mg | N03AF01 | TIMONIL 600 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | G50.0-G50.0 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|--|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1042333 | karbamasepiin, 600mg | N03AF01 | CARBALEX RETARD 600 MG, toimeainet prolongeeritud vabastav tablett, 50TK | G.L. Pharma GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | G50.0-G50.0 | | | | | |
| 1110564 | karvedilool, 12,5mg | C07AG02 | CARVEDILOLHEXAL 12,5 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | |
| 1157543 | karvedilool, 12,5mg | C07AG02 | CORYOL 12,5 MG, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | |
| 1318733 | karvedilool, 12,5mg | C07AG02 | AVEDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | |
| 1110520 | karvedilool, 25mg | C07AG02 | CARVEDILOLHEXAL 25 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1157644 | karvedilool, 25mg | C07AG02 | CORYOL 25 MG, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|-------------------------------------|------------------|---|-----------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1318755 | karvedilool, 25mg | C07AG02 | AVEDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 75 | I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1110609 | karvedilool, 6,25mg | C07AG02 | CARVEDILOLHEXAL 6,25 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1318711 | karvedilool, 6,25mg | C07AG02 | AVEDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1115615 | keskmise toimeajaga humaaninsuliin, 100RÜ 1ml | A10AC01 | HUMULIN N, süstesuspensioon kolbampullis, 3ml 5TK | Eli Lilly Holdings Limited | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1115637 | keskmise toimeajaga humaaninsuliin, 100RÜ 1ml | A10AC01 | HUMULIN N KWIKPEN, süstesuspensioon pen-süstlis, 3ml 5TK | Eli Lilly Holdings Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| 1018189 | ketokonasool, 20mg 1g | D01AC08 | NIZORAL, kreem, 15g 1TK | Johnson & Johnson UAB | 50 | | | | | | |
| 1073461 | ketoprofeen, 100mg | M01AE03 | KETO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | VITABALANS OY | 50 | | | | | | |
| 1073483 | ketoprofeen, 100mg | M01AE03 | KETO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | VITABALANS OY | 50 | | | | | | |
| 1073506 | ketoprofeen, 50mg | M01AE03 | KETO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | VITABALANS OY | 50 | | | | | | |
| 1073517 | ketoprofeen, 50mg | M01AE03 | KETO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | VITABALANS OY | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1486559 | klaritromütsiin, 125mg 5ml | J01FA09 | LEKOKLAR, suukaudse suspensiooni graanulid, 100ml 1TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50 | | | | | | |
| 1028887 | klaritromütsiin, 250mg | J01FA09 | FROMLID, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| 1032747 | klaritromütsiin, 250mg | J01FA09 | KLACID 250 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | BGP Products SIA | 50 | | | | | | |
| 1110261 | klaritromütsiin, 250mg | J01FA09 | KLERIMED 250MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | Medochemie Ltd. | 50 | | | | | | |
| 1549582 | klaritromütsiin, 250mg | J01FA09 | CLARITHROMYCIN GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | AS Grindeks | 50 | | | | | | |
| 1032736 | klaritromütsiin, 25mg 1ml | J01FA09 | KLACID 125 MG/5 ML, suukaudse suspensiooni graanulid, 60ml 1TK | BGP Products SIA | 50 | | | | | | |
| 1068881 | klaritromütsiin, 25mg 1ml | J01FA09 | KLACID 125 MG/5 ML, suukaudse suspensiooni graanulid, 100ml 1TK | BGP Products SIA | 50 | | | | | | |
| 1028876 | klaritromütsiin, 500mg | J01FA09 | FROMLID, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| 1032758 | klaritromütsiin, 500mg | J01FA09 | KLACID SR 500 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 5TK | BGP Products SIA | 50 | | | | | | |
| 1068904 | klaritromütsiin, 500mg | J01FA09 | KLACID SR 500 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 7TK | BGP Products SIA | 50 | | | | | | |
| 1108718 | klaritromütsiin, 500mg | J01FA09 | LEKOKLAR 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50 | | | | | | |
| 1110238 | klaritromütsiin, 500mg | J01FA09 | KLERIMED 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | Medochemie Ltd. | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1141276 | klaritromütsiin, 500mg | J01FA09 | FROMILID UNO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 5TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| 1141287 | klaritromütsiin, 500mg | J01FA09 | FROMILID UNO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 7TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| 1188086 | klaritromütsiin, 500mg | J01FA09 | LEKOKLAR XL 500 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 7TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50 | | | | | | |
| 1405460 | klaritromütsiin, 500mg | J01FA09 | KLACID, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | BGP Products SIA | 50 | | | | | | |
| 1505517 | klaritromütsiin, 500mg | J01FA09 | KLATEX, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 7TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| 1549627 | klaritromütsiin, 500mg | J01FA09 | CLARITHROMYCIN GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | AS Grindeks | 50 | | | | | | |
| 1011160 | klindamütsiin, 100mg | G01AA10 | DALACIN, vaginaalsuposiit, 3TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| 1021914 | klindamütsiin, 10mg 1ml | D10AF01 | DALACIN T, nahalahus, 30ml 1TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| 1007503 | klindamütsiin, 150mg | J01FF01 | DALACIN C, kõvakapsel, 16TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| 1023938 | klindamütsiin, 20mg 1g | G01AA10 | DALACIN, vaginaalkreem, 40g 1TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| 1007536 | klindamütsiin, 300mg | J01FF01 | DALACIN C, kõvakapsel, 16TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| 1108561 | klindamütsiin, 300mg | J01FF01 | CLINDAMYCIN - MIP 300, õhukese polümeerikattega tablett, 16TK | MIP Pharma GmbH | 50 | | | | | | |
| 1108606 | klindamütsiin, 600mg | J01FF01 | CLINDAMYCIN - MIP 600, õhukese polümeerikattega tablett, 16TK | MIP Pharma GmbH | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|------------------------------|------------------|------------------|----------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1432268 | klindamütsiin, 600mg | J01FF01 | CLINDAMYCIN - MIP 600, õhukese polümeerikattega tablett, 32TK | MIP Pharma GmbH | 50 | | | | | | |
| 1527814 | klindamütsiin+tretinoiin, 10mg+0,25mg 1g | D10AF82 | TRECLINAC, geel, 30g 1TK | SIA Meda Pharma | 50 | | | | | | |
| 1005208 | klobetasool, 500mcg 1g | D07AD01 | DERMOVATE OINTMENT, salv, 25g 1TK | Glaxo Group Ltd. | 50 | | | | | | |
| 1005242 | klobetasool, 500mcg 1g | D07AD01 | DERMOVATE CREAM, kreem, 25g 1TK | Glaxo Group Ltd. | 50 | | | | | | |
| 1005286 | klobetasool, 500mcg 1ml | D07AD01 | DERMOVATE, nahalahus, 25ml 1TK | Glaxo Group Ltd. | 50 | | | | | | |
| 1011407 | klomipramiin, 10mg | N06AA04 | ANAFRANIL, kaetud tablett, 30TK | Novartis Finland OY | 50 | | | | | | |
| 1001462 | klomipramiin, 25mg | N06AA04 | ANAFRANIL, kaetud tablett, 30TK | Novartis Finland OY | 50 | | | | | | |
| 1011418 | klomipramiin, 75mg | N06AA04 | ANAFRANIL SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK | Novartis Finland OY | 50 | | | | | | |
| 1004544 | klonasepaam, 2mg | N03AE01 | RIVOTRIL, tablett, 30TK | Roche Eesti OÜ | 50 | G20-G26, G63-G63 | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1007345 | kloorambutsiil, 2mg | L01AA02 | LEUKERAN, õhukese polümeerikattega tablett, 25TK | Aspen Pharma Trading Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | Hematoloog, Onkoloog | | | | |
| 1044357 | klooramfenikool, 5mg 1ml | S01AA01 | OFTAN AKVAKOL, silmatilgad, lahus, 10ml 1TK | Santen Oy | 50 | | | | | | |
| 1356937 | kloormadinoon+etünüü löstradiool, 2mg+0,03mg | G03AA15 | CLORMETIN 2 MG/0,03 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK | Ladee Pharma Baltics UAB | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1356948 | kloormadinoon+etünüü löstradiool, 2mg+0,03mg | G03AA15 | CLORMETIN 2 MG/0,03 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK | Ladee Pharma Baltics UAB | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1006063 | kloorprotikseen, 25mg | N05AF03 | TRUXAL, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | H. LUNDBECK A/S | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1006096 | kloorprotikseen, 50mg | N05AF03 | TRUXAL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | H. LUNDBECK A/S | 50 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1040588 | klopidogreel, 75mg | B01AC04 | PLAVIX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Sanofi Clir SNC | 75 | Z95-Z95 | Kardioloog | esmane | | | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1065743 | klopidogreel, 75mg | B01AC04 | PLAVIX, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK | Sanofi Clir SNC | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95 | Kardioloog | esmane | | | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |
| 1357141 | klopidogreel, 75mg | B01AC04 | TROMBEX 75 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva k.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95 | Kardioloog | esmane | | | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |
| 1367197 | klopidogreel, 75mg | B01AC04 | CLOPIDOGREL SANOSWISS 75MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | UAB SanoSwiss | 75 | Z95-Z95 | Kardioloog | esmane | | | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1371484 | klopidogreel, 75mg | B01AC04 | CLOPIDOGREL ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 75 | Z95-Z95 | Kardioloog | esmane | | | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1371530 | klopidogreel, 75mg | B01AC04 | CLOPIDOGREL ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Actavis Group PTC ehf | 75 | Z95-Z95 | Kardioloog | esmane | | | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1431256 | klopidogreel, 75mg | B01AC04 | CLOPIDOGREL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Accord Healthcare Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95 | Kardioloog | esmane | | | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |
| 1433630 | klopidogreel, 75mg | B01AC04 | CLOPIDOGREL TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Teva B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95 | Kardioloog | esmane | | | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |
| 1437465 | klopidogreel, 75mg | B01AC04 | ZYLLT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | Z95-Z95 | Kardioloog | esmane | | | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1437500 | klopidogreel, 75mg | B01AC04 | ZYLLT, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95 | Kardioloog | esmane | | | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|-----------------------------------|----------|---|---|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1004724 | klosapiin, 100mg | N05AH02 | LEPONEX, tablett, 50TK | Novartis Finland OY | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | | | | | |
| 1004768 | klosapiin, 25mg | N05AH02 | LEPONEX, tablett, 50TK | Novartis Finland OY | 100 | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1033692 | klotrimasool, 1%/100mg | G01AF02 | CANIFUG CREMOLUM, vaginaalsuposiit+vaginaalkreem, 20g 1TK / 6TK | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50 | | | | | | |
| 1033726 | klotrimasool, 100mg | G01AF02 | CANIFUG CREMOLUM, vaginaalsuposiit, 6TK | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50 | | | | | | |
| 1045123 | klotrimasool, 100mg | G01AF02 | KLOTTRIMASOOL GSK, vaginaaltablett, 6TK | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. | 50 | | | | | | |
| 1033737 | klotrimasool, 200mg | G01AF02 | CANIFUG CREMOLUM, vaginaalsuposiit, 3TK | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50 | | | | | | |
| 1140815 | kodeiin+paratsetamool, 30mg+500mg | N02AA80 | PARACETAMOL/CODEINE VITABALANS, tablett, 30TK | VITABALANS OY | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---------------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1140826 | kodeiin+paratsetamool , 30mg+500mg | N02AA80 | PARACETAMOL/CODEINE VITABALANS, tablett, 100TK | VITABALANS OY | 50 | | | | | | |
| 1485187 | kodeiin+paratsetamool , 30mg+500mg | N02AA80 | ALGOCALM, tablett, 30TK | Zentiva k.s. | 50 | | | | | | |
| 1398483 | koorigonadotropiin, 5000RÜ 1ml | G03GA01 | PREGNYL, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | N.V. ORGANON | 50 | | | | | | |
| 1001631 | kromoglütsiinhape, 40mg 1ml | S01GX01 | LECROLYN, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK | SANTEN OY | 50 | | | | | | |
| 1241356 | kvetiapiin, 100mg | N05AH04 | KETIPINOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Orion Corporation | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1258297 | kvetiapiin, 100mg | N05AH04 | KVENTIAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo mesto | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1636792 | kvetiapiin, 150mg | N05AH04 | KVENTIAX SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | Krka d.d. Novo Mesto | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1115086 | kvetiapiin, 200mg | N05AH04 | SEROQUEL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | AstraZeneca UK Limited | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1241378 | kvetiapiin, 200mg | N05AH04 | KETIPINOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Orion Corporation | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1258477 | kvetiapiin, 200mg | N05AH04 | KVENTIAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1301847 | kvetiapiin, 200mg | N05AH04 | QUETIAPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Teva Pharma B.V. | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1454059 | kvetiapiin, 200mg | N05AH04 | QUETIAPINE ACCORD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | Accord Healthcare Limited | 50 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1496910 | kvetiapiin, 200mg | N05AH04 | QUETIAPINE TEVA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | Teva Pharma B.V. | 50 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1636859 | kvetiapiin, 200mg | N05AH04 | KVENTIAX SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | Krka d.d. Novo Mesto | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1241334 | kvetiapiin, 25mg | N05AH04 | KETIPINOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Orion Corporation | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1258208 | kvetiapiin, 25mg | N05AH04 | KVENTIAX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1377503 | kvetiapiin, 25mg | N05AH04 | QUETIAPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1274587 | kvetiapiin, 300mg | N05AH04 | SEROQUEL XR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | AstraZeneca UK Limited | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1301937 | kvetiapiin, 300mg | N05AH04 | QUETIAPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Teva Pharma B.V. | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1454149 | kvetiapiin, 300mg | N05AH04 | QUETIAPINE ACCORD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | Accord Healthcare Limited | 50 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 100 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1496998 | kvetiapiin, 300mg | N05AH04 | QUETIAPINE TEVA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1636916 | kvetiapiin, 300mg | N05AH04 | KVENTIAX SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | Krka d.d. Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1274611 | kvetiapiin, 400mg | N05AH04 | SEROQUEL XR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | AstraZeneca UK Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1454206 | kvetiapiin, 400mg | N05AH04 | QUETIAPINE ACCORD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | Accord Healthcare Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1497067 | kvetiapiin, 400mg | N05AH04 | QUETIAPINE TEVA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1496796 | kvetiapiin, 50mg | N05AH04 | QUETIAPINE TEVA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|-------------------------------|---------------|--------|-----------|------------|---|
| 1555253 | kvetiapiin, 50mg | N05AH04 | QUETIAPINE ACCORD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Accord Healthcare Limited | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1415506 | kvinapriil, 20mg | C09AA06 | QUINAPRIL POLPHARMA 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1007828 | labetalool, 100mg | C07AG01 | TRANDATE, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | Aspen Pharma Trading Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | O10-O16 | | | | | |
| 1043042 | lamivudiin, 100mg | J05AF05 | ZEFFIX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Glaxo Group Ltd. | 50 | | | | | | |
| 1025873 | lamivudiin, 150mg | J05AF05 | EPIVIR, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | ViiV Healthcare UK Limited | 50 | | Infektsionist | | | | HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega |
| 1379123 | lamotrigiin, 100mg | N03AX09 | LAMICTAL 100MG, närimis- /dispergeeruv tablett, 28TK | Glaxo Group Ltd. | 100 | F30-F31 | Psühhiaater | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1394210 | lamotrigiin, 25mg | N03AX09 | LAMICTAL 25MG, närimis- /dispergeeruv tablett, 28TK | Glaxo Group Ltd. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F30-F31 | Psühhiaater | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---|------------------|----------|----------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1379088 | lamotrigiin, 50mg | N03AX09 | LAMICTAL 50MG, närimis- /dispergeeruv tablett, 28TK | Glaxo Group Ltd. | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F30-F31 | Psühhiaater | | | | |
| 1394018 | lamotrigiin, 5mg | N03AX09 | LAMICTAL 5MG, närimis- /dispergeeruv tablett, 28TK | Glaxo Group Ltd. | 100 | F30-F31 | Psühhiaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| 1235056 | lantaan, 750mg | V03AE03 | FOSRENOL, närimistablett, 90TK | Shire Pharmaceutical Contracts Limited | 100 | N18-N18 | Nefroloog, Pediaater | | | | juhul, kui kaltsiumipõhine fosforisiduja on vastunäidustatud (seerumi kaltsiumisisaldus >2,54 mmol/l) |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1041196 | latanoprost, 50mcg 1ml | S01EE01 | XALATAN, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK | Pfizer Enterprises SARL | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1165733 | latanoprost, 50mcg 1ml | S01EE01 | GLAUMAX, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK | Kevelt AS | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | |
| 1316438 | latanoprost, 50mcg 1ml | S01EE01 | LATANOPROST- RATIOPHARM, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | |
| 1316449 | latanoprost, 50mcg 1ml | S01EE01 | LATANOPROST- RATIOPHARM, silmatilgad, lahus, 2.5ml 3TK | ratiopharm GmbH | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1377873 | latanoprost, 50mcg 1ml | S01EE01 | UNILAT, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK | Unimed Pharma spol. s.r.o. | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1385771 | latanoprost, 50mcg 1ml | S01EE01 | LATIZOLIL, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | |
| 1073001 | latsidipiin, 4mg | C08CA09 | LACIPIL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1073023 | latsidipiin, 4mg | C08CA09 | LACIPIL, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1122567 | latsidipiin, 6mg | C08CA09 | LACIPIL 6MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | GlaxoSmithKline SpA | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1122578 | latsidipiin, 6mg | C08CA09 | LACIPIL 6MG, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | GlaxoSmithKline SpA | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1009921 | leflunomiid, 10mg | L04AA13 | ARAVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M05-M06 | Reumatoloog, Pediaater | | | | kui mono- ja kombinatsioonravi metotreksaadi ja sulfasalasiiniga pole küllaldaselt efektiivne, on vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 75 | M07-M07 | Reumatoloog, Pediaater | | | | kui metotreksaat pole küllaldaselt efektiivne, on vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1009932 | leflunomiid, 20mg | L04AA13 | ARAVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 75 | M05-M06 | Pediaater, Reumatoloog | | | | kui mono- ja kombinatsioonravi metotreksaadi ja sulfasalasiiniga pole küllaldaselt efektiivne, on vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 75 | M07-M07 | Pediaater, Reumatoloog | | | | kui metotreksaat pole küllaldaselt efektiivne, on vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------------------------|--------------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1299551 | lenalidomiid, 10mg | L04AX04 | REVLIMID, kõvakapsel, 21TK | Celgene Europe Ltd | 100 | C90-C90 | Hematoloog | | | | <p>kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoologi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenalidomiidiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.10.2010. a.</p> |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|--|
| | | | | | 100 | D46-D46 | Hematoloog | | | | konsiiliumi (vähemasti kolme hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. raviravinädalaks) ja selle püsimisel |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------------------------|--------------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1299562 | lenalidomiid, 15mg | L04AX04 | REVLIMID, kõvakapsel, 21TK | Celgene Europe Ltd | 100 | C90-C90 | Hematoloog | | | | <p>kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoologi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenalidomiidiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.10.2010. a.</p> |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------------------------|--------------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1299573 | lenalidomiid, 25mg | L04AX04 | REVLIMID, kõvakapsel, 21TK | Celgene Europe Ltd | 100 | C90-C90 | Hematoloog | | | | <p>kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoologi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenalidomiidiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.10.2010. a.</p> |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------------------------|--------------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1299540 | lenalidomiid, 5mg | L04AX04 | REVLIMID, kõvakapsel, 21TK | Celgene Europe Ltd | 100 | C90-C90 | Hematoloog | | | | <p>kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoologi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenalidomiidiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.10.2010. a.</p> |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---|------------------|------------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| | | | | | 100 | D46-D46 | Hematoloog | | | | konsiiliumi (vähemasti kolme hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mööduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. raviravinädalaks) ja selle püsimisel |
| 1474950 | lerkanidipiin, 10mg | C08CA13 | LERCAPIN, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1611234 | lerkanidipiin, 10mg | C08CA13 | LERCANIDIPINE ACTAVIS 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Actavis Group PTC ehf | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1474994 | lerkanidipiin, 20mg | C08CA13 | LERCAPIN, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1611245 | lerkanidipiin, 20mg | C08CA13 | LERCANIDIPINE ACTAVIS 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Actavis Group PTC ehf | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1034334 | letrosool, 2,5mg | L02BG04 | FEMARA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Novartis Finland OY | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C50-C50 | Üldkirurg, Onkoloog, Günekoloog | | | | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks |
| 1302398 | letrosool, 2,5mg | L02BG04 | LETROZOLE SANOSWISS 2,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | UAB SanoSwiss | 100 | C50-C50 | Onkoloog, Üldkirurg, Günekoloog | | | | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1349771 | letrosool, 2,5mg | L02BG04 | LETROZOLE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C50-C50 | Onkoloog, Üldkirurg, Günekoloog | | | | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks |
| 1409352 | letrosool, 2,5mg | L02BG04 | LETROZOLE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Accord Healthcare Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C50-C50 | Onkoloog, Günekoloog, Üldkirurg | | | | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks |
| 1554702 | letrosool, 2,5mg | L02BG04 | LORTANDA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C50-C50 | Onkoloog, Günekoloog, Üldkirurg | | | | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks |
| 1198975 | levetiratsetaam, 1000mg | N03AX14 | KEPPRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | UCB Pharma SA | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1544981 | levetiratsetaam, 1000mg | N03AX14 | LEVETIRACETAM TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad |
| 1545566 | levetiratsetaam, 1000mg | N03AX14 | LEVETIRACETAM ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Accord Healthcare Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad |
| 1198762 | levetiratsetaam, 250mg | N03AX14 | KEPPRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | UCB Pharma SA | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1544802 | levetiratsetaam, 250mg | N03AX14 | LEVETIRACETAM TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva B.V. | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1545353 | levetiratsetaam, 250mg | N03AX14 | LEVETIRACETAM ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Accord Healthcare Limited | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1198829 | levetiratsetaam, 500mg | N03AX14 | KEPPRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | UCB Pharma SA | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1495054 | levetiratsetaam, 500mg | N03AX14 | NORMEG 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva k.s. | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1544868 | levetiratsetaam, 500mg | N03AX14 | LEVETIRACETAM TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad |
| 1545421 | levetiratsetaam, 500mg | N03AX14 | LEVETIRACETAM ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Accord Healthcare Limited | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1077049 | levodopa+benserasiid, 100mg+25mg | N04BA80 | MADOPAR, disperseeruv tablett, 100TK | Roche Eesti OÜ | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1082922 | levodopa+benserasiid, 100mg+25mg | N04BA80 | MADOPAR, kõvakapsel, 100TK | Roche Eesti OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1085161 | levodopa+benserasiid, 100mg+25mg | N04BA80 | MADOPAR HBS, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 100TK | Roche Eesti OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|---------------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|----------|
| 1002014 | levodopa+benserasiid, 200mg+50mg | N04BA80 | MADOPAR, tablett, 100TK | Roche Eesti OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1599611 | levodopa+benserasiid, 200mg+50mg | N04BA80 | MADOPAR, tablett, 100TK | First Pharma OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1560338 | levodopa+karbidopa, 100mg+25mg | N04BA81 | SINEMET 25/100, tablett, 56TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1006894 | levodopa+karbidopa, 200mg+50mg | N04BA81 | SINEMET CR 50/200 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1560349 | levodopa+karbidopa, 250mg+25mg | N04BA81 | SINEMET 25/250, tablett, 98TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1172854 | levodopa+karbidopa+e ntakapoon, 100mg+25mg+200mg | N04BA03 | STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1629716 | levodopa+karbidopa+e ntakapoon, 100mg+25mg+200mg | N04BA03 | LEVODOPA/CARBIDOPA/EN TACAPONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Teva Pharma B.V. | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1172898 | levodopa+karbidopa+e ntakapoon, 150mg+37,5mg+200m g | N04BA03 | STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1630257 | levodopa+karbidopa+e ntakapoon, 150mg+37,5mg+200m g | N04BA03 | LEVODOPA/CARBIDOPA/EN TACAPONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1538580 | levodopa+karbidopa+e ntakapoon, 175mg+43,75mg+200 mg | N04BA03 | STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Orion Corporation | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1368020 | levodopa+karbidopa+e ntakapoon, 200mg+50mg+200mg | N04BA03 | STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Orion Corporation | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1630527 | levodopa+karbidopa+e ntakapoon, 200mg+50mg+200mg | N04BA03 | LEVODOPA/CARBIDOPA/EN TACAPONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|-----------------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1472228 | levodopa+karbidopa+e ntakapoon, 75mg+18,75mg+200m g | N04BA03 | STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Orion Corporation | 100 50 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1629974 | levodopa+karbidopa+e ntakapoon, 75mg+18,75mg+200m g | N04BA03 | LEVODOPA/CARBIDOPA/EN TACAPONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Teva Pharma B.V. | 50 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1549650 | levonorgestreel, 13,5mg | G02BA03 | FLEREE, intrauteriinne ravivahend, 1TK | Bayer Pharma AG | 50 | | | | | | |
| 1009493 | levonorgestreel, 52mg | G02BA03 | MIRENA, intrauteriinne ravivahend, 1TK | Bayer Pharma AG | 50 | | | | | | |
| 1621752 | levonorgestreel+etünü ülöstradiool, 0,15mg+0,03mg | G03AA07 | LEVERETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Ladee Pharma Baltics UAB | 50 | | | | | | |
| 1014815 | levonorgestreel+etünü ülöstradiool, 75mcg+40mcg/50mcg +30mcg/125mcg+30m cg | G03AB03 | TRI-REGOL, kaetud tablett, 15TK / 18TK / 30TK | Gedeon Richter Plc. | 50 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1223064 | levotsetirisiin, 0,5mg 1ml | R06AE09 | XYZAL, suukaudne lahus, 200ml 1TK | UCB Pharma OY Finland | 50 | | | | | | |
| 1138137 | levotsetirisiin, 5mg | R06AE09 | XYZAL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | UCB Pharma OY Finland | 50 | | | | | | |
| 1512065 | levotsetirisiin, 5mg | R06AE09 | CEZERA 5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1607240 | liksisenatiid, 10mcg/20mcg 0.2ml | A10BX10 | LYXUMIA, süstelahus, 3ml 1TK / 3ml 1TK | sanofi-aventis groupe | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi raviks rasvumusega patsientidel (KMI \geq 35kg/m ²), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes taluvates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud |
| | | | | | 50 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|------------------|--------|--------|-----------|---|---|
| 1607228 | liksisenatiid, 20mcg 0.2ml | A10BX10 | LYXUMIA, süstelahus, 3ml 2TK | sanofi-aventis groupe | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi raviks rasvumusega patsientidel (KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes taluvates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud |
| | | | | | 50 | E14-E14, E11-E11 | | | | II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud | |
| 1539288 | linagliptiin, 5mg | A10BH05 | TRAJENTA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Boehringer Ingelheim International GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | II tüüpi diabeedi (E11, E14) kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|--------------------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1044469 | lipaas+amülaas+prote aas, 10000TÜ+8000TÜ+60 0TÜ | A09AA02 | KREON 10 000 U, gastroresistentne kõvakapsel, 20TK | Mylan Healthcare GmbH | 100 | E84-E84 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1063763 | lipaas+amülaas+prote aas, 10000TÜ+8000TÜ+60 0TÜ | A09AA02 | KREON 10 000 U, gastroresistentne kõvakapsel, 50TK | Mylan Healthcare GmbH | 100 | E84-E84 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1020205 | lipaas+amülaas+prote aas, 10000ühik+9000ühik+ 500ühik | A09AA02 | PANGROL 10000, gastroresistentne kõvakapsel, 20TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 100 | E84-E84 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1060434 | lipaas+amülaas+prote aas, 20000ühik+12000ühik +900ühik | A09AA02 | MEZYM 20 000, gastroresistentne tablett, 100TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 100 | E84-E84 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1044470 | lipaas+amülaas+prote aas, 25000TÜ+18000TÜ+1 000TÜ | A09AA02 | KREON 25 000 U, gastroresistentne kõvakapsel, 20TK | Mylan Healthcare GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E84-E84 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1063707 | lipaas+amülaas+prote aas, 25000TÜ+18000TÜ+1 000TÜ | A09AA02 | KREON 25 000 U, gastroresistentne kõvakapsel, 50TK | Mylan Healthcare GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E84-E84 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1020182 | lipaas+amülaas+prote aas, 25000ühik+22500ühik +1250ühik | A09AA02 | PANGROL 25000, gastroresistentne kõvakapsel, 20TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 100 | E84-E84 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|--|---|
| 1426845 | liraglutiid, 6mg 1ml | A10BX07 | VICTOZA, süstelahus pen- süstlis, 3ml 2TK | Novo Nordisk A/S | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi raviks rasvumusega patsientidel (KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes taluvates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud |
| | | | | | 50 | E14-E14, E11-E11 | | | | II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud | |
| 1300598 | lisinopriil+amlodipiin, 10mg+5mg | C09BB03 | DIRONORM, tablett, 30TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1501456 | lisinopriil+amlodipiin, 20mg+5mg | C09BB03 | DIRONORM, tablett, 30TK | Gedeon Richter Plc. | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1043008 | lispro-insuliin, 100TÜ 1ml | A10AD04 | HUMALOG MIX25, süstesuspensioon kolbampullis, 3ml 5TK | Eli Lilly Nederland B.V. | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1111284 | lispro-insuliin, 100TÜ 1ml | A10AB04 | HUMALOG, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK | Eli Lilly Nederland B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| 1364510 | lispro-insuliin, 100TÜ 1ml | A10AB04 | HUMALOG KWIKPEN, süstelahus, 3ml 5TK | Eli Lilly Nederland B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|----------------------------|------------------|--|---------------|--------|-----------|------------|---|
| 1364532 | lispro-insuliin, 100TÜ 1ml | A10AD04 | HUMALOG MIX25 KWIKPEN, süstesuspensioon, 3ml 5TK | Eli Lilly Nederland B.V. | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1364554 | lispro-insuliin, 100TÜ 1ml | A10AD04 | HUMALOG MIX50 KWIKPEN, süstesuspensioon, 3ml 5TK | Eli Lilly Nederland B.V. | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1713248 | lispro-insuliin, 200TÜ 1ml | A10AB04 | HUMALOG KWIKPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK | Eli Lilly Nederland B.V. | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1063482 | loperamiid, 2mg | A07DA03 | IMODIUM, kõvakapsel, 20TK | McNeil Products Limited | 50 | | | | | | |
| 1503571 | loperamiid, 2mg | A07DA03 | LOPACUT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | VITABALANS OY | 50 | | | | | | |
| 1284320 | lopinaviir+ritonaviir, 200mg+50mg | J05AR10 | KALETRA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | AbbVie Ltd | 50 | | Infektsionist | | | | HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega |
| 1082472 | lopinaviir+ritonaviir, 80mg+20mg 1ml | J05AR10 | KALETRA, suukaudne lahus, 60ml 5TK | AbbVie Ltd | 50 | | Infektsionist | | | | HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega |
| 1088962 | loratadiin, 10mg | R06AX13 | LORATIN, tablett, 30TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |
| 1134638 | lornoksikaam, 8mg | M01AC05 | XEFO RAPID, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | Takeda Pharma AS | 50 | | | | | | |
| 1147339 | lornoksikaam, 8mg | M01AC05 | XEFO RAPID, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Takeda Pharma AS | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1541809 | lornoksikaam, 8mg | M01AC05 | XEFO RAPID, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | First Pharma OÜ | 50 | | | | | | |
| 1207167 | losartaan, 100mg | C09CA01 | LOZAP 100, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva a.s. | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1210688 | losartaan, 100mg | C09CA01 | LOZAP 100, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Zentiva a.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1268962 | losartaan, 100mg | C09CA01 | LORISTA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1288256 | losartaan, 100mg | C09CA01 | LOSARTAN ACCORD 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Accord Healthcare Limited | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1297414 | losartaan, 100mg | C09CA01 | LOSARTAN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Actavis Group Hf | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1013735 | losartaan, 50mg | C09CA01 | LORISTA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1207134 | losartaan, 50mg | C09CA01 | LOZAP 50, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva a.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1210701 | losartaan, 50mg | C09CA01 | LOZAP 50, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Zentiva a.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1288245 | losartaan, 50mg | C09CA01 | LOSARTAN ACCORD 50 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Accord Healthcare Limited | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1297391 | losartaan, 50mg | C09CA01 | LOSARTAN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Actavis Group Hf | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|---------------------|--|---|------------------|--|--------------------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1166059 | losartaan+hüdrokloroti asiid, 50mg+12,5mg | C09DA01 | LORISTA H, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 50 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1217809 | losartaan+hüdrokloroti asiid, 50mg+12,5mg | C09DA01 | LOZAP H, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva k.s. | 50 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1217810 | losartaan+hüdrokloroti asiid, 50mg+12,5mg | C09DA01 | LOZAP H, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Zentiva k.s. | 50 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1408597 | losartaan+hüdrokloroti asiid, 50mg+12,5mg | C09DA01 | LOSARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Actavis Group PTC ehf | 50 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1185195 | loteprednool, 0,5% | S01BA14 | LOTEMAX, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK | DR. GERHARD MANN CHEM.-PHARM. FABRIK GmbH | 50 | | | | | | |
| 1029417 | lühikese toimeajaga humaaninsuliin, 100RÜ 1ml | A10AB01 | HUMULIN R, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK | Eli Lilly Holdings Limited | 50 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| 1007222 | mebendasool, 100mg | P02CA01 | VERMOX 100 MG, tablett, 6TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| 1008245 | mebendasool, 100mg | P02CA01 | MEBENDAZOLE-GRINDEKS, tablett, 6TK | AS Grindeks | 50 | | | | | | |
| 1136696 | mebeveriin, 200mg | A03AA04 | DUSPATALIN, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | BGP Products B.V. | 50 | | | | | | |
| 1009044 | medroksüprogesteron , 10mg | G03DA02 | PROVERA, tablett, 40TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| 1009213 | medroksüprogesteron , 150mg 1ml | L02AB02; G03DA02 | DEPO-PROVERA, süstesuspensioon, 1ml 1TK | Pfizer Enterprises SARL | 100 100 50 | C00-D48 D18.1-D18.1 | Onkoloog Pulmonoloog, Onkoloog | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|---|--|------------------|-------------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1063550 | medroksüprogesteron , 150mg 1ml | L02AB02; G03DA02 | DEPO-PROVERA, süstesuspensioon, 3.3ml 1TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | Onkoloog | | | | |
| | | | | | 100 | D18.1-D18.1 | Pulmonoloog, Onkoloog | | | | |
| 1063561 | medroksüprogesteron , 150mg 1ml | G03DA02; L02AB02 | DEPO-PROVERA, süstesuspensioon, 1ml 1TK | Pfizer Enterprises SARL | 100 | D18.1-D18.1 | Pulmonoloog, Onkoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | Onkoloog | | | | |
| 1013195 | medroksüprogesteron , 500mg | L02AB02 | FARLUTAL, tablett, 30TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | Onkoloog | | | | |
| 1009022 | medroksüprogesteron , 5mg | G03DA02 | PROVERA, tablett, 24TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| 1004410 | melfalaan, 2mg | L01AA03 | ALKERAN, õhukese polümeerikattega tablett, 25TK | Aspen Pharma Trading Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | Hematoloog, Onkoloog | | | | |
| 1035021 | meloksikaam, 15mg | M01AC06 | MOVALIS, tablett, 20TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 50 | | | | | | |
| 1140680 | meloksikaam, 15mg | M01AC06 | MELOX 15MG, tablett, 20TK | Medochemie Ltd | 50 | | | | | | |
| 1149779 | meloksikaam, 15mg | M01AC06 | MEXOLAN 15 MG, tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH | 50 | | | | | | |
| 1175936 | meloksikaam, 15mg | M01AC06 | RECOXA 15, tablett, 20TK | Zentiva k.s. | 50 | | | | | | |
| 1189199 | meloksikaam, 15mg | M01AC06 | LORMED 15 MG, tablett, 20TK | PRO. MED. CS. PRAHA a.s | 50 | | | | | | |
| 1240254 | meloksikaam, 15mg | M01AC06 | RECOXA 15, tablett, 60TK | Zentiva k.s. | 50 | | | | | | |
| 1360189 | meloksikaam, 15mg | M01AC06 | MELOXICAM-RATIOPHARM 15 MG, tablett, 20TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| 1560260 | meloksikaam, 15mg | M01AC06 | MELOX 15MG, tablett, 60TK | Medochemie Ltd | 50 | | | | | | |
| 1035009 | meloksikaam, 7,5mg | M01AC06 | MOVALIS, tablett, 20TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 50 | | | | | | |
| 1140679 | meloksikaam, 7,5mg | M01AC06 | MELOX 7,5MG, tablett, 30TK | Medochemie Ltd | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1146350 | meloksikaam, 7,5mg | M01AC06 | MOVALIS, tablett, 50TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 50 | | | | | | |
| 1149746 | meloksikaam, 7,5mg | M01AC06 | MEXOLAN 7,5 MG, tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH | 50 | | | | | | |
| 1192227 | meloksikaam, 7,5mg | M01AC06 | MELOXICAM SANDOZ 7,5 MG, tablett, 50TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50 | | | | | | |
| 1360134 | meloksikaam, 7,5mg | M01AC06 | MELOXICAM-RATIOPHARM 7,5 MG, tablett, 20TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| 1360156 | meloksikaam, 7,5mg | M01AC06 | MELOXICAM-RATIOPHARM 7,5 MG, tablett, 50TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| 1560271 | meloksikaam, 7,5mg | M01AC06 | MELOX 7,5MG, tablett, 60TK | Medochemie Ltd | 50 | | | | | | |
| 1006007 | melperoon, 25mg | N05AD03 | BURONIL, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | MediLink A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1006030 | melperoon, 50mg | N05AD03 | BURONIL, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Medilink A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1123524 | memantiin, 10mg | N06DX01 | AXURA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Merz Pharmaceuticals GmbH | 50 | | | | | | |
| 1123535 | memantiin, 10mg | N06DX01 | AXURA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Merz Pharmaceuticals GmbH | 50 | | | | | | |
| 1583636 | memantiin, 10mg | N06DX01 | COGNOMEM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva k.s. | 50 | | | | | | |
| 1614024 | memantiin, 10mg | N06DX01 | NEMDATINE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| 1614057 | memantiin, 10mg | N06DX01 | NEMDATINE, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| 1614563 | memantiin, 10mg | N06DX01 | MARIXINO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Consilient Health Ltd | 50 | | | | | | |
| 1614608 | memantiin, 10mg | N06DX01 | MARIXINO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Consilient Health Ltd | 50 | | | | | | |
| 1618747 | memantiin, 10mg | N06DX01 | MEMANTINE RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1618781 | memantiin, 10mg | N06DX01 | MEMANTINE RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| 1635331 | memantiin, 10mg | N06DX01 | MEMANTINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Accord Healthcare Limited | 50 | | | | | | |
| 1635375 | memantiin, 10mg | N06DX01 | MEMANTINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Accord Healthcare Limited | 50 | | | | | | |
| 1004971 | merkaptopuriin, 50mg | L01BB02 | PURI-NETHOL, tablett, 25TK | Aspen Pharma Trading Limited | 100 | C00-D48 | Onkoloog, Hematoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1023815 | mesalasiin, 1g | A07EC02 | PENTASA, rektaalsuposiit, 28TK | FERRING GmbH | 75 | K51-K51, K50-K50 | Pediaater, Gastroenteroloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1352810 | mesalasiin, 1g | A07EC02 | PENTASA 1G, toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 50TK | FERRING GmbH | 75 | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1352854 | mesalasiin, 2g | A07EC02 | PENTASA 2G, toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 60TK | FERRING GmbH | 50 | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | |
| 1146574 | mesalasiin, 400mg | A07EC02 | ASACOL 400MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 100TK | Tillotts Pharma AB | 75 | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1044863 | mesalasiin, 4g | A07EC02 | SALOFALK, rektaalsuspensioon, 7TK | Dr. Falk Pharma GmbH | 75 | K51-K51, K50-K50 | Pediaater, Gastroenteroloog | | | | põletikulise soolehaiguse ägenemise raviks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1023826 | mesalasiin, 500mg | A07EC02 | PENTASA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | FERRING GmbH | 75 | K51-K51, K50-K50 | Pediaater, Gastroenteroloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1146541 | mesalasiin, 500mg | A07EC02 | ASACOL, rektaalsuposiit, 20TK | Tillotts Pharma AB | 75 | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------------|------------------|------------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1184970 | mesalasiin, 800mg | A07EC02 | ASACOL 800 MG, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 50TK | Tillotts Pharma AB | 75 | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1034109 | metadoon, 1mg 1ml | N07BC02 | METADON DAK 1 MG/ML, suukaudne lahus, 1000ml 1TK | Takeda Pharma AS | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 100 | R52.1-R52.1 | Reumatoloog, Anestesioloog, Neuroloog | esmane | | | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1684155 | metadoon, 20mg | N07BC02 | METADON DAK, tablett, 100TK | Takeda Pharma AS | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 100 | R52.1-R52.1 | Neuroloog, Anestesioloog, Reumatoloog | esmane | | | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul |
| 1164798 | metformiin, 1000mg | A10BA02 | METFORAL 1000 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | Laboratori Guidotto S.p.A | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1302949 | metformiin, 1000mg | A10BA02 | METFOGAMMA 1000, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1568246 | metformiin, 1000mg | A10BA02 | METFORMIN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | Teva Pharma B.V. | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1064719 | metformiin, 500mg | A10BA02 | METFORAL 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1083169 | metformiin, 500mg | A10BA02 | METFORMIN-RATIOPHARM 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | ratiopharm GmbH | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1116380 | metformiin, 500mg | A10BA02 | METFOGAMMA 500, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1064731 | metformiin, 850mg | A10BA02 | METFORAL 850 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1083158 | metformiin, 850mg | A10BA02 | METFORMIN-RATIOPHARM 850 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1111262 | metformiin, 850mg | A10BA02 | METFOGAMMA 850, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1156609 | metformiin, 850mg | A10BA02 | METFORMIN SANDOZ 850 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | Sandoz GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1637917 | metformiin+dapagliflo- sin, 1000mg+5mg | A10BD15 | XIGDUO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | AstraZeneca AB | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|--|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1637861 | metformiin+dapagliflo- sin, 850mg+5mg | A10BD15 | XIGDUO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI \geq 30kg/m ²); kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| 1687136 | metformiin+empagliflo- sin, 1000mg+12,5mg | A10BD20 | SYNJARDY, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Boehringer Ingelheim International GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI \geq 30kg/m ²); kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| 1686955 | metformiin+empagliflo- sin, 1000mg+5mg | A10BD20 | SYNJARDY, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Boehringer Ingelheim International GmbH | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI \geq 30kg/m ²); kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|--|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1687046 | metformiin+empagliflo- iin, 850mg+12,5mg | A10BD20 | SYNJARDY, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Boehringer Ingelheim International GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI \geq 30kg/m ²); kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| 1686865 | metformiin+empagliflo- iin, 850mg+5mg | A10BD20 | SYNJARDY, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Boehringer Ingelheim International GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI \geq 30kg/m ²); kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| 1590599 | metformiin+linagliptiin, 1000mg+2,5mg | A10BD11 | JENTADUETO, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|--|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1590465 | metformiin+linagliptiin, 850mg+2,5mg | A10BD11 | JENTADUETO, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| 1550326 | metformiin+saksagliptii n, 1000mg+2,5mg | A10BD10 | KOMBOGLYZE, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | AstraZeneca AB | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1550270 | metformiin+saksagliptii n, 850mg+2,5mg | A10BD10 | KOMBOGLYZE, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1361034 | metformiin+sitagliptiin, 1000mg+50mg | A10BD07 | JANUMET, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Merck Sharp & Dohme Limited | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1360965 | metformiin+sitagliptiin, 850mg+50mg | A10BD07 | JANUMET, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Merck Sharp & Dohme Limited | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1349401 | metformiin+vildagliptiin , 1000mg+50mg | A10BD08 | EUCREAS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Novartis Europharm Limited | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|-------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|--------|-----------|--|---|
| 1349344 | metformiin+vildagliptiin , 850mg+50mg | A10BD08 | EUCREAS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Novartis Europharm Limited | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1000674 | metoklopramiid, 10mg | A03FA01 | CERUCAL, tablett, 50TK | Teva Pharma B.V. | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1327643 | metoksüpolüetüleenglü kool-beetaepoetiin, 100mcg 0.3ml | B03XA03 | MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK | Roche Registration Limited | 100 | D46-D46, D47.1- D47.1 | Hematoloog | | | | |
| | | | | | 100 | D63-D63, T86-T86 | Pediaater, Uroloog, Nefroloog | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1370540 | metoksüpolüetüleenglü kool-beetaepoetiin, 120mcg 0.3ml | B03XA03 | MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK | Roche Registration Limited | 100 | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog, Pediaater | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 100 | D46-D46, D47.1- D47.1 | Hematoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1327665 | metoksüpolüetüleenglü kool-beetaepoetiin, 200mcg 0.3ml | B03XA03 | MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK | Roche Registration Limited | 100 | D46-D46, D47.1- D47.1 | Hematoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog, Pediaater | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral | |
| 1370472 | metoksüpolüetüleenglü kool-beetaepoetiin, 30mcg 0.3ml | B03XA03 | MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK | Roche Registration Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | D46-D46, D47.1- D47.1 | Hematoloog | | | | |
| | | | | | 100 | D63-D63, T86-T86 | Pediaater, Nefroloog, Uroloog | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|---------------------------------|------------------|--|----------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1327621 | metoksüpolüetüleenglü kool-beetaepoetiin, 50mcg 0.3ml | B03XA03 | MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK | Roche Registration Limited | 100 | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog, Pediaater | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | D46-D46, D47.1- D47.1 | Hematoloog | | | | |
| 1327632 | metoksüpolüetüleenglü kool-beetaepoetiin, 75mcg 0.3ml | B03XA03 | MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK | Roche Registration Limited | 100 | D46-D46, D47.1- D47.1 | Hematoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Pediaater, Uroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| 1010811 | metoprolol, 100mg | C07AB02 | EMZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | TEVA Czech Industries s.r.o. | 75 | I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1019720 | metoprolol, 100mg | C07AB02 | BETALOC ZOK 100, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | AstraZeneca AB | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1224278 | metoprolol, 100mg | C07AB02 | METOZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15 | | | | | |
| 1282249 | metoprolol, 100mg | C07AB02 | METOPROLOL- RATIOPHARM RETARD 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 75 | I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|--|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1296592 | metoprolol, 100mg | C07AB02 | METOPROLOL POLPHARMA 100, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 75 | I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1672286 | metoprolol, 100mg | C07AB02 | BLOXAZOC 100, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Krka d.d. Novo Mesto | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15 | | | | | |
| 1083406 | metoprolol, 25mg | C07AB02 | BETALOC ZOK 25, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | AstraZeneca AB | 75 | I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1224201 | metoprolol, 25mg | C07AB02 | METOZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1009055 | metoprolol, 50mg | C07AB02 | METOPROLOL- RATIOPHARM 50 MG, tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15 | | | | | |
| 1010800 | metoprolol, 50mg | C07AB02 | EMZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | TEVA Czech Industries s.r.o. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| 1019719 | metoprolol, 50mg | C07AB02 | BETALOC ZOK 50, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | AstraZeneca AB | 75 | I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|--|---------------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1224245 | metoprolol, 50mg | C07AB02 | METOZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1282160 | metoprolol, 50mg | C07AB02 | METOPROLOL- RATIOPHARM RETARD 50 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15 | | | | | |
| 1296491 | metoprolol, 50mg | C07AB02 | METOPROLOL POLPHARMA 50, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 75 | I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1672174 | metoprolol, 50mg | C07AB02 | BLOXAZOC 50, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Krka d.d. Novo Mesto | 75 | I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| 1001136 | metotreksaat, 2,5mg | L04AX03 | TREXAN, tablett, 100TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | Pediaater, Reumatoloog | | | | |
| | | | | | 75 | L40-L40 | Pediaater, Dermatoveneroloog | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | Hematoloog, Onkoloog | | | | |
| 1033636 | metronidasool, 100mg/250mg | P01AB01 | ARILIN, õhukese polümeerikattega tablett+vaginaalsuposiit, 6TK / 12TK | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50 | | | | | | |
| 1033658 | metronidasool, 1g | G01AF01 | ARILIN, vaginaalsuposiit, 2TK | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1008706 | metronidasool, 500mg | P01AB01 | METRONIDAZOL NYCOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Takeda Pharma AS | 50 | | | | | | |
| 1071324 | metronidasool, 500mg | P01AB01 | METRONIDAZOL NYCOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Takeda Pharma AS | 50 | | | | | | |
| 1046180 | metronidasool, 7,5mg 1g | D06BX01 | ROZEX, geel, 30g 1TK | GALDERMA INTERNATIONAL | 50 | | | | | | |
| 1223749 | metronidasool, 7,5mg 1g | D06BX01 | METROSA, geel, 25g 1TK | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1396335 | metüülfenidaat, 10mg | N06BA04 | MEDIKINET XL 10MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00 | | vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20- aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul. |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| | | | | | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | | 6,00 | 20,00 | ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1313569 | metüülfenidaat, 18mg | N06BA04 | CONCERTA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Johnson & Johnson UAB | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | | 6,00 | 20,00 | ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C- GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| | | | | | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00 | | vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20- aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul. |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1396368 | metüülfenidaat, 20mg | N06BA04 | MEDIKINET XL 20MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | | 6,00 | 20,00 | ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C- GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| | | | | | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00 | | vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20- aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul. |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1396391 | metüülfenidaat, 30mg | N06BA04 | MEDIKINET XL 30MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00 | | vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20- aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul. |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| | | | | | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | | 6,00 | 20,00 | ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1313581 | metüülfenidaat, 36mg | N06BA04 | CONCERTA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Johnson & Johnson UAB | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00 | | vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20- aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul. |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| | | | | | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | | 6,00 | 20,00 | ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1395266 | metüülfenidaat, 40mg | N06BA04 | MEDIKINET XL 40MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00 | | vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20- aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul. |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| | | | | | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | | 6,00 | 20,00 | ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1313660 | metüülfenidaat, 54mg | N06BA04 | CONCERTA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Johnson & Johnson UAB | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00 | | vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20- aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul. |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| | | | | | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | | 6,00 | 20,00 | ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1395334 | metüülfenidaat, 5mg | N06BA04 | MEDIKINET XL 5MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00 | | vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20- aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul. |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| | | | | | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | | 6,00 | 20,00 | ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------|------------------|--|--|--------|-----------|------------|----------|
| 1009099 | metüülprednisoloon, 16mg | H02AB04 | MEDROL, tablett, 50TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | Reumatoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10- L10, L20-L20 | Dermatoveneroloog, Pediaater, Allergoloog- immunoloog | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 75 | N00-N08 | Nefroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 75 | K50-K51, K73-K74 | Gastroenteroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 100 | G35-G35 | Neuroloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1009190 | metüülprednisoloon, 40mg 1ml | H02AB04 | DEPO-MEDROL, süstesuspensioon, 1ml 1TK | Pfizer Enterprises SARL | 100 | G35-G35 | Pediaater, Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | Pediaater, Reumatoloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | N00-N08 | Nefroloog, Pediaater | | | | |
| 1065495 | metüülprednisoloon, 40mg 1ml | H02AB04 | DEPO-MEDROL, süstesuspensioon, 2ml 1TK | Pfizer Enterprises SARL | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 100 | G35-G35 | Pediaater, Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | Reumatoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | N00-N08 | Pediaater, Nefroloog | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--------------------------|----------------------------|------------------|--|--|--------|-----------|------------|----------|
| 1009077 | metüülprednisoloon, 4mg | H02AB04 | MEDROL, tablett, 30TK | Pfizer Enterprises SARL | 75 | N00-N08 | Nefroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 75 | L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10- L10, L20-L20 | Allergoloog- immunoloog, Dermatoveneroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 75 | K50-K51, K73-K74 | Gastroenteroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | Reumatoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 100 | G35-G35 | Pediaater, Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1065754 | metüülprednisoloon, 4mg | H02AB04 | MEDROL, tablett, 100TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | Reumatoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 75 | K50-K51, K73-K74 | Gastroenteroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 75 | N00-N08 | Nefroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 75 | L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10- L10, L20-L20 | Dermatoveneroloog, Pediaater, Allergoloog- immunoloog | | | | |
| | | | | | 100 | G35-G35 | Neuroloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1028102 | metüülprednisoloonats eponaat, 1mg 1g | D07AC14 | ADVANTAN, kreem, 15g 1TK | Bayer Pharma AG | 75 | L40-L40 | Pediaater, Dermatoveneroloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | L23-L23, L20-L20 | Allergoloog- immunoloog, Pediaater, Dermatoveneroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|--------------------------------|------------------|------------------|--|--------|-----------|------------|----------|
| 1062009 | metüülprednisoloonats eponaat, 1mg 1g | D07AC14 | ADVANTAN, salv, 15g 1TK | Bayer Pharma AG | 75 | L40-L40 | Pediaater, Dermatoveneroloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | L23-L23, L20-L20 | Dermatoveneroloog, Pediaater, Allergoloog- immunoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1133356 | metüülprednisoloonats eponaat, 1mg 1g | D07AC14 | ADVANTAN MILK, nahaemulsioon, 20g 1TK | Bayer Pharma AG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | L40-L40 | Pediaater, Dermatoveneroloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | L23-L23, L20-L20 | Pediaater, Dermatoveneroloog, Allergoloog- immunoloog | esmane | | | |
| 1024579 | mikonasool, 20mg 1g | A01AB09 | DAKTARIN, suukaudne geel, 40g 1TK | Johnson & Johnson UAB | 50 | | | | | | |
| 1604337 | mirabegroon, 50mg | G04BD12 | BETMIGA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Astellas Pharma Europe B.V. | 50 | | | | | | |
| 1243684 | mirtasapiin, 15mg | N06AX11 | MIRTAZAPIN ORION, suus dispergeeruv tablett, 30TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| 1273137 | mirtasapiin, 15mg | N06AX11 | MIRTAZAPIN ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 30TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| 1314683 | mirtasapiin, 15mg | N06AX11 | MIRZATEN Q-TAB, suus dispergeeruv tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| 1170166 | mirtasapiin, 30mg | N06AX11 | ESPRITAL 30, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva k.s. | 50 | | | | | | |
| 1243729 | mirtasapiin, 30mg | N06AX11 | MIRTAZAPIN ORION, suus dispergeeruv tablett, 30TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| 1273227 | mirtasapiin, 30mg | N06AX11 | MIRTAZAPIN ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 30TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| 1301522 | mirtasapiin, 30mg | N06AX11 | MIRZATEN Q-TAB, suus dispergeeruv tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| 1243741 | mirtasapiin, 45mg | N06AX11 | MIRTAZAPIN ORION, suus dispergeeruv tablett, 30TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1154618 | moksifloksatsiin, 400mg | J01MA14 | AVELOX, õhukese polümeerikattega tablett, 5TK | Bayer Pharma AG | 50 | J44-J44, J41-J41, J47-J47, J13-J15 | | | | | kui beetalaktaam- antibiootikum, tetratsükliin ja makroliid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud |
| 1145999 | moksonidiin, 0,2mg | C02AC05 | MOXONIDINHEXAL 0,2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |
| 1155091 | moksonidiin, 0,2mg | C02AC05 | STADAPRESS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Stada Arzneimittel AG | 50 | | | | | | |
| 1157778 | moksonidiin, 0,2mg | C02AC05 | MOXOGAMMA 0,2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| 1247598 | moksonidiin, 0,2mg | C02AC05 | MOXONIDIN ACTAVIS 0,2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Actavis Group Hf | 50 | | | | | | |
| 1146079 | moksonidiin, 0,3mg | C02AC05 | MOXONIDINHEXAL 0,3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |
| 1157857 | moksonidiin, 0,3mg | C02AC05 | MOXOGAMMA 0,3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| 1247677 | moksonidiin, 0,3mg | C02AC05 | MOXONIDIN ACTAVIS 0,3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Actavis Group Hf | 50 | | | | | | |
| 1013791 | moksonidiin, 0,4mg | C02AC05 | PHYSIOTENS 0,4 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Mylan Healthcare GmbH | 50 | | | | | | |
| 1146170 | moksonidiin, 0,4mg | C02AC05 | MOXONIDINHEXAL 0,4 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |
| 1155259 | moksonidiin, 0,4mg | C02AC05 | STADAPRESS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Stada Arzneimittel AG | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------|--|--------|-----------|------------|----------|
| 1157947 | moksonidiin, 0,4mg | C02AC05 | MOXOGAMMA 0,4 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| 1247756 | moksonidiin, 0,4mg | C02AC05 | MOXONIDIN ACTAVIS 0,4 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Actavis Group Hf | 50 | | | | | | |
| 1028933 | mometasoon, 1mg 1g | D07AC13 | ELOCON, nahalahus, 20ml 1TK | Merck Sharp & Dohme B.V. | 75 | L23-L23, L20-L20 | Dermatoveneroloog, Pediaater, Allergoloog- immunoloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | L40-L40 | Pediaater, Dermatoveneroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1028944 | mometasoon, 1mg 1g | D07AC13 | ELOCON, salv, 20g 1TK | Merck Sharp & Dohme B.V. | 75 | L40-L40 | Pediaater, Dermatoveneroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | L23-L23, L20-L20 | Pediaater, Allergoloog- immunoloog, Dermatoveneroloog | esmane | | | |
| 1028955 | mometasoon, 1mg 1g | D07AC13 | ELOCON, kreem, 20g 1TK | Merck Sharp & Dohme B.V. | 75 | L40-L40 | Dermatoveneroloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | L23-L23, L20-L20 | Allergoloog- immunoloog, Dermatoveneroloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1028966 | mometasoon, 50mcg 1annust | R01AD09 | NASONEX, ninasprei, suspensioon, 140annust 1TK | Merck Sharp & Dohme B.V. | 50 | | | | | | |
| 1484298 | mometasoon, 50mcg 1annust | R01AD09 | NASOMETIN, ninasprei, suspensioon, 140annust 1TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50 | | | | | | |
| 1621224 | mometasoon, 50mcg 1annust | R01AD09 | BRESO, ninasprei, suspensioon, 140annust 1TK | UAB Norameda | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|-----------------------------|------------------|------------------|--|--------|-----------|---|----------|
| 1193509 | mometasoon+salitsüül hape, 1mg+50mg 1g | D07XC03 | ELOSALIC, salv, 45g 1TK | Merck Sharp & Dohme B.V. | 75 | L40-L40 | Dermatoveneroloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | L23-L23, L20-L20 | Dermatoveneroloog, Allergoloog- immunoloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1274116 | montelukast, 10mg | R03DC03 | MONTELUKAST TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 75 | J45-J45 | | | | 11,00 | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | 11,00 | mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1289987 | montelukast, 10mg | R03DC03 | MONKASTA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | J45-J45 | | | 11,00 | | mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2-adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2-adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | 11,00 | | |
| 1496415 | montelukast, 10mg | R03DC03 | MONTELUKAST ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Accord Healthcare Limited | 75 | J45-J45 | | | 11,00 | | mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2-adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2-adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | 11,00 | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1273722 | montelukast, 4mg | R03DC03 | MONTELUKAST TEVA, närimistablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 75 | J45-J45 | | | 11,00 | | mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | 11,00 | | |
| 1289718 | montelukast, 4mg | R03DC03 | MONKASTA, närimistablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | 11,00 | | mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | 11,00 | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1447084 | montelukast, 4mg | R03DC03 | MONTELUKAST ACCORD, närimistablett, 28TK | Accord Healthcare Limited | 75 | J45-J45 | | | 11,00 | | mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | 11,00 | | |
| 1273845 | montelukast, 5mg | R03DC03 | MONTELUKAST TEVA, närimistablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | 11,00 | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | 11,00 | | mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1289831 | montelukast, 5mg | R03DC03 | MONKASTA, närimistablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | J45-J45 | | | 11,00 | | mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2-adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2-adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | 11,00 | | |
| 1447242 | montelukast, 5mg | R03DC03 | MONTELUKAST ACCORD, närimistablett, 28TK | Accord Healthcare Limited | 75 | J45-J45 | | | 11,00 | | mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2-adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2-adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | 11,00 | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1035740 | morfiin, 100mg | N02AA01 | VENDAL RETARD 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH | 100 | R52.1-R52.1 | Neuroloog, Reumatoloog, Anestesioloog | esmane | | | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| 1035717 | morfiin, 10mg | N02AA01 | VENDAL RETARD 10 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | R52.1-R52.1 | Reumatoloog, Neuroloog, Anestesioloog | esmane | | | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul |
| 1382284 | morfiin, 10mg | N02AA01 | SEVREDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 100 | R52.1-R52.1 | Reumatoloog, Neuroloog, Anestesioloog | esmane | | | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1339376 | morfiin, 120mg | N02AA01 | MXL 120 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. | 100 | R52.1-R52.1 | Reumatoloog, Anestesioloog, Neuroloog | esmane | | | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1382307 | morfiin, 20mg | N02AA01 | SEVREDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 100 | R52.1-R52.1 | Reumatoloog, Neuroloog, Anestesioloog | esmane | | | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul |
| 1043222 | morfiin, 20mg 1ml | N02AA01 | MORFIN DAK 20 MG/ML, süstelahus, 1ml 10TK | Takeda Pharma AS | 100 | R52.1-R52.1 | Reumatoloog, Anestesioloog, Neuroloog | esmane | | | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1035728 | morfiin, 30mg | N02AA01 | VENDAL RETARD 30 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 100 | R52.1-R52.1 | Neuroloog, Reumatoloog, Anestesioloog | esmane | | | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1080289 | morfiin, 30mg | N02AA01 | MST CONTINUS 30 MG, suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 30TK | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 100 | R52.1-R52.1 | Neuroloog, Reumatoloog, Anestesioloog | esmane | | | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1339422 | morfiin, 30mg | N02AA01 | MXL 30 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. | 100 | R52.1-R52.1 | Neuroloog, Anestesioloog, Reumatoloog | esmane | | | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|---|------------------|----------------------------------|---|--------|-----------|---|--|
| 1035739 | morfiin, 60mg | N02AA01 | VENDAL RETARD 60 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 100 | R52.1-R52.1 | Neuroloog, Anestesioloog, Reumatoloog | esmane | | | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul |
| 1023556 | mükofenoolhape, 250mg | L04AA06 | CELLCEPT, kõvakapsel, 100TK | Roche Registration Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| 1164697 | mükofenoolhape, 360mg | L04AA06 | MYFORTIC, gastroresistentne tablett, 120TK | Novartis Finland OY | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| 1088344 | mükofenoolhape, 500mg | L04AA06 | CELLCEPT, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | Roche Registration Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| 1276736 | mükofenoolhape, 500mg | L04AA06 | MYCOPHENOLATE MOFETIL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | Accord Healthcare Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| 1454879 | naatriumbemipariin, 25000RÜ anti Xa 1ml | B01AB12 | ZIBOR, süstelahus, 0.3ml 2TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | | kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |
| 1455230 | naatriumbemipariin, 25000RÜ anti Xa 1ml | B01AB12 | ZIBOR, süstelahus, 0.4ml 2TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel | |
| | | | | | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|---|------------------|---|--------|--------|-----------|---|-----------------|
| 1193127 | naatriumbemipariin, 2500RÜ anti Xa 0.2ml | B01AB12 | ZIBOR, süstelahus, 10TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | | kuni 10 päevaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |
| 1193172 | naatriumbemipariin, 3500RÜ anti Xa 0.2ml | B01AB12 | ZIBOR, süstelahus, 10TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | kuni 10 päevaks | |
| | | | | | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |
| | | | | | 75 | M17-M17, S72.7- S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16- M16, S72.0-S72.0 | | | | kuni 30 päevaks | |
| 1012598 | naatriumdaltepariin, 10000RÜ anti Xa 0.4ml | B01AB04 | FRAGMIN, süstelahus süstlis, 0.4ml 5TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |
| | | | | | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel | |
| 1003914 | naatriumdaltepariin, 2500RÜ anti Xa 0.2ml | B01AB04 | FRAGMIN, süstelahus süstlis, 0.2ml 10TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | S72.1-S72.1, M16- M17, S72.7-S72.7, S72.2-S72.2, S72.0- S72.0 | | | | kuni 30 päevaks | |
| | | | | | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel | |
| | | | | | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|-----------------|
| 1003969 | naatriumdaltepariin, 5000RÜ anti Xa 0.2ml | B01AB04 | FRAGMIN, süstelahus süstlis, 0.2ml 10TK | Pfizer Enterprises SARL | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel | |
| | | | | | 75 | S72.1-S72.1, M16- M17, S72.7-S72.7, S72.2-S72.2, S72.0- S72.0 | | | | kuni 30 päevaks | |
| 1012587 | naatriumdaltepariin, 7500RÜ anti Xa 0.3ml | B01AB04 | FRAGMIN, süstelahus süstlis, 10TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel | |
| | | | | | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |
| 1065529 | naatriumenoksapariin, 10000RÜ 1ml | B01AB05 | CLEXANE, süstelahus, 0.2ml 10TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | kuni 10 päevaks | |
| 1065541 | naatriumenoksapariin, 10000RÜ 1ml | B01AB05 | CLEXANE, süstelahus, 0.4ml 10TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 75 | M17-M17, S72.7- S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16- M16, S72.0-S72.0 | | | | | kuni 30 päevaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |
| | | | | | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | kuni 10 päevaks | |
| 1065552 | naatriumenoksapariin, 10000RÜ 1ml | B01AB05 | CLEXANE, süstelahus, 0.6ml 2TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|---|------------------|----------------------------------|--------|--------|-----------|---|---|
| 1065574 | naatriumenoksapariin, 10000RÜ 1ml | B01AB05 | CLEXANE, süstelahus, 0.8ml 2TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel | |
| 1065596 | naatriumenoksapariin, 10000RÜ 1ml | B01AB05 | CLEXANE, süstelahus, 1ml 2TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | | kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |
| 1201521 | naatriumfenüülbutüraat , 500mg | A16AX03 | AMMONAPS, tablett, 250TK | Swedish Orphan Biovitrum International AB | 100 | E72.2-E72.2 | | | | konsiiliumi (vähemalt 2 pediaatri ühise) otsuse alusel järgmistel tingimustel: haigus kulgeb metaboolsete kriisidega vaatamata muule suukaudsele ravile; patsiendi prognoos paranemisele on hea (püsivat ajukahjustust või organpuudulikkust ei esine); ravi jätkatakse patsiendil, kellel 1 kuu kestnud ravi on andnud hea tulemuse (hüperammoneemilisi kriise ei ole esinenud või on nende sagedus oluliselt vähenenud) | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|---|------------------|---------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1201543 | naatriumfenüübutüraat , 940mg 1g | A16AX03 | AMMONAPS, graanulid, 266g 1TK | Swedish Orphan Biovitrum International AB | 100 | E72.2-E72.2 | | | | | konsiiliumi (vähemalt 2 pediaatri ühise) otsuse alusel järgmistel tingimustel: haigus kulgeb metaboolsete kriisidega vaatamata muule suukaudsele ravile; patsiendi prognoos paranemisele on hea (püsivat ajukahjustust või organpuudulikkust ei esine); ravi jätkatakse patsiendil, kellel 1 kuu kestnud ravi on andnud hea tulemuse (hüperammoneemilisi kriise ei ole esinenud või on nende sagedus oluliselt vähenenud) |
| 1065822 | naatriumlevotüroksiin, 100mcg | H03AA01 | L-THYROXIN BERLIN- CHEMIE, tablett, 100TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E89.0-E89.0, E03- E03, E89.3-E89.3 | | | | | |
| 1065866 | naatriumlevotüroksiin, 50mcg | H03AA01 | L-THYROXIN BERLIN- CHEMIE, tablett, 100TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E89.0-E89.0, E03- E03, E89.3-E89.3 | | | | | |
| 1035346 | naatriumsulfaat, veevaba+kaaliumklorii d+naatriumkloriid+mak rogool+naatriumvesinik karbonaat, 5,7g+0,75g+1,46g+64 g+1,68g | A06AD81 | FORTTRANS, suukaudse lahuse pulber, 4TK | Ipsen Pharma | 50 | | | | | | |
| 1023949 | nabumetoon, 1g | M01AX01 | RELIFEX, dispergeeruv tablett, 20TK | Meda AB | 50 | | | | | | |
| 1205479 | nabumetoon, 1g | M01AX01 | RELIFEX, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | Meda AB | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1147902 | naftidrofurüül, 100mg | C04AX21 | ENELBIN 100 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK | Zentiva k.s. | 50 | | | | | | |
| 1147913 | naftidrofurüül, 100mg | C04AX21 | ENELBIN 100 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | Zentiva k.s. | 50 | | | | | | |
| 1671263 | naloksegool, 25mg | A06AH03 | MOVENTIG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | AstraZeneca AB | 75 | K59.0-K59.0 | | | | | kroonilise opioid- indutseeritud kõhukinnisuse raviks patsiendile, kes kasutab igapäevaselt tugevatoimelist opioidi (morfiin, oksükodoon, fentanüül) ning kes ei ole vähemalt 2 kuu möödumisel opioidravi alustamisest saavutanud lahtistite abil piisavat raviefekti |
| 1622731 | naprokseen, 550mg | M01AE02 | NALGESIN FORTE, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| 1644713 | naprokseen, 550mg | M01AE02 | NALGESIN FORTE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| 1437780 | naprokseen+esomepra sool, 500mg+20mg | M01AE52 | VIMOVO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 30TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |
| 1437791 | naprokseen+esomepra sool, 500mg+20mg | M01AE52 | VIMOVO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |
| 1072437 | neбиволоол, 5mg | C07AB12 | NEBILET, tablett, 28TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1259355 | nebivolool, 5mg | C07AB12 | NEBICARD 5MG, tablett, 60TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| 1259377 | nebivolool, 5mg | C07AB12 | NEBICARD 5MG, tablett, 90TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1269862 | nebivolool, 5mg | C07AB12 | NEBIVOLOL ACTAVIS, tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1269907 | nebivolool, 5mg | C07AB12 | NEBIVOLOL ACTAVIS, tablett, 90TK | Actavis Group PTC ehf | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1284386 | nebivolool, 5mg | C07AB12 | NEBIVOLOL ORION, tablett, 30TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1344259 | nebivolool, 5mg | C07AB12 | NEBIPHAR, tablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1445149 | nebivolool, 5mg | C07AB12 | NEBILET, tablett, 90TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|--|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1343001 | nepafenak, 1mg 1ml | S01BC10 | NEVANAC, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK | Alcon Laboratories Ltd | 50 | | | | | | katarakti operatsiooni järgseks kuni 60 päevaseks raviks kaasuva diabeetilise retinopaatia esinemisel |
| 1072572 | nifedipiin, 10mg | C08CA05 | CORINFAR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| 1005703 | nifedipiin, 20mg | C08CA05 | CORDIPIN RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15, I20- I20, O10-O16 | | | | | |
| | | | | | 75 | M34-M34 | Pediaater, Reumatoloog | esmane | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| 1034301 | nifedipiin, 20mg | C08CA05 | CORINFAR RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 75 | M34-M34 | Reumatoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15, I20- I20, O10-O16 | | | | | |
| 1072550 | nifedipiin, 20mg | C08CA05 | CORINFAR RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | Teva Pharma B.V. | 75 | M34-M34 | Pediaater, Reumatoloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15, I20- I20, O10-O16 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| 1006311 | nifedipiin, 30mg | C08CA05 | ADALAT OROS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | Bayer Pharma AG | 75 | I10-I13, I15-I15, I20- I20, O10-O16 | | | | | |
| | | | | | 75 | M34-M34 | Reumatoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|--|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1023422 | nifedipiin, 40mg | C08CA05 | CORDIPIN XL, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 20TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | I10-I13, I15-I15, I20- I20, O10-O16 | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M34-M34 | Pediaater, Reumatoloog | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1342190 | nilotiniib, 200mg | L01XE08 | TASIGNA, kõvakapsel, 112TK | Novartis Europharm Limited | 100 | C92.1-C92.1 | Hematoloog | | | | <p>patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine nilotiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: näidustatud on tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600 mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi), nilotiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi nilotiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2009. a.</p> |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1675571 | nintedaniib, 100mg | L01XE31 | OFEV, pehmekapsel, 60TK | Boehringer Ingelheim International GmbH | 100 | J84.1-J84.1 | Pulmonoloog | | | | patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast ja haigus püsib ravi käigus stabiilsena (FVC muutus on mõõdetud ning selle langus ei ületa 10% 12 kuu kohta). Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi. |
| 1675593 | nintedaniib, 150mg | L01XE31 | OFEV, pehmekapsel, 60TK | Boehringer Ingelheim International GmbH | 100 | J84.1-J84.1 | Pulmonoloog | | | | patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast ja haigus püsib ravi käigus stabiilsena (FVC muutus on mõõdetud ning selle langus ei ületa 10% 12 kuu kohta). Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi. |
| 1261842 | nitrendipiin, 10mg | C08CA08 | NITRESAN 10 MG, tablett, 50TK | Pro.Med.CS Praha a.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1014545 | nitrendipiin, 20mg | C08CA08 | LUSOPRESS, tablett, 28TK | Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.A. | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1261886 | nitrendipiin, 20mg | C08CA08 | NITRESAN 20 MG, tablett, 50TK | Pro.Med.CS Praha a.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1003857 | nitrofurantoiin, 50mg | J01XE01 | NITROFURANTOIN NYCOMED, tablett, 20TK | Takeda Pharma AS | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|-------------------------------------|------------------|--|------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1131589 | norelgestromiin+etünü ülöstradiol, 6mg+0,6mg | G03AA13 | EVRA, transdermaalne plaaster, 3TK | Janssen-Cilag International N.V. | 50 | | | | | | |
| 1175464 | noretisteroon+östradio ol, 0,5mg+1mg | G03FA01 | ACTIVEELLE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Novo Nordisk A/S | 50 | | | | | | |
| 1030453 | noretisteroon+östradio ol, 0+1mg/1mg+2mg/0+2 mg | G03FB05 | TRISEQUENS, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK / 10TK / 12TK | Novo Nordisk A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E89.4-E89.4, E28.3- E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97 | Endokrinoloog, Günekoloog | esmane | | 50,00 | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana |
| 1116560 | noretisteroon+östradio ol, 1mg+1mg/0+1mg | G03FB05 | NOVOFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK / 16TK | Novo Nordisk A/S | 100 | E89.4-E89.4, E28.3- E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97 | Endokrinoloog, Günekoloog | esmane | | 50,00 | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1030464 | noretisteroon+östradio ol, 1mg+2mg | G03FA01 | KLIOGEST, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Novo Nordisk A/S | 50 | | | | | | |
| 1005455 | norfloksatsiin, 400mg | J01MA06 | NOLICIN, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| 1005927 | nortriptüliin, 25mg | N06AA10 | NORITREN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | H. LUNDBECK A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | G62.0-G62.0, G63- G63 | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1012374 | ofloksatsiin, 200mg | J01MA01 | MEDOFLOXINE 200 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Medochemie Ltd | 50 | | | | | | |
| 1070693 | ofloksatsiin, 200mg | J01MA01 | TARIVID, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50 | | | | | | |
| 1089402 | ofloksatsiin, 200mg | J01MA01 | OFLOXIN 200, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Zentiva k.s. | 50 | | | | | | |
| 1009673 | okskarbesepiin, 300mg | N03AF02 | TRILEPTAL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | Novartis Finland OY | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1036044 | okskarbesepiin, 300mg | N03AF02 | APYDAN 300 MG, tablett, 50TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| 1326855 | okskarbesepiin, 300mg | N03AF02 | OXCARBAZEPINE TEVA 300 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | Teva Pharma B.V. | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1009684 | okskarbesepiin, 600mg | N03AF02 | TRILEPTAL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | Novartis Finland OY | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|----------|----------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1036033 | okskarbesepiin, 600mg | N03AF02 | APYDAN 600 MG, tablett, 50TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| 1326989 | okskarbesepiin, 600mg | N03AF02 | OXCARBAZEPINE TEVA 600 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | Teva Pharma B.V. | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1028483 | oksübutüniin, 5mg | G04BD04 | DRIPTANE, tablett, 60TK | Mylan Medical SAS | 75 | N31-N31 | Uroloog, Pediaater, Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1402568 | oksükodoon, 10mg | N02AA05 | OXYCONTIN 10 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. | 100 | R52.1-R52.1 | Reumatoloog, Anestesioloog, Neuroloog | esmane | | | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1416293 | oksükodoon, 10mg | N02AA05 | DOLOCODON 10 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 56TK | Zentiva k.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |
| | | | | | 100 | R52.1-R52.1 | Reumatoloog, Anestesioloog, Neuroloog | esmane | | | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1526576 | oksükodoon, 10mg | N02AA05 | OXYCODONE VITABALANS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | VITABALANS OY | 100 | R52.1-R52.1 | Neuroloog, Anestesioloog, Reumatoloog | esmane | | | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1402580 | oksükodoon, 20mg | N02AA05 | OXYCONTIN 20 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | R52.1-R52.1 | Anestesioloog, Reumatoloog, Neuroloog | esmane | | | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1416440 | oksükodoon, 20mg | N02AA05 | DOLOCODON 20 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 56TK | Zentiva k.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |
| | | | | | 100 | R52.1-R52.1 | Neuroloog, Anestesioloog, Reumatoloog | esmane | | | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|---|--|
| 1402603 | oksükodoon, 40mg | N02AA05 | OXYCONTIN 40 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. | 100 | R52.1-R52.1 | Neuroloog, Anestesioloog, Reumatoloog | esmane | | | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1416541 | oksükodoon, 40mg | N02AA05 | DOLOCODON 40 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 56TK | Zentiva k.s. | 100 | R52.1-R52.1 | Reumatoloog, Neuroloog, Anestesioloog | esmane | | | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1526554 | oksükodoon, 5mg | N02AA05 | OXYCODONE VITABALANS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | VITABALANS OY | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | R52.1-R52.1 | Reumatoloog, Neuroloog, Anestesioloog | esmane | | | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|------------------|---|--------|-----------|---|---|
| 1402625 | oksükodoon, 80mg | N02AA05 | OXYCONTIN 80 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. | 100 | R52.1-R52.1 | Neuroloog, Reumatoloog, Anestesioloog | esmane | | | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist | |
| 1267714 | olansapiin, 10mg | N05AH03 | OLANZAPIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1289516 | olansapiin, 10mg | N05AH03 | OLANZAPINE ACTAVIS, suus disperseeruv tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1326259 | olansapiin, 10mg | N05AH03 | ZALASTA, tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1326507 | olansapiin, 10mg | N05AH03 | ZALASTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1342820 | olansapiin, 10mg | N05AH03 | OLANZAPINE TEVA, suus dispergeeruv tablett, 28TK | Teva B.V. | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1354294 | olansapiin, 10mg | N05AH03 | OLANZAPINE ACCORD 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Accord Healthcare Limited | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1404481 | olansapiin, 10mg | N05AH03 | OLANZAPINE ORION 10 MG, suus dispergeeruv tablett, 28TK | Orion Corporation | 50 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1289572 | olansapiin, 15mg | N05AH03 | OLANZAPINE ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1326552 | olansapiin, 15mg | N05AH03 | ZALASTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1342886 | olansapiin, 15mg | N05AH03 | OLANZAPINE TEVA, suus dispergeeruv tablett, 28TK | Teva B.V. | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1354351 | olansapiin, 15mg | N05AH03 | OLANZAPINE ACCORD 15 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Accord Healthcare Limited | 50 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1404559 | olansapiin, 15mg | N05AH03 | OLANZAPINE ORION 15 MG, suus dispergeeruv tablett, 28TK | Orion Corporation | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1267455 | olansapiin, 5mg | N05AH03 | OLANZAPIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1289459 | olansapiin, 5mg | N05AH03 | OLANZAPINE ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|---|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1326406 | olansapiin, 5mg | N05AH03 | ZALASTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1342763 | olansapiin, 5mg | N05AH03 | OLANZAPINE TEVA, suus dispergeeruv tablett, 28TK | Teva B.V. | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1354104 | olansapiin, 5mg | N05AH03 | OLANZAPINE ACCORD 5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Accord Healthcare Limited | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1404414 | olansapiin, 5mg | N05AH03 | OLANZAPINE ORION 5 MG, suus dispergeeruv tablett, 28TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1407664 | olmesartaanmedokso miil, 10mg | C09CA08 | OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1407833 | olmesartaanmedokso miil, 20mg | C09CA08 | OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1407934 | olmesartaanmedokso miil, 40mg | C09CA08 | OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1308563 | olmesartaanmedokso miil+amlodipiin, 40mg+10mg | C09DB02 | SANORAL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|---|------------------|------------------|------------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1308451 | olmesartaanmedokso miil+amlodipiin, 40mg+5mg | C09DB02 | SANORAL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 75 50 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1452866 | olmesartaanmedokso miil+amlodipiin+hüdrok lorotiasiid, 40mg+10mg+12,5mg | C09DX80 | SANORAL HCT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 75 50 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1452709 | olmesartaanmedokso miil+amlodipiin+hüdrok lorotiasiid, 40mg+5mg+12,5mg | C09DX80 | SANORAL HCT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 50 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1530672 | olmesartaanmedokso miil+hüdroklorotiasiid, 20mg+12,5mg | C09DA08 | CO-OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1530762 | olmesartaanmedokso miil+hüdroklorotiasiid, 20mg+25mg | C09DA08 | CO-OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 50 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1648481 | olodaterool+tiitroopiu mbromiid, 2,5mcg+2,5mcg 1pihustus | R03AL06 | SPIOLTO RESPIMAT, inhalatsioonilahus, 60pihustus 1TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 50 75 | J43-J44 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1140220 | olopatadiin, 1mg 1ml | S01GX09 | OPATANOL, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK | Alcon Laboratories Ltd | 50 | | | | | | |
| 1674716 | ombitasviir+paritaprevii r+ritonaviir, 12,5mg+75mg+50mg | J05AX67 | VIEKIRAX, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | AbbVie Ltd | 100 | B18.2-B18.2 | Infektsionist, Gastroenteroloog | | | | 1. ja 4. genotüübi kroonilise progresseeruva C- viirushepatiidi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel esineb mõõdukas või raske maksafibroos (F2-4) ja kompenseeritud maksahaigus |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1062166 | omeprasool, 20mg | A02BC01 | OMEPRAZOLE- RATIOPHARM, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK | ratiopharm GmbH | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1062201 | omeprasool, 20mg | A02BC01 | GASEC GASTROCAPS 20 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK | MEPHA Lda. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1269222 | omeprasool, 20mg | A02BC01 | OMEPRAZOLE 20MG, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1269244 | omeprasool, 20mg | A02BC01 | OMEPRAZOLE 20MG, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1352393 | omeprasool, 20mg | A02BC01 | OMEPRAZOLE STADA 20 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK | Stada Arzneimittel AG | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1422942 | omeprasool, 20mg | A02BC01 | OMEFLUX, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1423077 | omeprasool, 20mg | A02BC01 | ULTOP, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1516250 | omeprasool, 20mg | A02BC01 | GASEC GASTROCAPS 20 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK | MEPHA Lda. | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1112814 | omeprasool, 40mg | A02BC01 | GASEC GASTROCAPS 40 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK | MEPHA Lda. | 50 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 75 | | | | | | |
| 1112825 | omeprasool, 40mg | A02BC01 | GASEC GASTROCAPS 40 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK | MEPHA Lda. | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1269301 | omeprasool, 40mg | A02BC01 | OMEPE 40MG, gastroresistentne kõvakapsel, 15TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1269323 | omeprasool, 40mg | A02BC01 | OMEPE 40MG, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|--------------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|--|--|
| 1269345 | omeprasool, 40mg | A02BC01 | OMEPRAN, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1005163 | ondansetroon, 8mg | A04AA01 | ZOFRAN, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Novartis Finland OY | 100 | C00-D48 | | | | | suukaudsest keemiaravist põhjustatud iivelduse ja oksendamise profülaktikaks ja raviks juhul, kui metoklopramiid ei ole esmase valikuna soovitatud või see on osutunud ebaefektiivseks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1137372 | oomega-3-rasvhappe etüülestrid 90, 1000mg | C10AX80 | OMACOR, pehmekapsel, 28TK | Pronova Biopharma Norge AS | 50 | | | | | | |
| 1110643 | oseltamiviir, 75mg | J05AH02 | TAMIFLU, kõvakapsel, 10TK | Roche Registration Limited | 50 | | | | | | |
| 1043020 | pantoprasool, 20mg | A02BC02 | CONTROLOC 20 MG, gastroresistentne tablett, 14TK | Takeda GmbH | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1249758 | pantoprasool, 20mg | A02BC02 | NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 14TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1249770 | pantoprasool, 20mg | A02BC02 | NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1277232 | pantoprasool, 20mg | A02BC02 | PANTOPRAZOLE ACTAVIS, gastroresistentne tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1418813 | pantoprasool, 20mg | A02BC02 | OZZION, gastroresistentne tablett, 28TK | Zentiva k.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1441178 | pantoprasool, 20mg | A02BC02 | PANTOPRAZOLE-MEPHA, gastroresistentne tablett, 14TK | MEPHA Lda. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1441189 | pantoprasool, 20mg | A02BC02 | PANTOPRAZOLE-MEPHA, gastroresistentne tablett, 28TK | MEPHA Lda. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1537006 | pantoprasool, 20mg | A02BC02 | PANTOPRAZOLE-MEPHA, gastroresistentne tablett, 56TK | MEPHA Lda. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1043031 | pantoprasool, 40mg | A02BC02 | CONTROLOC 40 MG, gastroresistentne tablett, 14TK | Takeda GmbH | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1249646 | pantoprasool, 40mg | A02BC02 | NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 14TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1249668 | pantoprasool, 40mg | A02BC02 | NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1277344 | pantoprasool, 40mg | A02BC02 | PANTOPRAZOLE ACTAVIS, gastroresistentne tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1280449 | pantoprasool, 40mg | A02BC02 | PANTOPRAZOL - RATIOPHARM 40 MG, gastroresistentne tablett, 14TK | ratiopharm GmbH | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1418835 | pantoprasool, 40mg | A02BC02 | OZZION, gastroresistentne tablett, 28TK | Zentiva k.s. | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|----------|----------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1441190 | pantoprasool, 40mg | A02BC02 | PANTOPRAZOLE-MEPHA, gastroresistentne tablett, 14TK | MEPHA Lda. | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1441202 | pantoprasool, 40mg | A02BC02 | PANTOPRAZOLE-MEPHA, gastroresistentne tablett, 28TK | MEPHA Lda. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1537028 | pantoprasool, 40mg | A02BC02 | PANTOPRAZOLE-MEPHA, gastroresistentne tablett, 56TK | MEPHA Lda. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1299405 | parikaltsitool, 1mcg | H05BX02 | ZEMPLAR, pehmekapsel, 28TK | AbbVie SIA | 100 | N18-N18 | Nefroloog, Pediaater | | | | hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi teiste vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1299438 | parikaltsitool, 2mcg | H05BX02 | ZEMPLAR, pehmekapsel, 28TK | AbbVie SIA | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | Pediaater, Nefroloog | | | | hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi teiste vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) |
| 1060232 | paroksetiin, 20mg | N06AB05 | SEROXAT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | SmithKline Beecham Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F33.2-F33.3, F32.2- F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1096837 | paroksetiin, 20mg | N06AB05 | REXETIN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Gedeon Richter Plc. | 100 | F33.2-F33.3, F32.2- F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1110799 | paroksetiin, 20mg | N06AB05 | PAROXETIN HEXAL 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | HEXAL AG | 100 | F33.2-F33.3, F32.2- F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1185072 | paroksetiin, 20mg | N06AB05 | PAROXETIN ACTAVIS 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Actavis Nordic A/S | 100 | F33.2-F33.3, F32.2- F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1244900 | paroksetiin, 20mg | N06AB05 | ARKETIS 20 MG, tablett, 30TK | Medochemie Ltd | 100 | F33.2-F33.3, F32.2- F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1110834 | paroksetiin, 40mg | N06AB05 | PAROXETIN HEXAL 40 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | HEXAL AG | 100 | F33.2-F33.3, F32.2- F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1245103 | paroksetiin, 40mg | N06AB05 | ARKETIS 40 MG, tablett, 30TK | Medochemie Ltd | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F33.2-F33.3, F32.2- F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|--|
| 1482027 | pasopaniib, 200mg | L01XE11 | VOTRIENT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Novartis Europharm Limited | 100 | C64-C64 | Onkoloog | | | | IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi esimese rea ravina või teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine pasopaniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|--|
| 1482050 | pasopaniib, 400mg | L01XE11 | VOTRIENT, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Novartis Europharm Limited | 100 | C64-C64 | Onkoloog | | | | IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi esimese rea ravina või teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kelle ravi alustamine ja jätkamine pasopaniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |
| 1009404 | pentoksüfülliin, 400mg | C04AD03 | TRENTAL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | Takeda GmbH | 50 | | | | | | |
| 1147980 | pentoksüfülliin, 400mg | C04AD03 | PENTILIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| 1028854 | pentoksüfülliin, 600mg | C04AD03 | VASONIT RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK | G.L. Pharma GmbH | 50 | | | | | | |
| 1473409 | pentoksüfülliin, 600mg | C04AD03 | VASONIT RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | G.L. Pharma GmbH | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---------------------------------------|----------|---|--|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1168422 | perindopriil, 10mg | C09AA04 | PRESTARIUM ARGININE 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Les Laboratoires Servier | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1302860 | perindopriil, 4mg | C09AA04 | STOPRESS, tablett, 30TK | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1377233 | perindopriil, 4mg | C09AA04 | PRENESSA, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1168310 | perindopriil, 5mg | C09AA04 | PRESTARIUM ARGININE 5MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Les Laboratoires Servier | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1302871 | perindopriil, 8mg | C09AA04 | STOPRESS, tablett, 30TK | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1377312 | perindopriil, 8mg | C09AA04 | PRENESSA, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1289101 | perindopriil+amlodipiin, 10mg+10mg | C09BB04 | COVERAM, tablett, 30TK | Les Laboratories Servier | 75 | I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1602852 | perindopriil+amlodipiin, 10mg+10mg | C09BB04 | PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA, tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15 | | | | | |
| 1288953 | perindopriil+amlodipiin, 10mg+5mg | C09BB04 | COVERAM, tablett, 30TK | Les Laboratories Servier | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15 | | | | | |
| 1603000 | perindopriil+amlodipiin, 10mg+5mg | C09BB04 | PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA, tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 75 | I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1499250 | perindopriil+amlodipiin, 4mg+10mg | C09BB04 | DALNESSA, tablett, 30TK | Krka d.d. Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|-----------------------------|------------------|------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1499003 | perindopriil+amlodipiin, 4mg+5mg | C09BB04 | DALNESSA, tablett, 30TK | Krka d.d. Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1288818 | perindopriil+amlodipiin, 5mg+10mg | C09BB04 | COVERAM, tablett, 30TK | Les Laboratories Servier | 75 | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1602953 | perindopriil+amlodipiin, 5mg+10mg | C09BB04 | PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA, tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 75 | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1288672 | perindopriil+amlodipiin, 5mg+5mg | C09BB04 | COVERAM, tablett, 30TK | Les Laboratories Servier | 75 | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1602908 | perindopriil+amlodipiin, 5mg+5mg | C09BB04 | PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA, tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 75 | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1499126 | perindopriil+amlodipiin, 8mg+10mg | C09BB04 | DALNESSA, tablett, 30TK | Krka d.d. Novo Mesto | 75 | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1499069 | perindopriil+amlodipiin, 8mg+5mg | C09BB04 | DALNESSA, tablett, 30TK | Krka d.d. Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1588079 | perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 10mg+10mg+2,5mg | C09BX01 | TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Les Laboratoires Servier | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1588091 | perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 10mg+10mg+2,5mg | C09BX01 | TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Les Laboratoires Servier | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1588024 | perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 10mg+5mg+2,5mg | C09BX01 | TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Les Laboratoires Servier | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1588046 | perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 10mg+5mg+2,5mg | C09BX01 | TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Les Laboratoires Servier | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1602481 | perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 4mg+10mg+1,25mg | C09BX01 | CO-DALNESSA, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|-----------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1602571 | perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 4mg+5mg+1,25mg | C09BX01 | CO-DALNESSA, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1587977 | perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 5mg+10mg+1,25mg | C09BX01 | TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Les Laboratoires Servier | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1587999 | perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 5mg+10mg+1,25mg | C09BX01 | TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Les Laboratoires Servier | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1587922 | perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 5mg+5mg+1,25mg | C09BX01 | TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Les Laboratoires Servier | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1587944 | perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 5mg+5mg+1,25mg | C09BX01 | TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Les Laboratoires Servier | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1602683 | perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 8mg+10mg+2,5mg | C09BX01 | CO-DALNESSA, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1602795 | perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 8mg+5mg+2,5mg | C09BX01 | CO-DALNESSA, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1339488 | perindopriil+indapamiid , 10mg+2,5mg | C09BA04 | NOLITERAX 10 MG/2,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Les Laboratoires Servier | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1229587 | perindopriil+indapamiid , 2,5mg+0,625mg | C09BA04 | NOLIPREL ARGININE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Les Laboratories Servier | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1544374 | perindopriil+indapamiid , 2,5mg+0,625mg | C09BA04 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1600647 | perindopriil+indapamiid , 2,5mg+0,625mg | C09BA04 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Teva Pharma B.V. | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1407068 | perindopriil+indapamiid , 2mg+0,625mg | C09BA04 | CO-PRENESSA, tablett, 30TK | Krka, d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1407158 | perindopriil+indapamiid , 4mg+1,25mg | C09BA04 | CO-PRENESSA, tablett, 30TK | Krka, d.d., Novo mesto | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1229879 | perindopriil+indapamiid , 5mg+1,25mg | C09BA04 | NOLIPREL FORTE ARGININE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Les Laboratories Servier | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1544486 | perindopriil+indapamiid , 5mg+1,25mg | C09BA04 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1600670 | perindopriil+indapamiid , 5mg+1,25mg | C09BA04 | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1407248 | perindopriil+indapamiid , 8mg+2,5mg | C09BA04 | CO-PRENESSA, tablett, 30TK | Krka, d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1104680 | pimekroliimus, 10mg 1g | D11AH02 | ELIDEL, kreem, 15g 1TK | SIA Meda Pharma | 50 | | | | | | |
| 1563454 | pioglitason, 15mg | A10BG03 | PIOGLITAZONE ACCORD, tablett, 28TK | Accord Healthcare Limited | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi kombineeritud raviks; kombineeritud ravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1564714 | pioglitason, 15mg | A10BG03 | PIOGLITAZONE TEVA, tablett, 28TK | Teva B.V. | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud. |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1498495 | pioglitason, 30mg | A10BG03 | ZIPION 30MG, tablett, 28TK | Zentiva k.s. | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud. |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1563555 | pioglitason, 30mg | A10BG03 | PIOGLITAZONE ACCORD, tablett, 28TK | Accord Healthcare Limited | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1564815 | pioglitason, 30mg | A10BG03 | PIOGLITAZONE TEVA, tablett, 28TK | Teva B.V. | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud. |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|--|---|
| 1563757 | pioglitason, 45mg | A10BG03 | PIOGLITAZONE ACCORD, tablett, 28TK | Accord Healthcare Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| 1564916 | pioglitason, 45mg | A10BG03 | PIOGLITAZONE TEVA, tablett, 28TK | Teva B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud. | |
| 1023343 | piratsetaam, 800mg | N06BX03 | NOOTROPIL, tablett, 30TK | UCB Pharma OY Finland | 50 | G25.3-G25.3 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1518870 | pirfenidoon, 267mg | L04AX05 | ESBRIET, kõvakapsel, 63TK | Roche Registration Limited | 100 | J84.1-J84.1 | Pulmonoloog | | | | patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast ja haigus püsib ravi käigus stabiilsena (FVC muutus on mõõdetud ning selle langus ei ületa 10% 12 kuu kohta). Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi. |
| 1518881 | pirfenidoon, 267mg | L04AX05 | ESBRIET, kõvakapsel, 252TK | Roche Registration Limited | 100 | J84.1-J84.1 | Pulmonoloog | | | | patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast ja haigus püsib ravi käigus stabiilsena (FVC muutus on mõõdetud ning selle langus ei ületa 10% 12 kuu kohta). Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi. |
| 1039889 | piroksikaam, 20mg | M01AC01 | BREXIN, tablett, 20TK | UAB Norameda | 50 | | | | | | |
| 1039890 | piroksikaam, 20mg | M01AC01 | BREXIN, suukaudse lahuse pulber, 20TK | UAB Norameda | 50 | | | | | | |
| 1033681 | podofüllotoksiin, 5mg 1ml | D06BB04 | WARTEC, nahalahus, 3ml 1TK | Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd. | 50 | | | | | | |
| 1271775 | polüstürensulfonaat, 949mg 1g | V03AE01 | SORBISTERIT, suukaudse /rektaalsuspensiooni pulber, 500g 1TK | Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH | 100 | N18-N18 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|--|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1646175 | posakonasool, 100mg | J02AC04 | NOXAFIL, gastroresistentne tablett, 24TK | Merck Sharp & Dohme | 100 | B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44 | | | | | vereloome tüvirakkude siirdamisega seotud transplantaat- peremehe-vastu haiguse, ägeda müeloidse leukeemia, ägeda lümfoblastse leukeemia või müelodüsplastilise sündroomi intensiivsest keemiaravist tingitud mükoosi profülaktikaks |
| 1218866 | posakonasool, 40mg 1ml | J02AC04 | NOXAFIL, suukaudne suspensioon, 105ml 1TK | Merck Sharp & Dohme | 100 | B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44 | | | | | vereloome tüvirakkude siirdamisega seotud transplantaat- peremehe-vastu haiguse, ägeda müeloidse leukeemia, ägeda lümfoblastse leukeemia või müelodüsplastilise sündroomi intensiivsest keemiaravist tingitud mükoosi profülaktikaks |
| 1323256 | pramipeksool, 0,088mg | N04BC05 | EZAPREV 0,088 MG, tablett, 30TK | UAB Norameda | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1339332 | pramipeksool, 0,088mg | N04BC05 | PRAMIPEXOLE ORION, tablett, 30TK | Orion Corporation | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1041253 | pramipeksool, 0,18mg | N04BC05 | MIRAPEXIN, tablett, 30TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1323267 | pramipeksool, 0,18mg | N04BC05 | EZAPREV 0,18 MG, tablett, 30TK | UAB Norameda | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1339354 | pramipeksool, 0,18mg | N04BC05 | PRAMIPEXOLE ORION, tablett, 30TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|----------|
| 1450998 | pramipeksool, 0,26mg | N04BC05 | MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1451023 | pramipeksool, 0,52mg | N04BC05 | MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1637210 | pramipeksool, 0,52mg | N04BC05 | OPRYMEA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1041264 | pramipeksool, 0,7mg | N04BC05 | MIRAPEXIN, tablett, 30TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1323313 | pramipeksool, 0,7mg | N04BC05 | EZAPREV 0,7 MG, tablett, 100TK | UAB Norameda | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1339400 | pramipeksool, 0,7mg | N04BC05 | PRAMIPEXOLE ORION, tablett, 30TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1373824 | pramipeksool, 0,7mg | N04BC05 | OPRYMEA, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1451067 | pramipeksool, 1,05mg | N04BC05 | MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1637265 | pramipeksool, 1,05mg | N04BC05 | OPRYMEA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1451135 | pramipeksool, 2,1mg | N04BC05 | MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1637344 | pramipeksool, 2,1mg | N04BC05 | OPRYMEA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|---|-----------|--------|-----------|---|------------------------|
| 1451168 | pramipeksool, 3,15mg | N04BC05 | MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1677719 | pramipeksool, 3,15mg | N04BC05 | OPRYMEA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1286681 | pravastatiin, 10mg | C10AA03 | PRAVASTATIN ACCORD 10MG, tablett, 28TK | Accord Healthcare Limited | 100 | N18-N18 | | | | | alates III staadiumist |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------|---|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1026201 | pravastatiin, 20mg | C10AA03 | LIPOSTAT 20 MG, tablett, 30TK | Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedelmi Kft. | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | |
| 1118034 | pravastatiin, 20mg | C10AA03 | PRAVAHEXAL 20 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1286704 | pravastatiin, 20mg | C10AA03 | PRAVASTATIN ACCORD 20MG, tablett, 28TK | Accord Healthcare Limited | 100 | N18-N18 | | | | | alates III staadiumist |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| 1118056 | pravastatiin, 40mg | C10AA03 | PRAVAHEXAL 40 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|---|--|--------|-----------|---|--|
| 1286715 | pravastatiin, 40mg | C10AA03 | PRAVASTATIN ACCORD 40MG, tablett, 28TK | Accord Healthcare Limited | 75 | I11-I12 | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| 1065776 | prednisoloon, 5mg | H02AB06 | PREDNISOLON-RICHTER, tablett, 100TK | Gedeon Richter Plc. | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 100 | G70-G70 | Neuroloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10- L10, L20-L20 | Dermatoveneroloog, Allergoloog- immunoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 100 | D59-D59, D69-D69, D60-D64 | Pediaater, Hematoloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | K50-K51, K73-K74 | Pediaater, Gastroenteroloog | | | | |
| | | | | | 75 | L40-L40 | Dermatoveneroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | Reumatoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | N00-N08 | Nefroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 100 | E89.6-E89.6, E27- E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25 | Pediaater, Endokrinoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 75 | J45-J45 | | | | | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|-----------------------------------|---|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1031702 | prednisoloon+salitsüül hape, 0,2%+0,4% | D07XA81 | ALPICORT, nahalahus, 100ml 1TK | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50 | | | | | | |
| 1208652 | pregabaliin, 150mg | N03AX16 | LYRICA, kõvakapsel, 14TK | Pfizer Limited | 50 | | | | | | epilepsia, perifeerse või tsentraalse neuropaatilise valu ja generaliseerunud ärevushäire raviks pärast muu näidustatud farmakoteraapia ebaõnnestumist |
| 1208663 | pregabaliin, 150mg | N03AX16 | LYRICA, kõvakapsel, 56TK | Pfizer Limited | 50 | | | | | | epilepsia, perifeerse või tsentraalse neuropaatilise valu ja generaliseerunud ärevushäire raviks pärast muu näidustatud farmakoteraapia ebaõnnestumist |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1655513 | pregabaliin, 150mg | N03AX16 | PRAGIOLA, kõvakapsel, 14TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 75 | G63.2-G63.2 | Endokrinoloog, Neuroloog | esmane | | | ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|---|--|
| 1655546 | pregabaliin, 150mg | N03AX16 | PRAGIOLA, kõvakapsel, 56TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | G63.2-G63.2 | Neuroloog, Endokrinoloog | esmane | | | ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1656446 | pregabaliin, 150mg | N03AX16 | PREGABALIN TEVA, kõvakapsel, 14TK | Teva B.V. | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | G63.2-G63.2 | Endokrinoloog, Neuroloog | esmane | | | ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1657795 | pregabaliin, 150mg | N03AX16 | BRIEKA, kõvakapsel, 14TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | G63.2-G63.2 | Endokrinoloog, Neuroloog | esmane | | | ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1657829 | pregabaliin, 150mg | N03AX16 | BRIEKA, kõvakapsel, 56TK | Actavis Group PTC ehf | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 75 | G63.2-G63.2 | Neuroloog, Endokrinoloog | esmane | | | ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|---|--|
| 1693122 | pregabaliin, 150mg | N03AX16 | PREGABALIN ZENTIVA, kõvakapsel, 14TK | Zentiva k.s. | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | G63.2-G63.2 | Neuroloog, Endokrinoloog | esmane | | ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1693133 | pregabaliin, 150mg | N03AX16 | PREGABALIN ZENTIVA, kõvakapsel, 56TK | Zentiva k.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | G63.2-G63.2 | Neuroloog, Endokrinoloog | esmane | | | ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müüjiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1695630 | pregabaliin, 150mg | N03AX16 | PREGABALIN ACCORD, kõvakapsel, 14TK | Accord Healthcare Limited | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 75 | G63.2-G63.2 | Neuroloog, Endokrinoloog | esmane | | | ravimi esmase väljakirjutamise õigus neurooloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|---|--|
| 1695663 | pregabaliin, 150mg | N03AX16 | PREGABALIN ACCORD, kõvakapsel, 56TK | Accord Healthcare Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 75 | G63.2-G63.2 | Endokrinoloog, Neuroloog | esmane | | | ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
| 1252617 | pregabaliin, 225mg | N03AX16 | LYRICA, kõvakapsel, 14TK | Pfizer Limited | 50 | | | | | epilepsia, perifeerse või tsentraalse neuroopaatilise valu ja generaliseerunud ärevushäire raviks pärast muu näidustatud farmakoteraapia ebaõnnestumist | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|--|--|
| 1208731 | pregabaliin, 300mg | N03AX16 | LYRICA, kõvakapsel, 14TK | Pfizer Limited | 50 | | | | | | epilepsia, perifeerse või tsentraalse neuropaatilise valu ja generaliseerunud ärevushäire raviks pärast muu näidustatud farmakoteraapia ebaõnnestumist |
| 1655760 | pregabaliin, 300mg | N03AX16 | PRAGIOLA, kõvakapsel, 14TK | KRKA d.d., Novo mesto | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | G63.2-G63.2 | Endokrinoloog, Neuroloog | esmane | | ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1208573 | pregabaliin, 75mg | N03AX16 | LYRICA, kõvakapsel, 14TK | Pfizer Limited | 50 | | | | | | epilepsia, perifeerse või tsentraalse neuropaatilise valu ja generaliseerunud ärevushäire raviks pärast muu näidustatud farmakoteraapia ebaõnnestumist |
| 1208584 | pregabaliin, 75mg | N03AX16 | LYRICA, kõvakapsel, 56TK | Pfizer Limited | 50 | | | | | | epilepsia, perifeerse või tsentraalse neuropaatilise valu ja generaliseerunud ärevushäire raviks pärast muu näidustatud farmakoteraapia ebaõnnestumist |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1655355 | pregabaliin, 75mg | N03AX16 | PRAGIOLA, kõvakapsel, 14TK | KRKA d.d., Novo mesto | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | G63.2-G63.2 | Endokrinoloog, Neuroloog | esmane | | | ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müüjiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1655388 | pregabaliin, 75mg | N03AX16 | PRAGIOLA, kõvakapsel, 56TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 75 | G63.2-G63.2 | Neuroloog, Endokrinoloog | esmane | | | ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|---|--|
| 1656334 | pregabaliin, 75mg | N03AX16 | PREGABALIN TEVA, kõvakapsel, 14TK | Teva B.V. | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | G63.2-G63.2 | Endokrinoloog, Neuroloog | esmane | | ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1657717 | pregabaliin, 75mg | N03AX16 | BRIEKA, kõvakapsel, 14TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 75 | G63.2-G63.2 | Endokrinoloog, Neuroloog | esmane | | | ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|---|--|
| 1657740 | pregabaliin, 75mg | N03AX16 | BRIEKA, kõvakapsel, 56TK | Actavis Group PTC ehf | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | G63.2-G63.2 | Neuroloog, Endokrinoloog | esmane | | ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|---|--|
| 1693043 | pregabaliin, 75mg | N03AX16 | PREGABALIN ZENTIVA, kõvakapsel, 14TK | Zentiva k.s. | 75 | G63.2-G63.2 | Endokrinoloog, Neuroloog | esmane | | | ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1693065 | pregabaliin, 75mg | N03AX16 | PREGABALIN ZENTIVA, kõvakapsel, 56TK | Zentiva k.s. | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 75 | G63.2-G63.2 | Neuroloog, Endokrinoloog | esmane | | | ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müüjiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1695438 | pregabaliin, 75mg | N03AX16 | PREGABALIN ACCORD, kõvakapsel, 14TK | Accord Healthcare Limited | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | G63.2-G63.2 | Neuroloog, Endokrinoloog | esmane | | | ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--------|-----------|---|--|
| 1695461 | pregabaliin, 75mg | N03AX16 | PREGABALIN ACCORD, kõvakapsel, 56TK | Accord Healthcare Limited | 75 | G63.2-G63.2 | Neuroloog, Endokrinoloog | esmane | | | ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid | |
| 1077027 | primidoon, 250mg | N03AA03 | LISKANTIN, tablett, 100TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1020126 | propafenoon, 150mg | C01BC03 | RYTMONORM, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | Mylan Healthcare GmbH | 50 | | | | | | |
| 1044526 | propafenoon, 150mg | C01BC03 | PROPANORM 150 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | PRO.MED.CS Praha a.s. | 50 | | | | | | |
| 1020137 | propafenoon, 300mg | C01BC03 | RYTMONORM, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | Mylan Healthcare GmbH | 50 | | | | | | |
| 1053223 | propranolool, 40mg | C07AA05 | PROPRA-RATIOPHARM 40 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1596944 | propranolool, 40mg | C07AA05 | PROPRANOLOL ACCORD 40MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | Accord Healthcare Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1028696 | propüültiouratsiil, 50mg | H03BA02 | TIOTIL, tablett, 100TK | Leyh Pharma GmbH | 50 | | | | | | |
| 1078310 | pseudoefedriin+loratad iin, 240mg+10mg | R01BA89 | CLARINASE, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 7TK | UAB Bayer | 50 | | | | | | |
| 1141311 | pseudoefedriin+tsetirisi in, 120mg+5mg | R01BA93 | CIRRUS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 14TK | UCB Pharma OY Finland | 50 | | | | | | |
| 1074451 | püridostigmiinbromiid, 60mg | N07AA02 | KALYMIN 60 N, tablett, 100TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G70-G70 | Pediaater, Neuroloog | esmane | | | |
| 1059218 | ramipriil, 10mg | C09AA05 | CARDACE, tablett, 28TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1153527 | ramipriil, 10mg | C09AA05 | RAMICOR 10 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1169939 | ramipriil, 10mg | C09AA05 | RAMIPRIL ACTAVIS 10MG, tablett, 28TK | Actavis Nordic A/S | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1190078 | ramipriil, 10mg | C09AA05 | AMPRIIL 10 MG, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1190090 | ramipriil, 10mg | C09AA05 | AMPRIIL 10 MG, tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1217977 | ramipriil, 10mg | C09AA05 | RAMICOR 10 MG, tablett, 60TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1502345 | ramipriil, 10mg | C09AA05 | CARDACE, tablett, 56TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1583423 | ramipriil, 10mg | C09AA05 | RAMIPRIL ACTAVIS 10MG, tablett, 90TK | Actavis Nordic A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1005826 | ramipriil, 2,5mg | C09AA05 | CARDACE 2,5 MG, tablett, 28TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1074743 | ramipriil, 2,5mg | C09AA05 | CARDACE 2,5 MG, tablett, 98TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1153381 | ramipriil, 2,5mg | C09AA05 | RAMICOR 2,5 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1189953 | ramipriil, 2,5mg | C09AA05 | AMPRIL 2,5 MG, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1005859 | ramipriil, 5mg | C09AA05 | CARDACE 5 MG, tablett, 28TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1074754 | ramipriil, 5mg | C09AA05 | CARDACE 5 MG, tablett, 98TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1153459 | ramipriil, 5mg | C09AA05 | RAMICOR 5 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1169849 | ramipriil, 5mg | C09AA05 | RAMIPRIL ACTAVIS 5MG, tablett, 28TK | Actavis Nordic A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1190034 | ramipriil, 5mg | C09AA05 | AMPRIL 5 MG, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1190056 | ramipriil, 5mg | C09AA05 | AMPRIIL 5 MG, tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1217966 | ramipriil, 5mg | C09AA05 | RAMICOR 5 MG, tablett, 60TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| 1502198 | ramipriil, 5mg | C09AA05 | CARDACE 5 MG, tablett, 56TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1583412 | ramipriil, 5mg | C09AA05 | RAMIPRIIL ACTAVIS 5MG, tablett, 90TK | Actavis Nordic A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| 1510467 | ramipriil+amlodipiin, 10mg+10mg | C09BB07 | RAMDACORDIA, kõvakapsel, 30TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75 | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1510388 | ramipriil+amlodipiin, 10mg+5mg | C09BB07 | RAMDACORDIA, kõvakapsel, 30TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1510423 | ramipriil+amlodipiin, 5mg+10mg | C09BB07 | RAMDACORDIA, kõvakapsel, 30TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75 | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1510344 | ramipriil+amlodipiin, 5mg+5mg | C09BB07 | RAMDACORDIA, kõvakapsel, 30TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1512953 | ramipriil+hüdroklorotiasiid, 10mg+12,5mg | C09BA05 | CARDACE FORTE, tablett, 56TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1513022 | ramipriil+hüdroklorotiasiid, 10mg+25mg | C09BA05 | CARDACE FORTE, tablett, 56TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1021936 | ramipriil+hüdroklorotiasiid, 2,5mg+12,5mg | C09BA05 | CARDACE COMP, tablett, 28TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------|--------|-----------|------------|------------|
| 1113657 | ramipriil+hüdroklorotia siid, 2,5mg+12,5mg | C09BA05 | CO-RAMICOR 2,5 MG/12,5 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1190269 | ramipriil+hüdroklorotia siid, 2,5mg+12,5mg | C09BA05 | AMPRIIL HL 2,5MG/12,5MG, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1113680 | ramipriil+hüdroklorotia siid, 5mg+25mg | C09BA05 | CO-RAMICOR 5 MG/25 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1141715 | ramipriil+hüdroklorotia siid, 5mg+25mg | C09BA05 | CARDACE PLUS, tablett, 28TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1190179 | ramipriil+hüdroklorotia siid, 5mg+25mg | C09BA05 | AMPRIIL HD 5MG/25MG, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1134986 | ranitidiin, 150mg | A02BA02 | RANISAN 150 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | PRO.MED.CS Praha a.s. | 50 | | | | | | |
| 1581599 | ranitidiin, 150mg | A02BA02 | RANITIDINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Accord Healthcare Limited | 50 | | | | | | |
| 1582028 | ranitidiin, 300mg | A02BA02 | RANITIDINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Accord Healthcare Limited | 50 | | | | | | |
| 1203422 | rasagiliin, 1mg | N04BD02 | AZILECT, tablett, 28TK | Teva B.V. | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1678215 | rasagiliin, 1mg | N04BD02 | RALAGO, tablett, 30TK | Krka d.d. Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1011036 | raud(III)hüdroksiid- polümaltoos kompleks, 100mg | B03AB80 | FERRUM LEK, närimistablett, 30TK | Lek Pharmaceuticals d.d. | 75 | D50-D50 | | | | | rasedatele |
| | | | | | 50 | D50-D50 | | | | 3,00 | |
| 1011025 | raud(III)hüdroksiid- polümaltoos kompleks, 10mg 1ml | B03AB80 | FERRUM LEK, siirup, 100ml 1TK | Lek Pharmaceuticals d.d. | 75 | D50-D50 | | | | | rasedatele |
| | | | | | 50 | D50-D50 | | | | 3,00 | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1524811 | retigabiin, 100mg | N03AX21 | TROBALT, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK | Glaxo Group Ltd. | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid ei ole meditsiiniliselt sobivad |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1524844 | retigabiin, 200mg | N03AX21 | TROBALT, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK | Glaxo Group Ltd. | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid ei ole meditsiiniliselt sobivad |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1524866 | retigabiin, 300mg | N03AX21 | TROBALT, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK | Glaxo Group Ltd. | 50 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid ei ole meditsiiniliselt sobivad |
| | | | | | 100 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1524888 | retigabiin, 400mg | N03AX21 | TROBALT, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK | Glaxo Group Ltd. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid ei ole meditsiiniliselt sobivad |
| 1524787 | retigabiin, 50mg | N03AX21 | TROBALT, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK | Glaxo Group Ltd. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid ei ole meditsiiniliselt sobivad |
| 1073034 | ribaviriin, 200mg | J05AB04 | REBETOL, kõvakapsel, 140TK | Merck Sharp & Dohme Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | B18.2-B18.2 | Infektsionist, Gastroenteroloog | | | | kroonilise progresseeruva kuluga C-viirushepatiidi raviks |
| 1161447 | ribaviriin, 200mg | J05AB04 | COPEGUS, õhukese polümeerikattega tablett, 168TK | Roche Eesti OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | B18.2-B18.2 | Gastroenteroloog, Infektsionist | | | | kroonilise progresseeruva kuluga C-viirushepatiidi raviks |
| 1585346 | ribaviriin, 200mg | J05AB04 | MODERIBA, õhukese polümeerikattega tablett, 168TK | AbbVie SIA | 100 | B18.2-B18.2 | Infektsionist, Gastroenteroloog | | | | kroonilise progresseeruva kuluga C-viirushepatiidi raviks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1035289 | rilusool, 50mg | N07XX02 | RILUTEK, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Aventis Pharma SA | 100 | G12.2-G12.2 | Neuroloog | esmane | | | mehhaanilise ventilatsiooni vajaduseta patsientidele |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|---|
| 1644375 | riotsiguaat, 0,5mg | C02KX05 | ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK | Bayer Pharma AG | 100 | I27.0-I27.0 | Reumatoloog, Pulmonoloog, Kardioloog, Pediaater | | | | konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel patsientidele, kellele kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile |
| 1644432 | riotsiguaat, 1,5mg | C02KX05 | ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK | Bayer Pharma AG | 100 | I27.0-I27.0 | Kardioloog, Pulmonoloog, Reumatoloog, Pediaater | | | | konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel patsientidele, kellele kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile |
| 1644409 | riotsiguaat, 1mg | C02KX05 | ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK | Bayer Pharma AG | 100 | I27.0-I27.0 | Reumatoloog, Pediaater, Pulmonoloog, Kardioloog | | | | konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel patsientidele, kellele kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|--|
| 1644498 | riotsiguaat, 2,5mg | C02KX05 | ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK | Bayer Pharma AG | 100 | I27.0-I27.0 | Reumatoloog, Pediaater, Pulmonoloog, Kardioloog | | | | konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel patsientidele, kellele kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile |
| 1644465 | riotsiguaat, 2mg | C02KX05 | ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK | Bayer Pharma AG | 100 | I27.0-I27.0 | Kardioloog, Reumatoloog, Pediaater, Pulmonoloog | | | | konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel patsientidele, kellele kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile |
| 1032804 | risatriptaan, 10mg | N02CC04 | MAXALT, suukaudne lüofilisaat, 2TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50 | | | | | | |
| 1285680 | risedroonhape, 35mg | M05BA07 | RISENDROS 35MG, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK | Zentiva k.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1298257 | risedroonhape, 35mg | M05BA07 | NORIFAZ, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK | Zaklad Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A. | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1298336 | risedroonhape, 35mg | M05BA07 | RISEDRONATE SODIUM ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |
| 1310757 | risedroonhape, 35mg | M05BA07 | RISONATE, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |
| 1310780 | risedroonhape, 35mg | M05BA07 | RISONATE, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |
| 1060456 | risperidoon, 1mg | N05AX08 | RISPOLEPT 1 mg, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Johnson & Johnson UAB | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1367670 | risperidoon, 1mg | N05AX08 | RISPERIDONE ACCORD 1 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Accord Healthcare Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | |
| 1367704 | risperidoon, 1mg | N05AX08 | RISPERIDONE ACCORD 1 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | Accord Healthcare Limited | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1041028 | risperidoon, 1mg 1ml | N05AX08 | RISPOLEPT, suukaudne lahus, 100ml 1TK | Johnson & Johnson UAB | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1067509 | risperidoon, 2mg | N05AX08 | RISPOLEPT 2 mg, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Johnson & Johnson UAB | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1151974 | risperidoon, 2mg | N05AX08 | RISPERIDON ACTAVIS 2MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Actavis Nordic A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | |
| 1367726 | risperidoon, 2mg | N05AX08 | RISPERIDONE ACCORD 2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Accord Healthcare Limited | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1067521 | risperidoon, 3mg | N05AX08 | RISPOLEPT 3 mg, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Johnson & Johnson UAB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | |
| 1367760 | risperidoon, 3mg | N05AX08 | RISPERIDONE ACCORD 3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Accord Healthcare Limited | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1067532 | risperidoon, 4mg | N05AX08 | RISPOLEPT 4 mg, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Johnson & Johnson UAB | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1152010 | risperidoon, 4mg | N05AX08 | RISPERIDON ACTAVIS 4MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Actavis Nordic A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-----------|------------|-----------------|
| 1367805 | risperidoon, 4mg | N05AX08 | RISPERIDONE ACCORD 4 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Accord Healthcare Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater | | | | |
| 1381665 | rivaroksabaan, 10mg | B01AF01 | XARELTO, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Bayer Pharma AG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | S72.0-S72.2, S72.7- S72.7, M16-M17 | | | | | kuni 30 päevaks |
| 1381676 | rivaroksabaan, 10mg | B01AF01 | XARELTO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Bayer Pharma AG | 75 | S72.0-S72.2, S72.7- S72.7, M16-M17 | | | | | kuni 30 päevaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1552621 | rivaroksabaan, 15mg | B01AF01 | XARELTO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Bayer Pharma AG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I48-I48 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1552632 | rivaroksabaan, 15mg | B01AF01 | XARELTO, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK | Bayer Pharma AG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I48-I48 | | | | | |
| 1552687 | rivaroksabaan, 20mg | B01AF01 | XARELTO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Bayer Pharma AG | 75 | I48-I48 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|---|-----------|--------|-----------|---|--|
| 1225741 | ropinirool, 2mg | N04BC04 | REQUIP-MODUTAB, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | SmithKline Beecham Limited | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1436598 | ropinirool, 2mg | N04BC04 | ROLPRYNA SR 2MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1225796 | ropinirool, 4mg | N04BC04 | REQUIP-MODUTAB, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | SmithKline Beecham Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1436633 | ropinirool, 4mg | N04BC04 | ROLPRYNA SR 4MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1225819 | ropinirool, 8mg | N04BC04 | REQUIP-MODUTAB, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | SmithKline Beecham Limited | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1436677 | ropinirool, 8mg | N04BC04 | ROLPRYNA SR 8MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1106053 | rosuvastatiin, 10mg | C10AA07 | CRESTOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | AstraZeneca UK Limited | 75 | I11-I12 | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|--|
| 1384758 | rosuvastatiin, 10mg | C10AA07 | ROXARDIO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75 | I11-I12 | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1384859 | rosuvastatiin, 10mg | C10AA07 | ROSUVASTATIN TEVA 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------|------------------|---|--------|--------|--|---|---|
| 1385861 | rosuvastatiin, 10mg | C10AA07 | ZARANTA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Gedeon Richter Plc. | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | | |
| 1396874 | rosuvastatiin, 10mg | C10AA07 | ROSUCARD 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva k.s. | 75 | I11-I12 | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1477975 | rosuvastatiin, 10mg | C10AA07 | ROSWERA 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | I11-I12 | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| 1477997 | rosuvastatiin, 10mg | C10AA07 | ROSWERA 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo mesto | 100 | N18-N18 | | | | | alates III staadiumist |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|--|
| 1505157 | rosuvastatiin, 10mg | C10AA07 | ROSUVASTATIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Actavis Group PTC ehf | 75 | I11-I12 | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| 1505179 | rosuvastatiin, 10mg | C10AA07 | ROSUVASTATIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Actavis Group PTC ehf | 75 | I11-I12 | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused | |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|------------------------|--|
| 1587360 | rosuvastatiin, 10mg | C10AA07 | ROVASYN, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Medochemie Ltd. | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | | |
| 1384950 | rosuvastatiin, 20mg | C10AA07 | ROSUVASTATIN TEVA 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused | |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|------------------------|
| 1385906 | rosuvastatiin, 20mg | C10AA07 | ZARANTA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | | |
| 1397099 | rosuvastatiin, 20mg | C10AA07 | ROSUCARD 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva k.s. | 100 | N18-N18 | | | | | | alates III staadiumist |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |
| | | | | | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1473476 | rosuvastatiin, 20mg | C10AA07 | ROXARDIO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |
| 1478190 | rosuvastatiin, 20mg | C10AA07 | ROSWERA 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 100 | N18-N18 | | | | | alates III staadiumist |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1478213 | rosuvastatiin, 20mg | C10AA07 | ROSWERA 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo mesto | 100 | N18-N18 | | | | | alates III staadiumist |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| 1505236 | rosuvastatiin, 20mg | C10AA07 | ROSUVASTATIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Actavis Group PTC ehf | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused | |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|------------------------|---|
| 1505258 | rosuvastatiin, 20mg | C10AA07 | ROSUVASTATIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Actavis Group PTC ehf | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | | |
| 1587517 | rosuvastatiin, 20mg | C10AA07 | ROVASYN, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Medochemie Ltd. | 75 | I11-I12 | | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
| | | | | | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|---|------------|--------|-----------|------------------------|---|
| 1477863 | rosuvastatiin, 5mg | C10AA07 | ROSWERA 5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1632901 | ruksolitiniib, 15mg | L01XE18 | JAKAVI, tablett, 56TK | Novartis Europharm Limited | 100 | D47.1-D47.1 | Hematoloog | | | | konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi) otsuse alusel primaarse või sekundaarse müelofibroosi raviks keskmise-2 või kõrge riskiga (IPSS \geq 2) patsientidele, kellel eelnev ravi hüdroksüüureaga (annuses vähemalt 2 g päevas vähemalt 3 kuu jooksul) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------|------------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1632934 | ruksolitiniib, 20mg | L01XE18 | JAKAVI, tablett, 56TK | Novartis Europharm Limited | 100 | D47.1-D47.1 | Hematoloog | | | | konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi) otsuse alusel primaarse või sekundaarse müelofibroosi raviks keskmise-2 või kõrge riskiga (IPSS \geq 2) patsientidele, kellel eelnev ravi hüdroksüüureaga (annuses vähemalt 2 g päevas vähemalt 3 kuu jooksul) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks |
| 1632877 | ruksolitiniib, 5mg | L01XE18 | JAKAVI, tablett, 56TK | Novartis Europharm Limited | 100 | D47.1-D47.1 | Hematoloog | | | | konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi) otsuse alusel primaarse või sekundaarse müelofibroosi raviks keskmise-2 või kõrge riskiga (IPSS \geq 2) patsientidele, kellel eelnev ravi hüdroksüüureaga (annuses vähemalt 2 g päevas vähemalt 3 kuu jooksul) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1518836 | saksagliptiin, 2,5mg | A10BH03 | ONGLYZA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi (E11, E14) kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| 1456196 | saksagliptiin, 5mg | A10BH03 | ONGLYZA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | AstraZeneca AB | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi (E11, E14) kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1005512 | salbutamool, 100mcg 1annust | R03AC02 | VENTOLIN, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 200annust 1TK | Glaxo Group Ltd. | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1031308 | salbutamool, 200mcg 1annust | R03AC02 | VENTOLIN DISKUS, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 75 | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|---|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1004319 | salbutamool, 400mcg 1ml | R03CC02 | VENTOLIN SYRUP, siirup, 150ml 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1004948 | salbutamool, 5000mcg 1ml | R03AC02 | VENTOLIN, nebuliseeritav lahus, 20ml 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 75 | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1000405 | salmeterool, 25mcg 1annust | R03AC12 | SEREVENT, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annust 1TK | GlaxoSmithKline Export Ltd | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J43-J44 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |
| 1007907 | salmeterool, 50mcg 1annust | R03AC12 | SEREVENT DISKUS 50 MCG, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J43-J44 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1107346 | salmeterool+flutikasoo n, 25mcg+125mcg 1annust | R03AK06 | SERETIDE INHALER, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annust 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1107357 | salmeterool+flutikasoo n, 25mcg+250mcg 1annust | R03AK06 | SERETIDE INHALER, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annust 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1107335 | salmeterool+flutikasoo n, 25mcg+50mcg 1annust | R03AK06 | SERETIDE INHALER, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annust 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1037607 | salmeterool+flutikasoo n, 50mcg+100mcg 1annust | R03AK06 | SERETIDE DISKUS 100, annustatud inhalatsioonipulber, 60annust 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |
| 1636466 | salmeterool+flutikasoo n, 50mcg+250mcg | R03AK06 | AIRFLUSAL FORSPIRO, annustatud inhalatsioonipulber, 60annust 1TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|---|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1037595 | salmeterool+flutikasoon, 50mcg+250mcg 1annust | R03AK06 | SERETIDE DISKUS 250, annustatud inhalatsioonipulber, 60annust 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |
| 1636512 | salmeterool+flutikasoon, 50mcg+500mcg | R03AK06 | AIRFLUSAL FORSPIRO, annustatud inhalatsioonipulber, 60annust 1TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75 | J43-J44 | Pulmonoloog | esmane | | | III-IV staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel on viimase 3 aasta jooksul esinenud vähemalt 3 süsteemse glükokortikoidiga ravitud haiguse ägenemist |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1153167 | salmeterool+flutikasoon, 50mcg+500mcg 1annust | R03AK06 | SERETIDE DISKUS 500, annustatud inhalatsioonipulber, 60annust 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 75 | J43-J44 | Pulmonoloog | esmane | | | III-IV staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel on viimase 3 aasta jooksul esinenud vähemalt 3 süsteemse glükokortikoidiga ravitud haiguse ägenemist |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1391789 | sapropteriin, 100mg | A16AX07 | KUVAN, lahustuv tablett, 120TK | BioMarin International Limited | 100 | E70.0-E70.1 | | | | 12,00 | konsiiliumi (vähemalt kahe pediaatri või meditsiinigeneetiku ühise) otsuse alusel järgmistel tingimustel: tegemist on biopteriinitundliku haigusvormiga ning dieedi järgimine ei ole taganud ravijuhendi kohase vere fenüülalaniini taseme eesmärkväärtuse saavutamist; ravi võib jätkata kuni 12. eluaastani patsiendil, kellel ravimi kasutamisega püsib fenüülalaniini tase eesmärkväärtuste piires |
| 1027066 | sertindool, 12mg | N05AE03 | SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | H. LUNDBECK A/S | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1027077 | sertindool, 16mg | N05AE03 | SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | H. LUNDBECK A/S | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1027088 | sertindool, 20mg | N05AE03 | SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | H. LUNDBECK A/S | 50 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | |
| | | | | | 100 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1027055 | sertindool, 4mg | N05AE03 | SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | H. LUNDBECK A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1013746 | sertraliin, 100mg | N06AB06 | ASENTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 100 | F33.2-F33.3, F32.2- F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1160615 | sertraliin, 100mg | N06AB06 | SERTRALINE LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F33.2-F33.3, F32.2- F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1189762 | sertraliin, 100mg | N06AB06 | SERTRALIN ACTAVIS 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Nordic A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F33.2-F33.3, F32.2- F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1008638 | sertraliin, 50mg | N06AB06 | ZOLOFT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Pfizer Europe MA EEIG | 100 | F33.2-F33.3, F32.2- F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1143100 | sertraliin, 50mg | N06AB06 | ASENTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F33.2-F33.3, F32.2- F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1160569 | sertraliin, 50mg | N06AB06 | SERTRALINE LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F33.2-F33.3, F32.2- F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1189841 | sertraliin, 50mg | N06AB06 | SERTRALIN ACTAVIS 50 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Nordic A/S | 100 | F33.2-F33.3, F32.2- F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1239218 | sertraliin, 50mg | N06AB06 | SERTRALINE-TEVA 50 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F33.2-F33.3, F32.2- F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|--|---|
| 1422425 | sevelameer, 800mg | V03AE02 | RENVELA, õhukese polümeerikattega tablett, 180TK | Genzyme Europe B.V. | 100 | N18-N18 | Pediaater, Nefroloog | | | | juhul, kui kaltsiumipõhine fosforisiduja on vastunäidustatud (seerumi kaltsiumisisaldus >2,54 mmol/l) |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1221039 | sildenafil, 20mg | G04BE03 | REVATIO, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Pfizer Limited | 50 | I27.0-I27.0 | Kardioloog, Pediaater, Pulmonoloog, Reumatoloog | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | Pediaater, Kardioloog, Pulmonoloog, Reumatoloog | | | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel | |
| 1647637 | simepreviir, 150mg | J05AE14 | OLYSIO, kõvakapsel, 28TK | JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV | 100 | B18.2-B18.2 | Infektsionist, Gastroenteroloog | | | | 1. ja 4. genotüübi kroonilise progresseeruva C- viirushepatiidi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel esineb mõõdukas või raske maksafibroos (F2-4) ja kompenseeritud maksahaigus |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|--|---|
| 1010271 | simvastatiin, 10mg | C10AA01 | VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | |
| 1080166 | simvastatiin, 10mg | C10AA01 | SIMVACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | HEXAL AG | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused | |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|------------------------|------------------------|
| 1083934 | simvastatiin, 10mg | C10AA01 | SIMVASTATIN- RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | | |
| | | | | | 50 | | | | | | | |
| 1334449 | simvastatiin, 10mg | C10AA01 | SIMVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Accord Healthcare Limited | 100 | N18-N18 | | | | | | alates III staadiumist |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | | |
| | | | | | 50 | | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|--|
| 1594447 | simvastatiin, 10mg | C10AA01 | VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | I11-I12 | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1010260 | simvastatiin, 20mg | C10AA01 | VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 100 | N18-N18 | | | | | alates III staadiumist |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1080177 | simvastatiin, 20mg | C10AA01 | SIMVACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | | alates III staadiumist |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| 1080740 | simvastatiin, 20mg | C10AA01 | ZOCOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | | alates III staadiumist |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|------------------------|
| 1083956 | simvastatiin, 20mg | C10AA01 | SIMVASTATIN- RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | | alates III staadiumist |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| 1334539 | simvastatiin, 20mg | C10AA01 | SIMVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Accord Healthcare Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused | |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|--|
| 1594458 | simvastatiin, 20mg | C10AA01 | VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
| | | | | | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | | alates III staadiumist | |
| 1621493 | simvastatiin, 20mg | C10AA01 | SIMVACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | HEXAL AG | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |
| | | | | | 50 | | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müüjiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused | |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|---|
| 1060715 | simvastatiin, 40mg | C10AA01 | ZOCOR FORTE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 50 | | | | | | | |
| 1083978 | simvastatiin, 40mg | C10AA01 | SIMVASTATIN-RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 75 | E78-E78 | | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 50 | | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1086218 | simvastatiin, 40mg | C10AA01 | VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | | alates III staadiumist |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| 1129700 | simvastatiin, 40mg | C10AA01 | SIMVACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | HEXAL AG | 75 | I11-I12 | | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|--|---|
| 1334629 | simvastatiin, 40mg | C10AA01 | SIMVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Accord Healthcare Limited | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |
| 1594469 | simvastatiin, 40mg | C10AA01 | VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 75 | I11-I12 | | | | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | alates III staadiumist | |
| 1107739 | sirolimus, 1mg | L04AA10 | RAPAMUNE, kaetud tablett, 30TK | Pfizer Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1286568 | sitagliptiin, 100mg | A10BH01 | JANUVIA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Merck Sharp & Dohme Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi (E11, E14) kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| 1286445 | sitagliptiin, 25mg | A10BH01 | JANUVIA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Merck Sharp & Dohme Limited | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi (E11, E14) kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|--|---------------|--------|-----------|------------|---|
| 1286502 | sitagliptiin, 50mg | A10BH01 | JANUVIA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Merck Sharp & Dohme Limited | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | II tüüpi diabeedi (E11, E14) kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1041185 | somatropiin, 12mg | H01AC01 | GENOTROPIN, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Pfizer Enterprises SARL | 100 | E89.3-E89.3, E23- E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18- N18 | Endokrinoloog | | | | kuni kasvatsoonide sulgumiseni |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1369009 | somatropiin, 3,3mg 1ml | H01AC01 | OMNITROPE, süstelahus, 1.5ml 5TK | Sandoz GmbH | 100 | E89.3-E89.3, E23- E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18- N18 | Endokrinoloog | | | | kuni kasvatsoonide sulgumiseni |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1022072 | somatropiin, 5,3mg | H01AC01 | GENOTROPIN, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Pfizer Enterprises SARL | 100 | E89.3-E89.3, E23- E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18- N18 | Endokrinoloog | | | | kuni kasvatsoonide sulgumiseni |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------|------------------|--|---------------|--------|-----------|------------|-----------------------------------|
| 1415528 | somatropiin, 5,83mg 1ml | H01AC01 | SAIZEN 5,83 MG/ML, süstelahus, 1.03ml 1TK | Merck Serono S.p.A. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E89.3-E89.3, E23- E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18- N18 | Endokrinoloog | | | | kuni kasvatsoonide sulgumiseni |
| 1369032 | somatropiin, 6,7mg 1ml | H01AC01 | OMNITROPE, süstelahus, 1.5ml 1TK | Sandoz GmbH | 100 | E89.3-E89.3, E23- E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18- N18 | Endokrinoloog | | | | kuni kasvatsoonide sulgumiseni |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1415540 | somatropiin, 8mg 1ml | H01AC01 | SAIZEN 8 MG/ML, süstelahus, 1.5ml 1TK | Merck Serono S.p.A. | 100 | E89.3-E89.3, E23- E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18- N18 | Endokrinoloog | | | | kuni kasvatsoonide sulgumiseni |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1415551 | somatropiin, 8mg 1ml | H01AC01 | SAIZEN 8 MG/ML, süstelahus, 2.5ml 1TK | Merck Serono S.p.A. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E89.3-E89.3, E23- E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18- N18 | Endokrinoloog | | | | kuni kasvatsoonide sulgumiseni |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1249938 | sorafeniib, 200mg | L01XE05 | NEXAVAR, õhukese polümeerikattega tablett, 112TK | Bayer Pharma AG | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| | | | | | 100 | C64-C64 | Onkoloog | | | | IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sorafeniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|----------|--------------------------|--------|-----------|------------|--|
| | | | | | 100 | C22-C22 | Onkoloog | | | | kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise sorafeniibiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 onkologi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) ning maksafunktsioon ei ole oluliselt häiritud. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi sorafeniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2010. a. |
| 1034480 | sotalool, 80mg | C07AA07 | SOTAHEXAL 80 MG, tablett, 20TK | HEXAL AG | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1071863 | sotalool, 80mg | C07AA07 | SOTAHEXAL 80 MG, tablett, 50TK | HEXAL AG | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1678170 | sotalool, 80mg | C07AA07 | SOTAHEXAL 80 MG, tablett, 50TK | First Pharma OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| 1023310 | spiramütsiin, 3000000RÜ | J01FA02 | ROVAMYCINE, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1001091 | spironolaktoon, 100mg | C03DA01 | SPIRIX, tablett, 20TK | Takeda Pharma AS | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| 1120790 | spironolaktoon, 100mg | C03DA01 | SPIROGAMMA 100, tablett, 20TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 75 | I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| 1120813 | spironolaktoon, 100mg | C03DA01 | SPIROGAMMA 100, tablett, 100TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13 | | | | | |
| 1120824 | spironolaktoon, 100mg | C03DA01 | SPIROGAMMA 100, tablett, 50TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 75 | I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | |
| 1000944 | spironolaktoon, 25mg | C03DA01 | SPIRIX, tablett, 20TK | Takeda Pharma AS | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13 | | | | | |
| 1014848 | spironolaktoon, 25mg | C03DA01 | VEROSPIRON, tablett, 20TK | Gedeon Richter Plc. | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1001013 | spironolaktoon, 50mg | C03DA01 | SPIRIX, tablett, 20TK | Takeda Pharma AS | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13 | | | | | |
| 1042018 | spironolaktoon, 50mg | C03DA01 | VEROSPIRON, kõvakapsel, 30TK | Gedeon Richter Plc. | 75 | I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| 1071650 | spironolaktoon, 50mg | C03DA01 | SPIRIX, tablett, 100TK | Takeda Pharma AS | 75 | I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15 | | | | | |
| 1120712 | spironolaktoon, 50mg | C03DA01 | SPIROGAMMA 50, tablett, 20TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 75 | I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1120723 | spironolaktoon, 50mg | C03DA01 | SPIROGAMMA 50, tablett, 50TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15 | | | | | |
| 1120734 | spironolaktoon, 50mg | C03DA01 | SPIROGAMMA 50, tablett, 100TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 75 | I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|-----------------------------------|------------------|---|-----------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1186949 | strontsiumranelaat, 2g | M05BX03 | PROTELOS, suukaudse suspensiooni graanulid, 28TK | Les Laboratories Servier | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna ja kellel esineb kaasvalt söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (K22.0; K22.2; K22.4; K20) |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1008818 | sulfametoksasool+trimetoprim, 40mg+8mg 1ml | J01EE01 | BACTRIM, siirup, 100ml 1TK | Roche Eesti OÜ | 100 | Z21-Z21, Z20.6-Z20.6, B20-B24 | Infektsionist | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1016086 | sulfametoksasool+trimetoprim, 800mg+160mg | J01EE01 | BERLOCID, tablett, 20TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | Z21-Z21, Z20.6-Z20.6, B20-B24 | Infektsionist | | | | |
| 1023455 | sulfasalasiin, 500mg | A07EC01 | SALAZOPYRIN EN, gastroresistentne tablett, 100TK | Pfizer Enterprises SARL | 75 | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 75 | M08-M08, M45-M45, M06-M06, M05-M05, M46-M46 | Reumatoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1040612 | sulpiriid, 100mg | N05AL01 | BETAMAKS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | AS Grindeks | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1040601 | sulpiriid, 200mg | N05AL01 | BETAMAKS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | AS Grindeks | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1040623 | sulpiriid, 50mg | N05AL01 | BETAMAKS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | AS Grindeks | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | |
| 1018482 | sultamitsilliin, 375mg | J01CR04 | UNASYN, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1018493 | sultamitsilliin, 50mg 1ml | J01CR04 | UNASYN, suukaudse suspensiooni pulber, 30ml 1TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| 1139914 | sumatriptaan, 100mg | N02CC01 | IMIGRAN FDT, õhukese polümeerikattega tablett, 2TK | GlaxoSmithKline Export Ltd | 50 | | | | | | |
| 1139947 | sumatriptaan, 100mg | N02CC01 | IMIGRAN FDT, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK | GlaxoSmithKline Export Ltd | 50 | | | | | | |
| 1234213 | sumatriptaan, 100mg | N02CC01 | CINIE 100 MG, tablett, 6TK | Zentiva k.s. | 50 | | | | | | |
| 1278053 | sumatriptaan, 100mg | N02CC01 | SUMATRIPTAN ACTAVIS, tablett, 6TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| 1678125 | sumatriptaan, 100mg | N02CC01 | CINIE 100 MG, tablett, 6TK | First Pharma OÜ | 50 | | | | | | |
| 1139880 | sumatriptaan, 50mg | N02CC01 | IMIGRAN FDT, õhukese polümeerikattega tablett, 2TK | GlaxoSmithKline Export Ltd | 50 | | | | | | |
| 1139903 | sumatriptaan, 50mg | N02CC01 | IMIGRAN FDT, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK | GlaxoSmithKline Export Ltd | 50 | | | | | | |
| 1234156 | sumatriptaan, 50mg | N02CC01 | CINIE 50 MG, tablett, 6TK | Zentiva k.s. | 50 | | | | | | |
| 1277995 | sumatriptaan, 50mg | N02CC01 | SUMATRIPTAN ACTAVIS, tablett, 6TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|--|
| 1353305 | sunitiniib, 12,5mg | L01XE04 | SUTENT, kõvakapsel, 28TK | Pfizer Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C64-C64 | Onkoloog | | | | <p>IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi esimese rea ravina või teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sunitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena</p> |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1353293 | sunitiniib, 25mg | L01XE04 | SUTENT, kõvakapsel, 28TK | Pfizer Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C64-C64 | Onkoloog | | | | IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi esimese rea ravina või teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sunitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---------------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|----------|---------------|--------|-----------|------------|--|
| 1353282 | sunitiniib, 50mg | L01XE04 | SUTENT, kõvakapsel, 28TK | Pfizer Limited | 100 | C64-C64 | Onkoloog | | | | IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi esimese rea ravina või teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sunitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1113422 | zidovudiin, 10mg 1ml | J05AF01 | RETROVIR, suukaudne lahus, 200ml 1TK | ViiV Healthcare UK Limited | 50 | | Infektsionist | | | | HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega |
| 1036460 | zidovudiin+lamivudiin, 300mg+150mg | J05AR01 | COMBIVIR, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | ViiV Healthcare UK Limited | 50 | | Infektsionist | | | | HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1556355 | ziprasidoon, 40mg | N05AE04 | YPSILA 40 MG, kõvakapsel, 60TK | Krka, d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1556265 | ziprasidoon, 60mg | N05AE04 | YPSILA 60 MG, kõvakapsel, 60TK | Krka, d.d., Novo mesto | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1556153 | ziprasidoon, 80mg | N05AE04 | YPSILA 80 MG, kõvakapsel, 60TK | Krka, d.d., Novo mesto | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1110722 | zolmitriptaan, 2,5mg | N02CC03 | ZOMIG RAPIMELT, suus dispergeeruv tablett, 2TK | AstraZeneca UK Limited | 50 | | | | | | |
| 1110733 | zolmitriptaan, 2,5mg | N02CC03 | ZOMIG RAPIMELT, suus dispergeeruv tablett, 6TK | AstraZeneca UK Limited | 50 | | | | | | |
| 1005815 | zuklopentiksool, 10mg | N05AF05 | CISORDINOL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | H. LUNDBECK A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1006232 | zuklopentiksool, 200mg 1ml | N05AF05 | CISORDINOL DEPOT, süstelahus, 1ml 1TK | H. LUNDBECK A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1065226 | zuklopentiksool, 200mg 1ml | N05AF05 | CISORDINOL DEPOT, süstelahus, 1ml 10TK | H. LUNDBECK A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1006322 | zuklopentiksool, 50mg 1ml | N05AF05 | CISORDINOL-ACUTARD, süstelahus, 1ml 10TK | H. LUNDBECK A/S | 100 | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1379303 | tafluprost, 0,015mg 1ml | S01EE05 | TAFLOTAN, silmatilgad, lahus, 0.3ml 30TK | SANTEN OY | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | kui ravi jätkamine teiste glaukoomiravimitega on meditsiiniliselt vastunäidustatud bensalkooniumkloriidil e tekkinud tõendatud ülitundlikkuse või olulise toksilise toime tõttu silma eesmisele osale |
| 1179840 | takroliimus, 0,03% | D11AH01 | PROTOPIC, salv, 30g 1TK | LEO Pharma A/S | 50 | | | | | | |
| 1179851 | takroliimus, 0,1% | D11AH01 | PROTOPIC, salv, 30g 1TK | LEO Pharma A/S | 50 | | | | | | |
| 1294646 | takroliimus, 0,5mg | L04AD02 | ADVAGRAF, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK | Astellas Pharma Europe B.V. | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA>20%), korduvsiirdamise puhul, maksasiirdamise puhul, kopsusiirdamise puhul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1294680 | takroliimus, 1mg | L04AD02 | ADVAGRAF, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK | Astellas Pharma Europe B.V. | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA>20%), korduvsiirdamise puhul, maksasiirdamise puhul, kopsusiirdamise puhul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt |
| 1488337 | takroliimus, 3mg | L04AD02 | ADVAGRAF, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK | Astellas Pharma Europe B.V. | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA>20%), korduvsiirdamise puhul, maksasiirdamise puhul, kopsusiirdamise puhul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|------------------|--------------------------|--------|-----------|-----------------------------|--|
| 1294668 | takroliimus, 5mg | L04AD02 | ADVAGRAF, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK | Astellas Pharma Europe B.V. | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA>20%), korduvsiirdamise puhul, maksasiirdamise puhul, kopsusiirdamise puhul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt |
| 1347230 | talidomiid, 50mg | L04AX02 | THALIDOMIDE CELGENE, kõvakapsel, 28TK | Celgene Europe Ltd | 100 | C90.0-C90.0 | Hematoloog | | | | ravimi väljakirjutamise õigus hulgimüülooma suukaudseks mono- või kombinatsioonraviks |
| 1002665 | tamoksifeen, 20mg | L02BA01 | NOLVADEX D, tablett, 30TK | AstraZeneca UK Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | D18.1-D18.1 | Onkoloog, Pulmonoloog | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | Onkoloog | | | | |
| | | | | | 100 | C50-C50 | Günekoloog, Üldkirurg | | | rinnavähi adjuvantraviks | |
| 1015704 | tamoksifeen, 20mg | L02BA01 | TAMOXIFEN "EBEWE", tablett, 30TK | Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg.KG | 100 | D18.1-D18.1 | Onkoloog, Pulmonoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C50-C50 | Günekoloog, Üldkirurg | | | rinnavähi adjuvantraviks | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | Onkoloog | | | | |
| 1188143 | tamsulosiin, 0,4mg | G04CA02 | FLOSIN 0,4MG, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|--|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1188480 | tamsulosiin, 0,4mg | G04CA02 | TAMSULOSIN LANNACHER, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | G.L. Pharma GmbH | 50 | | | | | | |
| 1195826 | tamsulosiin, 0,4mg | G04CA02 | OMSAL, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| 1206773 | tamsulosiin, 0,4mg | G04CA02 | FOKUSIN, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | Takeda GmbH | 50 | | | | | | |
| 1436015 | tamsulosiin, 0,4mg | G04CA02 | TANYZ ERAS 0.4MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| 1390463 | tamsulosiin+dutasteriid , 0,4mg+0,5mg | G04CA52 | COMBODART, kõvakapsel, 30TK | GlaxoSmithKline Eesti OÜ | 50 | | | | | | |
| 1046292 | telmisartaan, 40mg | C09CA07 | MICARDIS, tablett, 28TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1395424 | telmisartaan, 40mg | C09CA07 | TELMISARTAN- RATIOPHARM 40MG, tablett, 28TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1430233 | telmisartaan, 40mg | C09CA07 | TELMISARTAN SANDOZ 40 MG, tablett, 28TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1482263 | telmisartaan, 40mg | C09CA07 | TOLURA, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1482274 | telmisartaan, 40mg | C09CA07 | TOLURA, tablett, 56TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1046258 | telmisartaan, 80mg | C09CA07 | MICARDIS, tablett, 28TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1395569 | telmisartaan, 80mg | C09CA07 | TELMISARTAN- RATIOPHARM 80MG, tablett, 28TK | ratiopharm GmbH | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1430389 | telmisartaan, 80mg | C09CA07 | TELMISARTAN SANDOZ 80 MG, tablett, 28TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|--|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1482331 | telmisartaan, 80mg | C09CA07 | TOLURA, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1482342 | telmisartaan, 80mg | C09CA07 | TOLURA, tablett, 56TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1499452 | telmisartaan+amlodipiin, 80mg+10mg | C09DB04 | TWYNSTA, tablett, 28TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1499384 | telmisartaan+amlodipiin, 80mg+5mg | C09DB04 | TWYNSTA, tablett, 28TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1609613 | telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 40mg+12,5mg | C09DA07 | TOLUCOMBI, tablett, 56TK | Krka, d.d., Novo mesto | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1114793 | telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+12,5mg | C09DA07 | MICARDISPLUS, tablett, 28TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1566615 | telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+12,5mg | C09DA07 | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BILLEV, tablett, 30TK | Billev Pharma ApS | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1566996 | telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+12,5mg | C09DA07 | TEZEO HCT 80 MG/12,5 MG, tablett, 28TK | Zentiva k.s. | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1567267 | telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+12,5mg | C09DA07 | TELMISARTAN /HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ, kaetud tablett, 28TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1609691 | telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+12,5mg | C09DA07 | TOLUCOMBI, tablett, 56TK | Krka, d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1612910 | telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+12,5mg | C09DA07 | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA PHARMA, tablett, 28TK | Teva B.V. | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1367524 | telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+25mg | C09DA07 | MICARDISPLUS, tablett, 28TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|--------------------------------|------------------|------------------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1566705 | telmisartaan+hüdroklor otiasiid, 80mg+25mg | C09DA07 | TELMISARTAN/HYDROCHL OROTHIAZIDE BILLEV, tablett, 30TK | Billev Pharma ApS | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1567379 | telmisartaan+hüdroklor otiasiid, 80mg+25mg | C09DA07 | TELMISARTAN /HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ, kaetud tablett, 28TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1609770 | telmisartaan+hüdroklor otiasiid, 80mg+25mg | C09DA07 | TOLUCOMBI, tablett, 56TK | Krka, d.d., Novo mesto | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1613045 | telmisartaan+hüdroklor otiasiid, 80mg+25mg | C09DA07 | TELMISARTAN/HYDROCHL OROTHIAZIDE TEVA PHARMA, tablett, 28TK | Teva B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1114995 | temosolomiid, 100mg | L01AX03 | TEMODAL, kõvakapsel, 5TK | Merck Sharp & Dohme Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C71-C71 | Onkoloog | | | | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1) |
| 1458963 | temosolomiid, 100mg | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE TEVA, kõvakapsel, 5TK | Teva B.V. | 100 | C71-C71 | Onkoloog | | | | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1) |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1462115 | temosolomiid, 100mg | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 5TK | Accord Healthcare Limited | 100 | C71-C71 | Onkoloog | | | | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1) |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1534676 | temosolomiid, 100mg | L01AX03 | BLASTOMAT 100 MG, kõvakapsel, 5TK | Alvogen IPCo S.ar.l. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C71-C71 | Onkoloog | | | | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1) |
| 1303232 | temosolomiid, 140mg | L01AX03 | TEMODAL, kõvakapsel, 5TK | Merck Sharp & Dohme Limited | 100 | C71-C71 | Onkoloog | | | | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1) |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1462137 | temosolomiid, 140mg | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 5TK | Accord Healthcare Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C71-C71 | Onkoloog | | | | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1) |
| 1534698 | temosolomiid, 140mg | L01AX03 | BLASTOMAT 140 MG, kõvakapsel, 5TK | Alvogen IPCo S.ar.l. | 100 | C71-C71 | Onkoloog | | | | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1) |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1114973 | temosolomiid, 20mg | L01AX03 | TEMODAL, kõvakapsel, 5TK | Merck Sharp & Dohme Limited | 100 | C71-C71 | Onkoloog | | | | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1) |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1458941 | temosolomiid, 20mg | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE TEVA, kõvakapsel, 5TK | Teva B.V. | 100 | C71-C71 | Onkoloog | | | | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1) |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1462092 | temosolomiid, 20mg | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 5TK | Accord Healthcare Limited | 100 | C71-C71 | Onkoloog | | | | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1) |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1534654 | temosolomiid, 20mg | L01AX03 | BLASTOMAT 20 MG, kõvakapsel, 5TK | Alvogen IPCo S.ar.l. | 50 | C71-C71 | Onkoloog | | | | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1) |
| | | | | | 100 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1115019 | temosolomiid, 250mg | L01AX03 | TEMODAL, kõvakapsel, 5TK | Merck Sharp & Dohme Limited | 100 | C71-C71 | Onkoloog | | | | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1) |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1459021 | temosolomiid, 250mg | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE TEVA, kõvakapsel, 5TK | Teva B.V. | 50 | C71-C71 | Onkoloog | | | | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1) |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1462171 | temosolomiid, 250mg | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 5TK | Accord Healthcare Limited | 100 | C71-C71 | Onkoloog | | | | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1) |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1114951 | temosolomiid, 5mg | L01AX03 | TEMODAL, kõvakapsel, 5TK | Merck Sharp & Dohme Limited | 50 | C71-C71 | Onkoloog | | | | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1) |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1124031 | teofülliin, 200mg | R03DA04 | RETAFYLLIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | Orion Corporation | 50 | J43-J44 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1124042 | teofülliin, 300mg | R03DA04 | RETAFYLLIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | Orion Corporation | 75 | J43-J44 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1158757 | terbinafiin, 250mg | D01BA02 | TERBINAFINE SANDOZ 250 MG, tablett, 30TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50 | | | | | | |
| 1176308 | terbinafiin, 250mg | D01BA02 | TERBINAFIN ACTAVIS, tablett, 14TK | Actavis Nordic A/S | 50 | | | | | | |
| 1176319 | terbinafiin, 250mg | D01BA02 | TERBINAFIN ACTAVIS, tablett, 28TK | Actavis Nordic A/S | 50 | | | | | | |
| 1176353 | terbinafiin, 250mg | D01BA02 | TERBINAFIN ACTAVIS, tablett, 56TK | Actavis Nordic A/S | 50 | | | | | | |
| 1213614 | terbinafiin, 250mg | D01BA02 | TERBINAFIN NYCOMED, tablett, 28TK | Takeda Pharma AS | 50 | | | | | | |
| 1245394 | terbinafiin, 250mg | D01BA02 | TERBINAFINE OLAINFARM 250MG, tablett, 14TK | JSC Olainfarm | 50 | | | | | | |
| 1245406 | terbinafiin, 250mg | D01BA02 | TERBINAFINE OLAINFARM 250MG, tablett, 28TK | JSC Olainfarm | 50 | | | | | | |
| 1681501 | terbinafiin, 250mg | D01BA02 | TERBINAFIN ACTAVIS, tablett, 28TK | First Pharma OÜ | 50 | | | | | | |
| 1624092 | teriflunomiid, 14mg | L04AA31 | AUBAGIO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | sanofi-aventis groupe | 100 | G35-G35 | Neuroloog | esmane | | | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks patsientidele, kellele beetainterferoon on meditsiiniliselt vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks või talumatuks. |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|----------------------------------|------------------|---|------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1022623 | testosteroon, 250mg 1ml | G03BA03 | SUSTANON, süstelahus, 1ml 1TK | Aspen Pharma Trading Limited | 100 | E29.1-E29.1, E89.5- E89.5, E23-E23, Q98-Q98 | Endokrinoloog, Günekoloog | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | Onkoloog, Hematoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1169445 | testosteroon, 250mg 1ml | G03BA03 | NEBIDO, süstelahus, 4ml 1TK | Bayer Pharma AG | 50 | | | | | | |
| 1343898 | tetrabensiin, 25mg | N07XX06 | TETMODIS, tablett, 112TK | AOP Orphan Pharmaceuticals AG | 100 | G10-G10 | Neuroloog | esmane | | | hüperkineetiliste mootorsete häiretega Huntingtoni tõve raviks |
| 1019360 | tianeptiin, 12,5mg | N06AX14 | COAXIL, kaetud tablett, 30TK | Les Laboratories Servier | 50 | | | | | | |
| 1436835 | tianeptiin, 12,5mg | N06AX14 | SALYMBRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50 | | | | | | |
| 1436846 | tianeptiin, 12,5mg | N06AX14 | SALYMBRA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50 | | | | | | |
| 1034165 | tiboloon, 2,5mg | G03CX01 | LIVIAL, tablett, 28TK | N.V. ORGANON | 50 | | | | | | |
| 1506585 | tikagreloor, 90mg | B01AC24 | BRILIQUE, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | AstraZeneca AB | 75 | Z95-Z95 | Kardioloog | esmane | | | kombinatsioon atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1038956 | timolool, 1mg 1g | S01ED01 | TIMOSAN, silmageel, 5g 1TK | SANTEN OY | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1112645 | timolool, 5mg 1ml | S01ED01 | OFTAN TIMOLOL, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK | SANTEN OY | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|--|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1252976 | timolool+bimatoprost, 5mg+0,3mg 1ml | S01ED82 | GANFORT, silmatilgad, lahus, 3ml 1TK | Allergan Pharmaceuticals Ireland | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1392207 | timolool+brinsolamiid, 5mg+10mg 1ml | S01ED83 | AZARGA, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK | Alcon Laboratories Ltd | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1039799 | timolool+dorsolamiid, 5mg+20mg 1ml | S01ED80 | COSOPT, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1345733 | timolool+dorsolamiid, 5mg+20mg 1ml | S01ED80 | DORZOLAMIDE/TIMOLOL TEVA, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK | Teva Pharma B.V. | 50 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1420243 | timolool+dorsolamiid, 5mg+20mg 1ml | S01ED80 | DORZOLAMIDE/TIMOLOL ELVIM, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK | SIA ELVIM | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|--------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1429118 | timolool+latanoprost, 5mg+0,05mg 1ml | S01ED84 | LATOXAP 0,05MG/5MG/ML, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1088254 | timolool+latanoprost, 5mg+50mcg 1ml | S01ED84 | XALACOM, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1445161 | timolool+latanoprost, 5mg+50mcg 1ml | S01ED84 | LATIRA, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK | ratiopharm GmbH | 50 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1445172 | timolool+latanoprost, 5mg+50mcg 1ml | S01ED84 | LATIRA, silmatilgad, lahus, 2.5ml 3TK | ratiopharm GmbH | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---------------------------------------|----------|---|--|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1618141 | timolool+tafluprost, 5mg+15mcg 1ml | S01ED85 | TAPTIQOM, silmatilgad, lahus üheannuselises konteineris, 0.3ml 30TK | Santen Oy | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | kui ravi jätkamine teiste glaukoomiravimitega on meditsiiniliselt vastunäidustatud bensalkooniumkloriidil e tekkinud tõendatud ülitundlikkuse või olulise toksilise toime tõttu silma eesmisele osale ning monoteraapia säilitusainevaba prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku |
| 1243763 | timolool+travoprost, 5mg+40mcg 1ml | S01ED81 | DUOTRAV, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK | Alcon Laboratories (UK) Ltd. | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | kui monoteraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1004375 | tioguaaniin, 40mg | L01BB03 | LANVIS, tablett, 25TK | Aspen Pharma Trading Limited | 50 | | | | | | |
| 1111341 | tiokthape (alfa- lipoehape), 600mg | A16AX01 | THIOCTACID HR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Meda Pharma GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| 1303276 | tiokthape (alfa- lipoehape), 600mg | A16AX01 | THIOGAMMA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| 1511301 | tiotroopiumbromiid, 2,5mcg 1annust | R03BB04 | SPIRIVA RESPIMAT, inhalatsioonilahus, 60annust 1TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 75 | J43-J44 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1173822 | tisanidiin, 2mg | M03BX02 | SIRDALUD, tablett, 30TK | Novartis Finland OY | 75 | G82-G82, G81-G81 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1211599 | tisanidiin, 4mg | M03BX02 | SIRDALUD, tablett, 30TK | Novartis Finland OY | 75 | G82-G82, G81-G81 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1553880 | tobramütsiin, 28mg | J01GB01 | TOBI PODHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 224TK | Novartis Europharm Limited | 100 | E84-E84 | Pediaater, Pulmonoloog | | | | Pseudomonas aeruginosa põhjustatud kroonilise kopsuinfektsiooni supressiivseks raviks tsüstilise fibroosiga patsientidel |
| 1012543 | tobramütsiin, 3mg 1g | S01AA12 | TOBEX, silmasalv, 3.5g 1TK | s.a. Alcon-Couvreur N.V. | 50 | | | | | | |
| 1150120 | tobramütsiin, 3mg 1ml | S01AA12 | TOBEX 2X, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK | Alcon Cusi S.A. | 50 | | | | | | |
| 7000119 | toitained ilma fenüülalaniinita, | | PHLEXY-10 DRINK MIX , pulber, 20g N30 | SHS International | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E70.0-E70.1 | | | | | |
| 7000131 | toitained ilma fenüülalaniinita, | | XP MAXAMAID (ORANGE FLAVOURED) pulber, pulber, 500g N4 | SHS International | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E70.0-E70.1 | | | | | |
| 7000142 | toitained ilma fenüülalaniinita, | | XP MAXAMAID (UNFLAVOURED) pulber, pulber, 500g N4 | SHS International | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E70.0-E70.1 | | | | | |
| 7000153 | toitained ilma fenüülalaniinita, | | XP MAXAMUM (ORANGE FLAVOURED) pulber, pulber, 500g N4 | SHS International | 100 | E70.0-E70.1 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 7000164 | toitained ilma fenüülalaniinita, | | XP MAXAMUM (UNFLAVOURED) pulber, pulber, 500g N4 | SHS International | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E70.0-E70.1 | | | | | |
| 7000186 | toitained ilma fenüülalaniinita, | | DUOCAL Supersoluble , pulber, 400 g | SHS | 100 | E70.0-E70.1 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 7002504 | toitained ilma fenüülalaniinita, | | PKU-EXPRESS, pulber, 25g N30 | Vitaflo International Ltd. | 100 | E70.0-E70.1 | | | | | |
| 7002515 | toitained ilma fenüülalaniinita, | | PKU-GEL, pulber, 20g N30 | Vitaflo International Ltd. | 100 | E70.0-E70.1 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|----------|---|-------------------------------|------------------|------------------------------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 7002896 | toitained ilma fenüülalaniinita, | | PKU ANAMIX INFANT, pulber, 400g | SHS International Ltd | 100 | E70.1-E70.1, E70.0- E70.0 | | | | | |
| 7015755 | toitained ilma fenüülalaniinita, | | PKU Lophlex LQ Juicy berries 10, suukaudne lahus, 62,5ml N60 | SHS International Ltd | 100 | E70.0-E70.1 | | | | | |
| 7015777 | toitained ilma fenüülalaniinita, | | PKU Lophlex LQ Juicy tropical 10, suukaudne lahus, 62,5ml N60 | SHS International Ltd | 100 | E70.0-E70.1 | | | | | |
| 7015766 | toitained ilma fenüülalaniinita, | | PKU Lophlex LQ Juicy tropical 20, suukaudne lahus, 125ml N30 | SHS International Ltd | 100 | E70.0-E70.1 | | | | | |
| 7004922 | toitained ilma fenüülalaniinita, | | PKU Squeezie, suukaudne pasta, 85 g manustamisvalmis toitainesegu kotikeses, ühes karbis on 30 kotikest (2550 g) | Vitaflo International Ltd. | 100 | E70.0-E70.1 | | | | | |
| 7015744 | toitained ilma fenüülalaniinita, | | PKU Lophlex LQ Juicy berries 20, suukaudne lahus, 125ml N30 | SHS International Ltd | 100 | E70.0-E70.1 | | | | | |
| 7006081 | toitained ilma fenüülalaniinita, | | AVONIL POWDER , suukaudne pulber, 500g N1 | PreKULab Ltd. | 100 | E70.0-E70.1 | | | | | |
| 1371248 | tokofersolaan, 50mg 1ml | A11HA08 | VEDROP, suukaudne lahus, 60ml 1TK | Orphan Europe SARL | 100 | E84-E84, Q44-Q44 | Pediaater | | | 19,00 | raske kroonilise kolestaasi raviks kuni 18-aastastele patsientidele konsiiliumi (vähemalt kahe pediaatri ühise) otsuse alusel |
| 1430086 | tokofersolaan, 50mg 1ml | A11HA08 | VEDROP, suukaudne lahus, 20ml 1TK | Orphan Europe SARL | 100 | E84-E84, Q44-Q44 | Pediaater | | | 19,00 | raske kroonilise kolestaasi raviks kuni 18-aastastele patsientidele konsiiliumi (vähemalt kahe pediaatri ühise) otsuse alusel |
| 1196940 | tolkapoon, 100mg | N04BX01 | TASMAR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Meda AB | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1441112 | tolterodiin, 1mg | G04BD07 | TOLTERODINE ACCORD 1 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Accord Healthcare Limited | 50 | | | | | | |
| 1284498 | tolterodiin, 2mg | G04BD07 | UROFLOW 2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Zentiva k.s. | 50 | | | | | | |
| 1441134 | tolterodiin, 2mg | G04BD07 | TOLTERODINE ACCORD 2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Accord Healthcare Limited | 50 | | | | | | |
| 1503762 | tolterodiin, 4mg | G04BD07 | UROFLOW 4MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK | Zentiva k.s. | 50 | | | | | | |
| 1076778 | topiramaat, 100mg | N03AX11 | TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Johnson & Johnson UAB | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1309878 | topiramaat, 100mg | N03AX11 | TOPIRAMATE ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Orion Corporation | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1456488 | topiramaat, 100mg | N03AX11 | TOPIRAMATE PORTFARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | SIA ELVIM | 50 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 100 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1076846 | topiramaat, 200mg | N03AX11 | TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Johnson & Johnson UAB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| 1076688 | topiramaat, 25mg | N03AX11 | TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Johnson & Johnson UAB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| 1309812 | topiramaat, 25mg | N03AX11 | TOPIRAMATE ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Orion Corporation | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1456444 | topiramaat, 25mg | N03AX11 | TOPIRAMATE PORTFARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | SIA ELVIM | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1076734 | topiramaat, 50mg | N03AX11 | TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Johnson & Johnson UAB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1309834 | topiramaat, 50mg | N03AX11 | TOPIRAMATE ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Orion Corporation | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1456466 | topiramaat, 50mg | N03AX11 | TOPIRAMATE PORTFARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | SIA ELVIM | 50 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1158050 | torasemiid, 100mg | C03CA04 | TORASEMIDE HEXAL 100 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |
| 1032332 | torasemiid, 10mg | C03CA04 | TRIFAS 10 MG, tablett, 30TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 50 | | | | | | |
| 1166015 | torasemiid, 10mg | C03CA04 | TORASEMIDE TEVA, tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| 1422717 | torasemiid, 10mg | C03CA04 | TORASEMIDE HEXAL, tablett, 30TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |
| 1032321 | torasemiid, 200mg | C03CA04 | TRIFAS 200 MG, tablett, 30TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 50 | | | | | | |
| 1158106 | torasemiid, 200mg | C03CA04 | TORASEMIDE HEXAL 200 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |
| 1165957 | torasemiid, 5mg | C03CA04 | TORASEMIDE TEVA, tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| 1015399 | tramadool, 100mg | N02AX02 | TRAMAL, rektaalsuposiit, 5TK | Stada Arzneimittel AG | 50 | | | | | | |
| 1032691 | tramadool, 100mg | N02AX02 | TRAMADOL LANNACHER, rektaalsuposiit, 5TK | G.L. Pharma GmbH | 50 | | | | | | |
| 1043525 | tramadool, 100mg | N02AX02 | TRAMADOL KRKA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|--------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1075665 | tramadool, 100mg | N02AX02 | TRAMADOL LANNACHER 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH | 50 | | | | | | |
| 1075890 | tramadool, 100mg | N02AX02 | TRAMAL RETARD 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Stada Arzneimittel AG | 50 | | | | | | |
| 1174621 | tramadool, 100mg | N02AX02 | MABRON RETARD, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 30TK | Medochemie Ltd | 50 | | | | | | |
| 1041545 | tramadool, 150mg | N02AX02 | TRAMAL RETARD 150 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 10TK | Stada Arzneimittel AG | 50 | | | | | | |
| 1085857 | tramadool, 150mg | N02AX02 | TRAMADOL LANNACHER 150MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH | 50 | | | | | | |
| 1041556 | tramadool, 200mg | N02AX02 | TRAMAL RETARD 200 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 10TK | Stada Arzneimittel AG | 50 | | | | | | |
| 1085879 | tramadool, 200mg | N02AX02 | TRAMADOL LANNACHER 200 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH | 50 | | | | | | |
| 1015580 | tramadool, 50mg | N02AX02 | TRAMADOL KRKA, kõvakapsel, 20TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| 1032679 | tramadool, 50mg | N02AX02 | TRAMADOL LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | G.L. Pharma GmbH | 50 | | | | | | |
| 1074765 | trandolapriil, 2mg | C09AA10 | GOPTEN, kõvakapsel, 28TK | BGP Products SIA | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1327520 | trandolapriil, 4mg | C09AA10 | GOPTEN, kõvakapsel, 28TK | BGP Products SIA | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1233290 | trandolapriil+verapamiil , 2mg+180mg | C09BB10 | TARKA, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 28TK | BGP Products SIA | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|------------------------------------|------------------|------------------|--|--------|-----------|------------|---|
| 1377660 | trandolapriil+verapamiil , 4mg+240mg | C09BB10 | TARKA, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 28TK | BGP Products SIA | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1051816 | traneksaamhape, 100mg 1ml | B02AA02 | CYKLOKAPRON, süstelahus, 5ml 10TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| 1083316 | traneksaamhape, 500mg | B02AA02 | CYKLOKAPRON, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | Meda AB | 50 | | | | | | |
| 1130454 | travoprost, 40mcg 1ml | S01EE04 | TRAVATAN, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK | Alcon Laboratories Ltd | 50 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1585953 | travoprost, 40mcg 1ml | S01EE04 | TRAVOPROST TEVA, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK | Teva Pharma B.V. | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1600614 | travoprost, 40mcg 1ml | S01EE04 | BONDULC, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1608027 | travoprost, 40mcg 1ml | S01EE04 | TRAVOPROST ZENTIVA, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK | Zentiva k.s. | 50 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1186040 | treprostiniil, 1mg 1ml | B01AC21 | REMODULIN, infusioonilahus, 20ml 1TK | United Therapeutics Europe, Ltd | 100 | I27.0-I27.0 | Pediaater, Kardioloog, Pulmonoloog | | | | NYHA III või IV kl idiopaatilise või päriliku pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kopsusiirdamise järjekorras olevale patsiendile, kellel muud ravivõimalused on ebapiisavad või ravivormi tõttu sobimatud |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|---|
| 1186062 | treprostiniil, 2,5mg 1ml | B01AC21 | REMODULIN, infusioonilahus, 20ml 1TK | United Therapeutics Europe, Ltd | 100 | I27.0-I27.0 | Pediaater, Kardioloog, Pulmonoloog | | | | NYHA III või IV kl idiopaatilise või päriliku pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kopsusiirdamise järjekorras olevale patsiendile, kellel muud ravivõimalused on ebapiisavad või ravivormi tõttu sobimatud |
| 1186073 | treprostiniil, 5mg 1ml | B01AC21 | REMODULIN, infusioonilahus, 20ml 1TK | United Therapeutics Europe, Ltd | 100 | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog, Kardioloog, Pediaater | | | | NYHA III või IV kl idiopaatilise või päriliku pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kopsusiirdamise järjekorras olevale patsiendile, kellel muud ravivõimalused on ebapiisavad või ravivormi tõttu sobimatud |
| 1008425 | triamtsinoloon, 40mg 1ml | H02AB08 | KENALOG, süstesuspensioon, 1ml 5TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| 1014422 | triheksüfenidüül, 2mg | N04AA01 | CYCLODOL, tablett, 50TK | AS Grindeks | 50 | | | | | | |
| 1109641 | trimetasidiin, 35mg | C01EB15 | PREDUCTAL MR, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK | Les Laboratories Servier | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|---|--|
| 1293162 | trimetasidiin, 35mg | C01EB15 | TRIMETAZIDINE TEVA 35MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| 1401411 | trimetasidiin, 35mg | C01EB15 | TRIMETAZIDINE ACTAVIS, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| 1016312 | trimetoprim, 100mg | J01EA01 | TRIMETOP 100MG, tablett, 30TK | VITABALANS OY | 50 | | | | | | |
| 1400421 | triptoreliin, 11,25mg | L02AE04 | DIPHERELINE 11,25 MG, toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK | Ipsen Pharma | 75 | N80-N80 | Günekoloog | | | | III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E22.8-E22.8 | Endokrinoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 100 | C61-C61 | Onkoloog, Uroloog | | | lokaalse või lokaalselt levinud ja kõrge riskiga eesnäärmevähiga patsientidele (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kokkuvõttes kuni 2 aasta vältel, ravimi väljakirjutamise õigus alates 13. ravinädalast | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|---|---|
| 1040397 | triptoreliin, 3,75mg | L02AE04 | DIPHERELINE 3,75 MG, toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK | Ipsen Pharma | 75 | E22.8-E22.8 | Endokrinoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C61-C61 | Onkoloog, Uroloog | | | | lokaalse või lokaalselt levinud ja kõrge riskiga eesnäärmevähiga patsientidele (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kokkuvõttes kuni 2 aasta vältel, ravimi väljakirjutamise õigus alates 13. ravinädalast |
| | | | | | 75 | N80-N80 | Günekoloog | | | III-IV astme endometriooosi põdevatele patsientidele | |
| 1007963 | tromantadiin, 1% | D06BB02 | VIRU-MERZ SEROL GEEL, geel, 2g 1TK | Merz Pharmaceuticals GmbH | 50 | | | | | | |
| 1090189 | trosipiumkloriid, 15mg | G04BD09 | SPASMED 15, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | PRO.MED.CS Praha a.s. | 50 | | | | | | |
| 1025064 | tsefadroksiil, 1g | J01DB05 | DURACEF, lahustuv tablett, 10TK | PharmaSwiss Ceska republika s.r.o | 50 | | | | | | |
| 1027134 | tsefadroksiil, 500mg | J01DB05 | DURACEF, kõvakapsel, 12TK | PharmaSwiss Ceska republika s.r.o | 50 | | | | | | |
| 1067318 | tsefadroksiil, 50mg 1ml | J01DB05 | DURACEF, suukaudse suspensiooni pulber, 100ml 1TK | PharmaSwiss Ceska republika s.r.o | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1068320 | tsefprosiil, 250mg | J01DC10 | CEFZIL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | PharmaSwiss Ceska republika s.r.o | 50 | | | | | | |
| 1068375 | tsefprosiil, 500mg | J01DC10 | CEFZIL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | PharmaSwiss Ceska republika s.r.o | 50 | | | | | | |
| 1028506 | tsefprosiil, 50mg 1ml | J01DC10 | CEFZIL, suukaudse suspensiooni pulber, 60ml 1TK | PharmaSwiss Ceska republika s.r.o | 50 | | | | | | |
| 1068319 | tsefprosiil, 50mg 1ml | J01DC10 | CEFZIL, suukaudse suspensiooni pulber, 100ml 1TK | PharmaSwiss Ceska republika s.r.o | 50 | | | | | | |
| 1007110 | tsefuroksiim, 250mg | J01DC02 | ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Glaxo Group Ltd. | 50 | | | | | | |
| 1219766 | tsefuroksiim, 250mg | J01DC02 | XORIMAX, kaetud tablett, 10TK | Sandoz GmbH | 50 | | | | | | |
| 1438387 | tsefuroksiim, 250mg | J01DC02 | AXETINE, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Medochemie Ltd. | 50 | | | | | | |
| 1659922 | tsefuroksiim, 250mg | J01DC02 | FUROCEF, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Krka, d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| 1137350 | tsefuroksiim, 25mg 1ml | J01DC02 | ZINNAT, suukaudse suspensiooni graanulid, 100ml 1TK | Glaxo Group Ltd. | 50 | | | | | | |
| 1007143 | tsefuroksiim, 500mg | J01DC02 | ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Glaxo Group Ltd. | 50 | | | | | | |
| 1219801 | tsefuroksiim, 500mg | J01DC02 | XORIMAX, kaetud tablett, 10TK | Sandoz GmbH | 50 | | | | | | |
| 1287840 | tsefuroksiim, 500mg | J01DC02 | ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | Glaxo Group Ltd. | 50 | | | | | | |
| 1438398 | tsefuroksiim, 500mg | J01DC02 | AXETINE, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Medochemie Ltd. | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1580947 | tsefuroksiim, 500mg | J01DC02 | AXETINE, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | Medochemie Ltd. | 50 | | | | | | |
| 1624801 | tsefuroksiim, 500mg | J01DC02 | XORIMAX, kaetud tablett, 14TK | Sandoz GmbH | 50 | | | | | | |
| 1659988 | tsefuroksiim, 500mg | J01DC02 | FUROCEF, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Krka, d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| 1660003 | tsefuroksiim, 500mg | J01DC02 | FUROCEF, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | Krka, d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| 1073641 | tselekoksiib, 100mg | M01AH01 | CELEBREX, kõvakapsel, 20TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| 1073652 | tselekoksiib, 100mg | M01AH01 | CELEBREX, kõvakapsel, 30TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| 1596719 | tselekoksiib, 100mg | M01AH01 | ACLEXA, kõvakapsel, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| 1073731 | tselekoksiib, 200mg | M01AH01 | CELEBREX, kõvakapsel, 10TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| 1073753 | tselekoksiib, 200mg | M01AH01 | CELEBREX, kõvakapsel, 30TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| 1596797 | tselekoksiib, 200mg | M01AH01 | ACLEXA, kõvakapsel, 30TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| 1077836 | tsetirisiin, 10mg | R06AE07 | ZYRTEC, tablett, 30TK | UCB Pharma OY Finland | 50 | | | | | | |
| 1098918 | tsetirisiin, 10mg | R06AE07 | CETIRIZIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Actavis UK Limited | 50 | | | | | | |
| 1121870 | tsetirisiin, 10mg | R06AE07 | ACETERIN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50 | | | | | | |
| 1430750 | tsetirisiin, 10mg | R06AE07 | CETRIX 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | VITABALANS OY | 50 | | | | | | |
| 1430772 | tsetirisiin, 10mg | R06AE07 | CETRIX 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | VITABALANS OY | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|----------|----------------------|--------|-----------|--|--|
| 1022869 | tsetirisiin, 10mg 1ml | R06AE07 | ZYRTEC, suukaudsed tilgad, lahus, 20ml 1TK | UCB Pharma OY Finland | 50 | | | | | | |
| 1043356 | tsetroreliks, 0,25mg | H01CC02 | CETROTIDE, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Merck Serono Europe Limited | 50 | | | | | | |
| 1205132 | tsinakaltseet, 30mg | H05BX01 | MIMPARA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Amgen Europe B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | Pediaater, Nefroloog | | | | hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärgväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid vastunäidustatud |
| 1205176 | tsinakaltseet, 60mg | H05BX01 | MIMPARA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Amgen Europe B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | Nefroloog, Pediaater | | | hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärgväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid vastunäidustatud | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|------------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1205211 | tsinakaltseet, 90mg | H05BX01 | MIMPARA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Amgen Europe B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | Pediaater, Nefroloog | | | | hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid vastunäidustatud |
| 1196377 | tsinkatsetaadihüdraat, 167,84mg | A16AX05 | WILZIN, kõvakapsel, 250TK | Orphan Europe SARL | 100 | E83.0-E83.0 | Gastroenteroloog, Neuroloog | esmane | | | |
| 1196388 | tsinkatsetaadihüdraat, 83,92mg | A16AX05 | WILZIN, kõvakapsel, 250TK | Orphan Europe SARL | 100 | E83.0-E83.0 | Gastroenteroloog, Neuroloog | esmane | | | |
| 1005488 | tsiprofloksatsiin, 250mg | J01MA02 | CIPRINOL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | KRKA d.d., Novo mesto | 100 | D60-D64 | Pediaater, Hematoloog | | | | |
| | | | | | 100 | E84-E84 | Pediaater, Pulmonoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1042827 | tsiprofloksatsiin, 3mg 1ml | S01AE03 | CILOXAN, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK | s.a. Alcon-Couvreur N.V. | 50 | | | | | | |
| 1005545 | tsiprofloksatsiin, 500mg | J01MA02 | CIPRINOL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | KRKA d.d., Novo mesto | 100 | E84-E84 | Pulmonoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 100 | D60-D64 | Hematoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1223929 | tsiprofloksatsiin, 500mg | J01MA02 | CIPROFLOXACIN SANDOZ 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 100 | E84-E84 | Pediaater, Pulmonoloog | | | | |
| | | | | | 100 | D60-D64 | Pediaater, Hematoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1500994 | tsiprofloksatsiin, 500mg | J01MA02 | CIPROFLOXACIN OLAINFARM, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | JSC Olainfarm | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | D60-D64 | Hematoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 100 | E84-E84 | Pulmonoloog, Pediaater | | | | |
| 1083552 | tsitalopraam, 10mg | N06AB04 | CITALEC 10, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva a.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F33.2-F33.3, F32.2- F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1218361 | tsitalopraam, 10mg | N06AB04 | CITALOPRAM - TEVA 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F33.2-F33.3, F32.2- F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1083563 | tsitalopraam, 20mg | N06AB04 | CITALEC 20, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva a.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F33.2-F33.3, F32.2- F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1112937 | tsitalopraam, 20mg | N06AB04 | CIRAL 20 MG, kaetud tablett, 28TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F33.2-F33.3, F32.2- F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1185409 | tsitalopraam, 20mg | N06AB04 | CITALOPRAM ACTAVIS 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Nordic A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F33.2-F33.3, F32.2- F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1218462 | tsitalopraam, 20mg | N06AB04 | CITALOPRAM - TEVA 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F33.2-F33.3, F32.2- F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1443631 | tsitalopraam, 20mg | N06AB04 | CITALOPRAM VITABALANS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | VITABALANS OY | 100 | F33.2-F33.3, F32.2- F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1185533 | tsitalopraam, 40mg | N06AB04 | CITALOPRAM ACTAVIS 40 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Nordic A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F33.2-F33.3, F32.2- F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1218563 | tsitalopraam, 40mg | N06AB04 | CITALOPRAM - TEVA 40MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 100 | F33.2-F33.3, F32.2- F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|------------------------------------|---|--------|-----------|-------------------------------------|----------|
| 1443697 | tsitalopraam, 40mg | N06AB04 | CITALOPRAM VITABALANS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | VITABALANS OY | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 7000175 | tsitrulliin, | | L-CITRULLINE , pulber, 100 g | SHS | 50 | | | | | | |
| 1021790 | tsüklofosfamiid, 50mg | L01AA01 | ENDOXAN, kaetud tablett, 50TK | Baxter Oncology GmbH | 75 | N00-N08 | Pediaater, Nefroloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M45-M46, M08-M08, M30-M35, M05-M06 | Reumatoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | Hematoloog, Onkoloog | | | | |
| 1123760 | tsüklopentolaat, 10mg 1ml | S01FA04 | CYCLOGYL, silmatilgad, lahus, 15ml 1TK | s.a. Alcon-Couvreur N.V. | 50 | | | | | silmahaiguste ambulatoorseks raviks | |
| 1008559 | tsüklosporiin, 100mg | L04AD01 | SANDIMMUN NEORAL, pehmekapsel, 50TK | Novartis Finland OY | 75 | N00-N08 | Nefroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 75 | L50.8-L50.9, L50.1-L50.5 | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M35, M05-M08, M45-M46 | Pediaater, Reumatoloog | | | | |
| | | | | | 100 | D46-D46 | Hematoloog | | | | |
| | | | | | 100 | D60-D64 | Hematoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 75 | L40-L40 | Pediaater, Dermatoveneroloog, Reumatoloog | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------------|---|--------|-----------|------------|----------|
| 1098840 | tsüklosporiin, 100mg | L04AD01 | EQUORAL 100 MG, pehmekapsel, 50TK | TEVA Czech Industries s.r.o. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | D46-D46 | Hematoloog | | | | |
| | | | | | 75 | L40-L40 | Reumatoloog, Dermatoveneroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 100 | D60-D64 | Hematoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 75 | L50.8-L50.9, L50.1- L50.5 | | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 75 | N00-N08 | Nefroloog, Pediaater | | | | |
| 1008526 | tsüklosporiin, 25mg | L04AD01 | SANDIMMUN NEORAL, pehmekapsel, 50TK | Novartis Finland OY | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | Reumatoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 75 | L40-L40 | Reumatoloog, Dermatoveneroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 100 | D46-D46 | Hematoloog | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 100 | D60-D64 | Hematoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 75 | L50.8-L50.9, L50.1- L50.5 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 75 | N00-N08 | Nefroloog, Pediaater | | | | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------------|---|--------|-----------|------------|----------|
| 1098828 | tsüklosporiin, 25mg | L04AD01 | EQUORAL 25 MG, pehmekapsel, 50TK | TEVA Czech Industries s.r.o. | 75 | N00-N08 | Pediaater, Nefroloog | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | Reumatoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 100 | D46-D46 | Hematoloog | | | | |
| | | | | | 100 | D60-D64 | Hematoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 75 | L40-L40 | Pediaater, Dermatoveneroloog, Reumatoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | L50.8-L50.9, L50.1- L50.5 | | | | | |
| 1008548 | tsüklosporiin, 50mg | L04AD01 | SANDIMMUN NEORAL, pehmekapsel, 50TK | Novartis Finland OY | 100 | D46-D46 | Hematoloog | | | | |
| | | | | | 100 | D60-D64 | Hematoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 75 | L40-L40 | Pediaater, Reumatoloog, Dermatoveneroloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | L50.8-L50.9, L50.1- L50.5 | | | | | |
| | | | | | 75 | N00-N08 | Nefroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | Reumatoloog, Pediaater | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1098839 | tsüklosporiin, 50mg | L04AD01 | EQUORAL 50 MG, pehmekapsel, 50TK | TEVA Czech Industries s.r.o. | 75 | L50.8-L50.9, L50.1- L50.5 | | | | | |
| | | | | | 100 | D46-D46 | Hematoloog | | | | |
| | | | | | 100 | D60-D64 | Hematoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | L40-L40 | Reumatoloog, Pediaater, Dermatoveneroloog | | | | |
| | | | | | 75 | N00-N08 | Pediaater, Nefrooloog | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M35, M05- M08, M45-M46 | Pediaater, Reumatoloog | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| 1064124 | tsüproteroon, 50mg | G03HA01 | ANDROCUR, tablett, 50TK | Bayer Pharma AG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C61-C61 | Uroloog, Onkoloog | | | | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosest kastratsioonist) |
| 1014488 | tsüproteroon+östrogeen, 2mg+0,035mg | G03HB01 | DIANE, kaetud tablett, 21TK | Bayer Pharma AG | 50 | | | | | | |
| 1557435 | ulipristaal, 5mg | G03XB02 | ESMYA, tablett, 28TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| 1016985 | ursodeoksükoolhape, 250mg | A05AA02 | URSOSAN, kõvakapsel, 50TK | PRO. MED. CS. PRAHA a.s | 75 | K74-K74, K73-K73 | Gastroenteroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---|------------------|--|--------------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1044818 | ursodeoksükoolhape, 250mg | A05AA02 | URSOFALK, kõvakapsel, 50TK | Dr. Falk Pharma GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K74-K74, K73-K73 | Pediaater, Gastroenteroloog | | | | |
| 1301094 | valatsikloviir, 1000mg | J05AB11 | VALACICLOVIR ACTAVIS 1000MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| 1016301 | valatsikloviir, 500mg | J05AB11 | VALTREX, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 50 | | | | | | |
| 1300936 | valatsikloviir, 500mg | J05AB11 | VALACICLOVIR ACTAVIS 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| 1369593 | valatsikloviir, 500mg | J05AB11 | VALACICLOVIR ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | SIA ELVIM | 50 | | | | | | |
| 1043592 | valproehape, 150mg | N03AG01 | CONVULEX 150 MG, gastroresistentne pehmekapsel, 100TK | G.L. Pharma GmbH | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1076419 | valproehape, 150mg | N03AG01 | ORFIRIL LONG 150 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 100TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1108246 | valproehape, 150mg | N03AG01 | ORFIRIL 150, gastroresistentne tablett, 100TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1043604 | valproehape, 300mg | N03AG01 | CONVULEX 300 MG, gastroresistentne pehmekapsel, 100TK | G.L. Pharma GmbH | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1077308 | valproehape, 300mg | N03AG01 | ORFIRIL LONG 300 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 100TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1086555 | valproehape, 300mg | N03AG01 | DEPAKINE CHRONO 300 mg, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1108257 | valproehape, 300mg | N03AG01 | ORFIRIL 300, gastroresistentne tablett, 100TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1076341 | valproehape, 500mg | N03AG01 | ORFIRIL LONG 500 MG, toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 100TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1086544 | valproehape, 500mg | N03AG01 | DEPAKINE CHRONO 500 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1224672 | valproehape, 500mg | N03AG01 | VALPROATE SODIUM SANDOZ 500MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1043581 | valproehape, 50mg 1ml | N03AG01 | CONVULEX, siirup, 100ml 1TK | G.L. Pharma GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1108268 | valproehape, 600mg | N03AG01 | ORFIRIL 600, gastroresistentne tablett, 50TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1025536 | valproehape, 60mg 1ml | N03AG01 | ORFIRIL SAFT, suukaudne lahus, 250ml 1TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1092844 | valsartaan, 160mg | C09CA03 | DIOVAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Novartis Finland OY | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1250378 | valsartaan, 160mg | C09CA03 | VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1250389 | valsartaan, 160mg | C09CA03 | VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|--------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1434495 | valsartaan, 160mg | C09CA03 | VALZAP, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Zentiva k.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1515057 | valsartaan, 160mg | C09CA03 | VALSARTAN MEDOCHEMIE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Medochemie Ltd. | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1515079 | valsartaan, 160mg | C09CA03 | VALSARTAN MEDOCHEMIE, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Medochemie Ltd. | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1421233 | valsartaan, 320mg | C09CA03 | VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1250323 | valsartaan, 80mg | C09CA03 | VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1434473 | valsartaan, 80mg | C09CA03 | VALZAP, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Zentiva k.s. | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1514854 | valsartaan, 80mg | C09CA03 | VALSARTAN MEDOCHEMIE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Medochemie Ltd. | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1514876 | valsartaan, 80mg | C09CA03 | VALSARTAN MEDOCHEMIE, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Medochemie Ltd. | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1324314 | valsartaan+hüdroklorot iasiid, 160mg+12,5mg | C09DA03 | VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1434518 | valsartaan+hüdroklorot iasiid, 160mg+12,5mg | C09DA03 | VALZAP H, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Zentiva k.s. | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1324235 | valsartaan+hüdroklorot iasiid, 160mg+25mg | C09DA03 | VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1457557 | valsartaan+hüdroklorot iasiid, 320mg+12,5mg | C09DA03 | VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|--------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1324156 | valsartaan+hüdroklorot iasiid, 80mg+12,5mg | C09DA03 | VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1434530 | valsartaan+hüdroklorot iasiid, 80mg+12,5mg | C09DA03 | VALZAP H, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Zentiva k.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1008335 | varfariin, 3mg | B01AA03 | MAREVAN, tablett, 100TK | Orion Corporation | 100 | I80-I82, Z95.2- Z95.2, I26-I26, T82- T82, I67.6-I67.6, I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | | | | | |
| 1008368 | varfariin, 5mg | B01AA03 | MAREVAN FORTE, tablett, 100TK | Orion Corporation | 75 | I47-I49 | | | | | |
| | | | | | 100 | I80-I82, Z95.2- Z95.2, I26-I26, T82- T82, I67.6-I67.6, I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1232468 | venlafaksiin, 150mg | N06AX16 | ALVENTA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| 1261741 | venlafaksiin, 150mg | N06AX16 | VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR 150 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK | Medochemie Ltd | 50 | | | | | | |
| 1306325 | venlafaksiin, 150mg | N06AX16 | VENLAGAMMA 150 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| 1316405 | venlafaksiin, 150mg | N06AX16 | ARGOFAN 150 SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Zentiva a.s. | 50 | | | | | | |
| 1435205 | venlafaksiin, 150mg | N06AX16 | VENLAFAXINE ELVIM, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK | SIA ELVIM | 50 | | | | | | |
| 1232266 | venlafaksiin, 37,5mg | N06AX16 | ALVENTA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1435160 | venlafaksiin, 37,5mg | N06AX16 | VENLAFAXINE ELVIM, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK | Portfarma ehf | 50 | | | | | | |
| 1232367 | venlafaksiin, 75mg | N06AX16 | ALVENTA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK | KRKA d.d., Novo mesto | 50 | | | | | | |
| 1261684 | venlafaksiin, 75mg | N06AX16 | VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR 75 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK | Medochemie Ltd | 50 | | | | | | |
| 1306246 | venlafaksiin, 75mg | N06AX16 | VENLAGAMMA 75 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| 1316371 | venlafaksiin, 75mg | N06AX16 | ARGOFAN 75 SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Zentiva a.s. | 50 | | | | | | |
| 1435182 | venlafaksiin, 75mg | N06AX16 | VENLAFAXINE ELVIM, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK | SIA ELVIM | 50 | | | | | | |
| 1073157 | verapamiil, 120mg | C08DA01 | ISOPTIN RETARD 120 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | Mylan Healthcare GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1073180 | verapamiil, 240mg | C08DA01 | ISOPTIN RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | Mylan Healthcare GmbH | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1073405 | verapamiil, 80mg | C08DA01 | VERAPAMIL- RATIOPHARM 80 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | ratiopharm GmbH | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| 1632361 | vilanterool+flutikasoonf uroaat, 22mcg+184mcg 1annust | R03AK10 | RELVAR ELLIPTA, annustatud inhalatsioonipulber, 30annust 1TK | Glaxo Group Ltd. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------|-----------|---|----------|
| 1632338 | vilanterool+flutikasoonf uroaat, 22mcg+92mcg 1annust | R03AK10 | RELVAR ELLIPTA, annustatud inhalatsioonipulber, 30annust 1TK | Glaxo Group Ltd. | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1649224 | vilanterool+umekliidiini umbromiid, 22mcg+65mcg 1annust | R03AL03 | ANORO, annustatud inhalatsioonipulber, 30annust 1TK | Glaxo Group Ltd. | 75 | J43-J44 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1316326 | vildagliptiin, 50mg | A10BH02 | GALVUS, tablett, 60TK | Novartis Europharm Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | II tüüpi diabeedi (E11, E14) kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud | |
| 1038079 | von Willebrand'i faktor+VIII hüübimisfaktor, 190RÜ+250RÜ | B02BD06 | IMMUNATE 250 RÜ/190 RÜ, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Baxalta Innovations GmbH | 100 | D68.0-D68.0, D68.4- D68.4, D66-D66 | Pediaater, Hematoloog | | | | |
| 1038091 | von Willebrand'i faktor+VIII hüübimisfaktor, 375RÜ+500RÜ | B02BD06 | IMMUNATE 500 RÜ/375 RÜ, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Baxalta Innovations GmbH | 100 | D68.0-D68.0, D68.4- D68.4, D66-D66 | Pediaater, Hematoloog | | | | |
| 1349232 | von Willebrand'i faktor+VIII hüübimisfaktor, 750RÜ+1000RÜ | B02BD06 | IMMUNATE 1000 RÜ/750 RÜ, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Baxalta Innovations GmbH | 100 | D68.0-D68.0, D68.4- D68.4, D66-D66 | Pediaater, Hematoloog | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1107975 | vorikonasool, 200mg | J02AC03 | VFEND, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Pfizer Limited | 100 | B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44 | | | | | väljakirjutamise õigus kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks, kui muud suukaudsed seenevastased ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud |
| 1615902 | vorikonasool, 200mg | J02AC03 | VORICONAZOLE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Accord Healthcare Limited | 100 | B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44 | | | | | väljakirjutamise õigus kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks, kui muud suukaudsed seenevastased ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud |
| 1031746 | östradiol, 0,01% 1g | G03CA03 | LINOLADIOL N, kreem, 25g 1TK | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50 | | | | | | |
| 1380721 | östradiol, 10mcg | G03CA03 | VAGIFEM, vaginaaltablett, 18TK | Novo Nordisk A/S | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müüjiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|---|------------------|--|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1030442 | östradiool, 1mg | G03CA03 | ESTROFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Novo Nordisk A/S | 100 | E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97 | Günekoloog, Endokrinoloog | esmane | | 50,00 | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1030510 | östradiool, 1mg 1g | G03CA03 | DIVIGEL, transdermaalne geel, 0.5g 28TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| 1063415 | östradiool, 1mg 1g | G03CA03 | DIVIGEL, transdermaalne geel, 1g 28TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| 1030431 | östradiool, 2mg | G03CA03 | ESTROFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Novo Nordisk A/S | 100 | E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97 | Günekoloog, Endokrinoloog | esmane | | 50,00 | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1684111 | östradiool, 2mg | G03CA03 | ESTROFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | First Pharma OÜ | 100 | E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97 | Günekoloog, Endokrinoloog | esmane | | 50,00 | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1026672 | östradiool, 50mcg 24h | G03CA03 | CLIMARA, transdermaalne plaaster, 4TK | Bayer Pharma AG | 50 | | | | | | |
| 1031735 | östradiool+prednisoloon, 0,05mg+4mg 1g | G03CA80 | LINOLADIOL-H N, kreem, 25g 1TK | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50 | | | | | | |
| 1022634 | östriool, 500mcg | G03CA04 | OVESTIN, vaginaalsuposiit, 15TK | Aspen Pharma Trading Limited | 50 | | | | | | |