

EESTI HAIGEKASSA RAVIMITE LOETELU

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1539547	abirateroon, 250mg	L02BX03	ZYTIGA, tablett, 120TK	JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV	100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				metastaseerunud kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks heas üldseisundis (ECOG 0-1 või valusündroomist tingitud ECOG 2) patsientidele, kelle haigus on eelneva dotsetakseeli sisaldava kemoteeraapia vältel või pärast seda progresseerunud; soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi abiraterooniga on ravimite tootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.10.2014. a.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1734768	abirateroon, 500mg	L02BX03	ZYTIGA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV	100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				metastaseerunud kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks heas üldseisundis (ECOG 0-1 või valusündroomist tingitud ECOG 2) patsientidele, kelle haigus on eelneva dotsetakseeli sisaldava kemoteraapia vältel või pärast seda progresseerunud; soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi abiraterooniga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.10.2014. a.
1011429	adapaleen, 1mg 1g	D10AD03	DIFFERIN, geel, 30g 1TK	GALDERMA INTERNATIONAL	50						
1011430	adapaleen, 1mg 1g	D10AD03	DIFFERIN, kreem, 30g 1TK	GALDERMA INTERNATIONAL	50						
1412334	agomelatiin, 25mg	N06AX22	VALDOXAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Les Laboratoires Servier	50						
1738469	agomelatiin, 25mg	N06AX22	ZILBEA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
1738762	agomelatiin, 25mg	N06AX22	AGOMELATINE MYLAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Mylan S.A.S	50						
1738919	agomelatiin, 25mg	N06AX22	AGOMELATINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
1763872	agomelatiin, 25mg	N06AX22	LAMEGOM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Krka, d.d. Novo mesto	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1590106	aklidiinium, 322mcg 1annust	R03BB05	BRETARIS GENUAIR, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	AstraZeneca AB	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
1593312	aksitiniib, 1mg	L01XE17	INLYTA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast esimese rea sunitiniib- või pasopaniibravi patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine aksitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1593345	aksitiniib, 5mg	L01XE17	INLYTA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast esimese rea sunitiniib- või pasopaniibravi patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine aksitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
1240120	alendroonhape, 70mg	M05BA04	SEDRON, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK	Gedeon Richter Plc.	75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1245338	alendroonhape, 70mg	M05BA04	ALENOTOP, tablett, 4TK	Teva Pharma B.V.	75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
					50						
1339141	alendroonhape+koleka ltsiferool, 70mg+5600RÜ	M05BB03	FOSAVANCE, tablett, 4TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
					50						
1695067	alendroonhape+koleka ltsiferool, 70mg+5600RÜ	M05BB03	ALENDRONIC ACID/COLECALCIFEROL ZENTIVA, tablett, 4TK	Zentiva k.s.	75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
					50						
1696204	alendroonhape+koleka ltsiferool, 70mg+5600RÜ	M05BB03	ALENDRONIC ACID/ COLECALCIFEROL SANDOZ, tablett, 4TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1696226	alendroonhape+koleka ltsiferool, 70mg+5600RÜ	M05BB03	ALENDRONIC ACID/ COLECALCIFEROL SANDOZ, tablett, 12TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
1163854	alfa-2a-interferoon, 3000000RÜ 0.5ml	L03AB04	ROFERON-A, süstelahus, 1TK	Roche Eesti OÜ	100	C82-C85, D47-D47, C91-C92, D45-D45, C64-C64	Onkoloog, Hematoloog				
					100	C43-C43	Onkoloog				adjuvantraviks AJCC II staadiumi korral pärast kasvaja kirurgilist resektsiooni
					100	B18.2-B18.2	Gastroenteroloog, Infektsionist				
					50						
1110384	alfa-2a-peginterferoon, 135mcg 0.5ml	L03AB11	PEGASYS, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	B18.0-B18.2	Infektsionist, Gastroenteroloog				kroonilise progresseeruva kuluga B- või C-viirushepatiidi raviks
					50						
1110407	alfa-2a-peginterferoon, 180mcg 0.5ml	L03AB11	PEGASYS, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	B18.0-B18.2	Infektsionist, Gastroenteroloog				kroonilise progresseeruva kuluga B- või C-viirushepatiidi raviks
					50						
1207493	alfadarbepoetiin, 100mcg 0.5ml	B03XA02	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK	Amgen Europe B.V.	100	D46-D46, D47.1- D47.1	Hematoloog				
					50						
					100	D63-D63, T86-T86	Pediaater, Uroloog, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1207527	alfadarbepoetiin, 150mcg 0.3ml	B03XA02	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Amgen Europe B.V.	50						
					100	D63-D63, T86-T86	Pediaater, Uroloog, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					100	D46-D46, D47.1- D47.1	Hematoloog				
1176218	alfadarbepoetiin, 20mcg 0.5ml	B03XA02	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK	Amgen Europe B.V.	50						
					100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Pediaater, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					100	D46-D46, D47.1- D47.1	Hematoloog				
1207314	alfadarbepoetiin, 30mcg 0.3ml	B03XA02	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Amgen Europe B.V.	100	D63-D63, T86-T86	Nefroloog, Uroloog, Pediaater				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					50						
					100	D46-D46, D47.1- D47.1	Hematoloog				
1207370	alfadarbepoetiin, 40mcg 0.4ml	B03XA02	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.4ml 1TK	Amgen Europe B.V.	100	D46-D46, D47.1- D47.1	Hematoloog				
					100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Pediaater, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					50						
1207415	alfadarbepoetiin, 50mcg 0.5ml	B03XA02	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK	Amgen Europe B.V.	100	D46-D46, D47.1- D47.1	Hematoloog				
					50						
					100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Nefroloog, Pediaater				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1207437	alfadarbepoetiin, 60mcg 0.3ml	B03XA02	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Amgen Europe B.V.	100	D46-D46, D47.1- D47.1	Hematoloog				
					100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Nefroloog, Pediaater				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1207471	alfadarbepoetiin, 80mcg 0.4ml	B03XA02	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.4ml 1TK	Amgen Europe B.V.	100	D46-D46, D47.1- D47.1	Hematoloog				
					100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Nefroloog, Pediaater				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					50						
1022960	alfadornaas, 1mg 1ml	R05CB13	PULMOZYME, nebuliseeritav lahus, 2.5ml 6TK	Roche Eesti OÜ	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1644904	alfafollitropiin, 150RÜ 0.25ml	G03GA05	BEMFOLA, süstelahus pen- süstlis, 0.25ml 1TK	Gedeon Richter Plc.	100	N97.0-N97.9, Z31.0- Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1644915	alfafollitropiin, 225RÜ 0.375ml	G03GA05	BEMFOLA, süstelahus pen- süstlis, 0.375ml 1TK	Gedeon Richter Plc.	100	N97.0-N97.9, Z31.0- Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1173855	alfafollitropiin, 300RÜ 0.5ml	G03GA05	GONAL-F, süstelahus pen- süstlis, 0.5ml 1TK	Merck Europe B.V.	100	N97.0-N97.9, Z31.0- Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1628636	alfafollitropiin, 300RÜ 0.5ml	G03GA05	OVALEAP, süstelahus, 0.5ml 1TK	Theramex Ireland Limited	100	N97.0-N97.9, Z31.0- Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused	
1644926	alfafollitropiin, 300RÜ 0.5ml	G03GA05	BEMFOLA, süstelahus pen- süstlis, 0.5ml 1TK	Gedeon Richter Plc.	50							
					100	N97.0-N97.9, Z31.0- Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks	
1213513	alfafollitropiin, 450RÜ 0.75ml	G03GA05	GONAL-F, süstelahus pen- süstlis, 0.75ml 1TK	Merck Europe B.V.	50							
					100	N97.0-N97.9, Z31.0- Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks	
1628647	alfafollitropiin, 450RÜ 0.75ml	G03GA05	OVALEAP, süstelahus, 0.75ml 1TK	Theramex Ireland Limited	100	N97.0-N97.9, Z31.0- Z31.9					41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50							
1644937	alfafollitropiin, 450RÜ 0.75ml	G03GA05	BEMFOLA, süstelahus pen- süstlis, 0.75ml 1TK	Gedeon Richter Plc.	100	N97.0-N97.9, Z31.0- Z31.9					41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50							
1035784	alfafollitropiin, 75RÜ	G03GA05	GONAL-F, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Merck Europe B.V.	50							
					100	N97.0-N97.9, Z31.0- Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks	
1644892	alfafollitropiin, 75RÜ 0.125ml	G03GA05	BEMFOLA, süstelahus pen- süstlis, 0.125ml 1TK	Gedeon Richter Plc.	50							
					100	N97.0-N97.9, Z31.0- Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1173866	alfafollitropiin, 900RÜ 1.5ml	G03GA05	GONAL-F, süstelahus pen- süstlis, 1.5ml 1TK	Merck Europe B.V.	100	N97.0-N97.9, Z31.0- Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1628658	alfafollitropiin, 900RÜ 1.5ml	G03GA05	OVALEAP, süstelahus, 1.5ml 1TK	Theramex Ireland Limited	50	N97.0-N97.9, Z31.0- Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					100						
1327834	alfafollitropiin+alfalutro- piin, 150RÜ+75RÜ	G03GA30	PERGOVERIS, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Merck Europe B.V.	50	N97.0-N97.9, Z31.0- Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					100						
1580969	alfakooriongonadotropi- in, 250mcg 0.5ml	G03GA08	OVITRELLE, süstelahus pen- süstlis, 0.5ml 1TK	Merck Europe B.V.	100	N97.0-N97.9, Z31.0- Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1046810	alfalutropiin, 75RÜ	G03GA07	LUVÉRIS, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Merck Europe B.V.	50	N97.0-N97.9, Z31.0- Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					100						
1633508	alfaturoktokog, 1000RÜ	B02BD80	NOVOEIGHT, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Novo Nordisk A/S	100	D66-D66	Pediaater, Hematoloog				
1064247	alfusosiin, 10mg	G04CA01	XATRÁL SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50						
1278176	alfusosiin, 10mg	G04CA01	ALFUZOSIN-TEVA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1001619	allopurinool, 100mg	M04AA01	ALLOPURINOL NYCOMED, tablett, 50TK	Takeda Pharma AS	50						
					75	M10-M10, N20-N23					
1685505	allopurinool, 100mg	M04AA01	ALLOPURINOL SANDOZ, tablett, 50TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	M10-M10, N20-N23					
					50						
1001686	allopurinool, 300mg	M04AA01	ALLOPURINOL NYCOMED, tablett, 50TK	Takeda Pharma AS	50						
					75	M10-M10, N20-N23					
1685628	allopurinool, 300mg	M04AA01	ALLOPURINOL SANDOZ, tablett, 100TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	M10-M10, N20-N23					
1064472	amantadiin, 100mg	N04BB01	PK-MERZ 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Merz Pharmaceuticals GmbH	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1064517	amantadiin, 100mg	N04BB01	AMANTADIN-RATIOPHARM 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	ratiopharm GmbH	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1349872	ambrisentaan, 10mg	C02KX02	VOLIBRIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Kardioloog, Reumatoloog, Pediaater				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafili ja bosentaan on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1349850	ambrisentaan, 5mg	C02KX02	VOLIBRIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Kardioloog, Pediaater, Pulmonoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafili ja bosentaan on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1016244	amiodaroon, 200mg	C01BD01	CORDARONE 200 MG, tablett, 30TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50						
					75	I47-I49	Pediaater, Kardioloog	esmane			
1044616	amiodaroon, 200mg	C01BD01	AMIOKORDIN, tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I47-I49	Kardioloog, Pediaater	esmane			
					50						
1041141	amisulpriid, 200mg	N05AL05	SOLIAN, tablett, 30TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1342213	amisulpriid, 200mg	N05AL05	AMISAN 200 MG, tablett, 30TK	PRO.MED.CS Praha a.s.	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1343438	amisulpriid, 400mg	N05AL05	AMISAN 400 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	PRO.MED.CS Praha a.s.	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1107391	amitriptüliin, 10mg	N06AA09	AMITRIPTYLINE-GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	AS Grindeks	75	G62.0-G62.0, G63- G63					
					50						
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1012475	amitriptülin, 25mg	N06AA09	AMITRIPTYLINE-GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	AS Grindeks	100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
					75	G62.0-G62.0, G63- G63					
1068634	amitriptülin, 25mg	N06AA09	AMITRIPTYLINE NYCOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Takeda Pharma AS	100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					75	G62.0-G62.0, G63- G63					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1005848	amitriptüliin, 50mg	N06AA09	SAROTEN RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 100TK	H. LUNDBECK A/S	75	G62.0-G62.0, G63- G63					
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
1087905	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLOCARD 10MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
					50						
1109900	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AGEN 10MG, tablett, 30TK	Zentiva k.s.	75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
					50						
1122972	amlodipiin, 10mg	C08CA01	HIPRES, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
					50						
1147003	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLODIPIN-RATIOPHARM 10 MG, tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
1241514	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLODIGAMMA 10MG, tablett, 30TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
					50						
1243088	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLOCARD 10MG, tablett, 60TK	HEXAL AG	75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
					50						
1295748	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLODIPINE MEDOCHEMIE, tablett, 30TK	Medochemie Ltd.	75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1318946	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLODIPINE TEVA, tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						
1318980	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLODIPINE TEVA, tablett, 90TK	Teva Pharma B.V.	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						
1416934	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLODIPINE ACTAVIS, tablett, 30TK	Actavis Group PTC ehf	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						
1445396	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLODIPINE VITABALANS, tablett, 30TK	VITABALANS OY	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1445408	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLODIPINE VITABALANS, tablett, 60TK	VITABALANS OY	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1525665	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLODIPINE ACCORD 10MG, tablett, 30TK	Accord Healthcare Limited	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1551406	amlodipiin, 10mg	C08CA01	HIPRES, tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1087871	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLOCARD 5 MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						
1109775	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLODIPIN-RATIOPHARM 5 MG, tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						
1109887	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AGEN 5MG, tablett, 30TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1122961	amlodipiin, 5mg	C08CA01	HIPRES, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1241424	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLODIGAMMA 5MG, tablett, 30TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
1242863	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLOCARD 5 MG, tablett, 60TK	HEXAL AG	75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
					50						
1295737	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLODIPINE MEDOCHEMIE, tablett, 30TK	Medochemie Ltd.	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
1318834	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLODIPINE TEVA, tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
1318878	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLODIPINE TEVA, tablett, 90TK	Teva Pharma B.V.	75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
					50						
1416899	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLODIPINE ACTAVIS, tablett, 30TK	Actavis Group PTC ehf	75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
					50						
1445284	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLODIPINE VITABALANS, tablett, 30TK	VITABALANS OY	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
1445295	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLODIPINE VITABALANS, tablett, 60TK	VITABALANS OY	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
1525597	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLODIPINE ACCORD 5MG, tablett, 30TK	Accord Healthcare Limited	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
1551383	amlodipiin, 5mg	C08CA01	HIPRES, tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I10-I13, I20- I20					
					50						
1008919	amoksitsilliin, 1000mg	J01CA04	AMOXICILLIN- RATIOPHARM 1000 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	H66-H66, J13-J15				16,00	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1066058	amoksitsilliin, 1000mg	J01CA04	AMOXICILLIN SANDOZ, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK	Sandoz GmbH	75	H66-H66, J13-J15				16,00	
					50						
1066463	amoksitsilliin, 1000mg	J01CA04	AMOXICILLIN- RATIOPHARM 1000 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	ratiopharm GmbH	75	H66-H66, J13-J15				16,00	
					50						
1306921	amoksitsilliin, 1000mg	J01CA04	OSPAMOX, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	J13-J15, H66-H66				16,00	
					50						
1000551	amoksitsilliin, 500mg	J01CA04	AMOXICILLIN- RATIOPHARM 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	J13-J15, H66-H66				16,00	
1066047	amoksitsilliin, 500mg	J01CA04	AMOXICILLIN SANDOZ, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK	Sandoz GmbH	75	H66-H66, J13-J15				16,00	
					50						
1066496	amoksitsilliin, 500mg	J01CA04	AMOXICILLIN- RATIOPHARM 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	ratiopharm GmbH	75	H66-H66, J13-J15				16,00	
					50						
1306820	amoksitsilliin, 500mg	J01CA04	OSPAMOX, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	J13-J15, H66-H66				16,00	
					50						
1000382	amoksitsilliin, 50mg 1ml	J01CA04	AMOXICILLIN-RATIOPHARM TS, suukaudse suspensiooni pulber, 100ml 1TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	J13-J15, H66-H66				16,00	
1182002	amoksitsilliin, 50mg 1ml	J01CA04	OSPAMOX 250 MG/5 ML, suukaudse suspensiooni pulber, 100ml 1TK	Sandoz GmbH	50						
					75	J13-J15, H66-H66				16,00	
1000450	amoksitsilliin, 750mg	J01CA04	AMOXICILLIN- RATIOPHARM 750 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	ratiopharm GmbH	75	H66-H66, J13-J15				16,00	
					50						
1028630	amoksitsilliin+klavulaa nhape, 500mg+125mg	J01CR02	AUGMENTIN, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1066722	amoksitsilliin+klavulaanahape, 500mg+125mg	J01CR02	AMOKSIKLAV, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1635139	amoksitsilliin+klavulaanahape, 500mg+125mg	J01CR02	BETAKLAV, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	KRKA d.d., Novomesto	50						
1028685	amoksitsilliin+klavulaanahape, 80mg+11,4mg 1ml	J01CR02	AUGMENTIN, suukaudse suspensiooni pulber, 70ml 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
1066711	amoksitsilliin+klavulaanahape, 80mg+11,4mg 1ml	J01CR02	AMOKSIKLAV, suukaudse suspensiooni pulber, 70ml 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1770948	amoksitsilliin+klavulaanahape, 80mg+11,4mg 1ml	J01CR02	AUGMENTIN, suukaudse suspensiooni pulber, 70ml 1TK	First Pharma OÜ	50						
1066700	amoksitsilliin+klavulaanahape, 875mg+125mg	J01CR02	AMOKSIKLAV, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1066733	amoksitsilliin+klavulaanahape, 875mg+125mg	J01CR02	AUGMENTIN, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	SmithKline Beecham Limited	50						
1175431	amoksitsilliin+klavulaanahape, 875mg+125mg	J01CR02	AMOKSIKLAV, dispergeeruv/suus dispergeeruv tablett, 14TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1635230	amoksitsilliin+klavulaanahape, 875mg+125mg	J01CR02	BETAKLAV, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	KRKA d.d., Novomesto	50						
1660474	amoksitsilliin+klavulaanahape, 875mg+125mg	J01CR02	AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1723092	amoksitsilliin+klavulaanahape, 875mg+125mg	J01CR02	AUGMENTIN, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	First Pharma OÜ	50						
1009572	amorolfiin, 50mg 1ml	D01AE16	LOCERYL, ravimküünelakk, 2,5ml 1TK	GALDERMA INTERNATIONAL	50						
1740866	amorolfiin, 50mg 1ml	D01AE16	LOCERYL, ravimküünelakk, 2,5ml 1TK	Globalex Pharma OÜ	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1065978	ampitsilliin, 500mg	J01CA01	STANDACILLIN, kõvakapsel, 12TK	Sandoz GmbH	50						
1208359	anagreliid, 0,5mg	L01XX35	XAGRID, kõvakapsel, 100TK	Shire Pharmaceuticals Ireland Limited	100	D47.3-D47.3	Hematoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: esmavaliku ravi (hüdroksüürea annuses vähemalt 2g päevas vähemalt 3 kuu jooksul või alfainterferoon) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning esineb trombotsütoos 1000x109/l või on ilmnunud trombohemorraagilised juhud

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1765649	anagreliid, 0,5mg	L01XX35	ANAGRELIDE MYLAN, kõvakapsel, 100TK	Mylan S.A.S	100	D47.3-D47.3	Hematoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: esmavaliku ravi (hüdroksüüurea annuses vähemalt 2g päevas vähemalt 3 kuu jooksul või alfainterferoon) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning esineb trombotsütoos 1000x109/l või on ilmnunud trombohemorraagilised juhud
1033546	anastrosool, 1mg	L02BG03	ARIMIDEX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	AstraZeneca UK Limited	50						
					100	C50-C50	Onkoloog, Üldkirurg, Gynecoloog				gynecoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
1240490	anastrosool, 1mg	L02BG03	ANASTROZOLE SANOSWISS 1 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	UAB SanoSwiss	100	C50-C50	Üldkirurg, Onkoloog, Gynecoloog				gynecoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
					50						
1244438	anastrosool, 1mg	L02BG03	ANASTROZOLE-TEVA 1MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	100	C50-C50	Gynecoloog, Üldkirurg, Onkoloog				gynecoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
					50						
1293870	anastrosool, 1mg	L02BG03	ANASTROZOLE ACCORD 1MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare Limited	50						
					100	C50-C50	Gynecoloog, Onkoloog, Üldkirurg				gynecoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1299023	anastrosool, 1mg	L02BG03	AXASTROL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	AS Grindeks	100	C50-C50	Günekoloog, Onkoloog, Üldkirurg				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
					50						
1531437	apiksabaan, 2,5mg	B01AF02	ELIQUIS, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG	50						
					75	S72.0-S72.2, S72.7- S72.7, M16-M17				kuni 30 päevaks	
1531448	apiksabaan, 2,5mg	B01AF02	ELIQUIS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG	50						
					75	I48-I48					
					75	S72.0-S72.2, S72.7- S72.7, M16-M17				kuni 30 päevaks	
1603741	apiksabaan, 5mg	B01AF02	ELIQUIS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG	75	I48-I48					
					50						
1504808	apomorfiin, 10mg 1ml	N04BC07	APO-GO, süstelahus pen- süstlis, 3ml 5TK	Britannia Pharmaceuticals Ltd	100	G20-G20	Neuroloog				konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellel esineb vaatamata optimaalsele suukaudsele ravile raskekujuline motoorikahäire kestvate või sagedaste mootorsete fluktuatsioonidega (MDS UPDRS III skoor off-perioodis on >40 punkti, off-perioodi kestus >25% ärkvelolekuajast) ning ravivastus apomorfiinile on hea (MDS-UPDRS III skoor paraneb >40%)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1649796	aripiprasool, 10mg	N05AX12	ZYKALOR, tablett, 30TK	Medochemie Ltd.	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1203578	aripiprasool, 15mg	N05AX12	ABILIFY, tablett, 28TK	Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1649370	aripiprasool, 15mg	N05AX12	LEMILVO, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1649651	aripiprasool, 15mg	N05AX12	ARIPIPRAZOLE TEVA, tablett, 28TK	Teva B.V.	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1649853	aripiprasool, 15mg	N05AX12	ZYKALOR, tablett, 30TK	Medochemie Ltd.	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1650271	aripiprasool, 15mg	N05AX12	ARISPPA, tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1651643	aripiprasool, 15mg	N05AX12	PAXIFOR, tablett, 28TK	AS Grindeks	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1691962	aripiprasool, 15mg	N05AX12	ARIPIPRAZOLE ZENTIVA, tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1692862	aripiprasool, 15mg	N05AX12	ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA, tablett, 28TK	Mylan S.A.S	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1703630	aripiprasool, 15mg	N05AX12	ARIPIPRAZOLE ACCORD, tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1725960	aripiprasool, 15mg	N05AX12	ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA, tablett, 56TK	Mylan S.A.S	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1650349	aripiprasool, 30mg	N05AX12	ARISPPA, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1004500	asatiopriin, 50mg	L04AX01	IMURAN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Aspen Pharma Trading Limited	75	K50-K51, K73-K74	Gastroenteroloog, Pediaater				
					75	L12-L12, L13.0-L13.0, L10-L10	Pediaater, Dermatoveneroloog, Allergoloog-immunoloog				
					75	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater				
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46	Pediaater, Reumatoloog				
					100	G70-G70	Neuroloog, Pediaater	esmane			
					75	N00-N08	Pediaater, Nefrooloog				
					50						
1667325	asatiopriin, 50mg	L04AX01	ATSIMUTIN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o	100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	K50-K51, K73-K74	Pediaater, Gastroenteroloog				
					75	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog				
					75	L12-L12, L13.0-L13.0, L10-L10	Pediaater, Dermatoveneroloog, Allergoloog-immunoloog				
					50						
					100	G70-G70	Pediaater, Neuroloog	esmane			
					75	N00-N08	Pediaater, Nefrooloog				
1005736	aselaiinhape, 200mg 1g	D10AX03	SKINOREN, kreem, 30g 1TK	Bayer AG	50						
1019809	asitromütsiin, 20mg 1ml	J01FA10	SUMAMED, suukaudse suspensiooni pulber, 20ml 1TK	Teva Pharma B.V.	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1019775	asitromütsiin, 250mg	J01FA10	SUMAMED, kõvakapsel, 6TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1614439	asitromütsiin, 250mg	J01FA10	AZITHROMYCIN KRKA, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK	KRKA d.d., Novo mesto	100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
					50						
1168130	asitromütsiin, 40mg 1ml	J01FA10	SUMAMED FORTE, suukaudse suspensiooni pulber, 15ml 1TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1267309	asitromütsiin, 40mg 1ml	J01FA10	SUMAMED FORTE, suukaudse suspensiooni pulber, 30ml 1TK	Teva Pharma B.V.	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					50						
1019797	asitromütsiin, 500mg	J01FA10	SUMAMED, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	Teva Pharma B.V.	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					50						
1184992	asitromütsiin, 500mg	J01FA10	AZITHROMYCIN SANDOZ 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	Sandoz GmbH	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					50						
1549548	asitromütsiin, 500mg	J01FA10	AZITHROMYCIN GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	AS Grindeks	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					50						
1563342	asitromütsiin, 500mg	J01FA10	AZITHROMYCIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1614451	asitromütsiin, 500mg	J01FA10	AZITHROMYCIN KRKA, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
1045796	aspart-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB05	NOVORAPID PENFILL, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					
1084788	aspart-insuliin, 100ühik 1ml	A10AD05	NOVOMIX 30 FLEXPEN, süstesuspensioon pen-süstlis, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1092541	aspart-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB05	NOVORAPID FLEXPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					
1736917	aspart-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB05	FIASP, süstelahus pen- süstlis, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					
1007851	atenolool, 100mg	C07AB03	ATENOLOL-RATIOPHARM 100MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	I10-I13, I15-I15, I20- I20, I47-I49					
1007895	atenolool, 25mg	C07AB03	ATENOLOL-RATIOPHARM 25MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	I10-I13, I15-I15, I20- I20, I47-I49					
1007873	atenolool, 50mg	C07AB03	ATENOLOL-RATIOPHARM 50MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	I10-I13, I15-I15, I20- I20, I47-I49					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1190708	atomoksetiin, 10mg	N06BA09	STRATTERA, kõvakapsel, 28TK	Eli Lilly Holdings Limited	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20- aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19-aastastele lastele ja noorukitele aktiivsuse- ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügi- loa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1610536	atomoksetiin, 10mg	N06BA09	ATOMINEX 10MG, kõvakapsel, 56TK	Zentiva k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20- aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19-aastastele lastele ja noorukitele aktiivsuse ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1190742	atomoksetiin, 18mg	N06BA09	STRATTERA, kõvakapsel, 28TK	Eli Lilly Holdings Limited	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20- aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19-aastastele lastele ja noorukitele aktiivsuse- ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1610615	atomoksetiin, 18mg	N06BA09	ATOMINEX 18MG, kõvakapsel, 56TK	Zentiva k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19- aastastele lastele ja noorukitele aktiivsus- ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C- GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on vastunäidustatud,

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1190786	atomoksetiin, 25mg	N06BA09	STRATTERA, kõvakapsel, 28TK	Eli Lilly Holdings Limited	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20- aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19-aastastele lastele ja noorukitele aktiivsuse ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1610693	atomoksetiin, 25mg	N06BA09	ATOMINEX 25 MG, kõvakapsel, 56TK	Zentiva k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20- aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19-aastastele lastele ja noorukitele aktiivsuse ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1190821	atomoksetiin, 40mg	N06BA09	STRATTERA, kõvakapsel, 28TK	Eli Lilly Holdings Limited	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20- aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19-aastastele lastele ja noorukitele aktiivsuse ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1610772	atomoksetiin, 40mg	N06BA09	ATOMINEX 40 MG, kõvakapsel, 56TK	Zentiva k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19- aastastele lastele ja noorukitele aktiivsus- ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C- GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on vastunäidustatud,

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1190865	atomoksetiin, 60mg	N06BA09	STRATTERA, kõvakapsel, 28TK	Eli Lilly Holdings Limited	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19- aastastele lastele ja noorukitele aktiivsus- ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoterapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C- GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on vastunäidustatud,

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1610851	atomoksetiin, 60mg	N06BA09	ATOMINEX 60 MG, kõvakapsel, 56TK	Zentiva k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19- aastastele lastele ja noorukitele aktiivsus- ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C- GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on vastunäidustatud,

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul
1138047	atorvastatiin, 10mg	C10AA05	ATORIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					100	N18-N18					alates III staadiumist
					75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused	
1180213	atorvastatiin, 10mg	C10AA05	TORVACARD 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66						
					100	N18-N18					alates III staadiumist	
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel		
					50							
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l		
1253607	atorvastatiin, 10mg	C10AA05	ATORVASTATIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Actavis Group PTC ehf	75	E78-E78						kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					50							
					100	N18-N18				alates III staadiumist		
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66						
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel		

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused	
1397741	atorvastatiin, 10mg	C10AA05	TULIP 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66						
					75	I11-I12						raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel
					75	E78-E78						kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					50							
					100	N18-N18						alates III staadiumist
1410657	atorvastatiin, 10mg	C10AA05	ATORVASTATIN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50							
					75	E78-E78						kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					100	N18-N18						alates III staadiumist
					75	I11-I12						raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused	
1492185	atorvastatiin, 10mg	C10AA05	ATORVASTATIN MEDOCHEMIE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Medochemie Ltd.	75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66						
					75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
					100	N18-N18					alates III staadiumist	
					50							
1541911	atorvastatiin, 10mg	C10AA05	ATORVASTATIN TAD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	TAD Pharma GmbH	100	N18-N18						alates III staadiumist
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66						
					75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					50							

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1707892	atorvastatiin, 10mg	C10AA05	ATORVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare Limited	100	N18-N18					alates III staadiumist
					50						
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
1138058	atorvastatiin, 20mg	C10AA05	ATORIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					50						
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					100	N18-N18				alates III staadiumist	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1180235	atorvastatiin, 20mg	C10AA05	TORVACARD 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	100	N18-N18					alates III staadiumist
					50						
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
1253742	atorvastatiin, 20mg	C10AA05	ATORVASTATIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Actavis Group PTC ehf	75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					50						
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
					100	N18-N18				alates III staadiumist	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1397909	atorvastatiin, 20mg	C10AA05	TULIP 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					100	N18-N18				alates III staadiumist	
					50						
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
1397932	atorvastatiin, 20mg	C10AA05	TULIP 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
					100	N18-N18				alates III staadiumist	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1410792	atorvastatiin, 20mg	C10AA05	ATORVASTATIN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	100	N18-N18					alates III staadiumist
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					50						
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
1492679	atorvastatiin, 20mg	C10AA05	ATORVASTATIN MEDOCHEMIE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Medochemie Ltd.	75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					100	N18-N18				alates III staadiumist	
					50						
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1542057	atorvastatiin, 20mg	C10AA05	ATORVASTATIN TAD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	TAD Pharma GmbH	75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel
					50						
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					100	N18-N18				alates III staadiumist	
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
1708062	atorvastatiin, 20mg	C10AA05	ATORVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare Limited	75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					50						
					100	N18-N18				alates III staadiumist	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1220993	atorvastatiin, 40mg	C10AA05	ATORIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					50						
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
					75	E78-E78			kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l		
					100	N18-N18			alates III staadiumist		
1253887	atorvastatiin, 40mg	C10AA05	ATORVASTATIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Actavis Group PTC ehf	75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel
					100	N18-N18			alates III staadiumist		
					50						
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					75	E78-E78			kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l		

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1410927	atorvastatiin, 40mg	C10AA05	ATORVASTATIN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					50						
					100	N18-N18				alates III staadiumist	
1492826	atorvastatiin, 40mg	C10AA05	ATORVASTATIN MEDOCHEMIE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Medochemie Ltd.	50						
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					100	N18-N18				alates III staadiumist	
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1542192	atorvastatiin, 40mg	C10AA05	ATORVASTATIN TAD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	TAD Pharma GmbH	50						
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					100	N18-N18					alates III staadiumist
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
1708220	atorvastatiin, 40mg	C10AA05	ATORVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare Limited	50						
					100	N18-N18					alates III staadiumist
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1124996	atorvastatiin, 80mg	C10AA05	SORTIS 80 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	N18-N18					alates III staadiumist
					50						
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
1733767	atorvastatiin+perindopriil, 40mg+10mg	C10BX15	EUVASCOR, kõvakapsel, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13				kui samaaegselt on täidetud atorvastatiini kõrgema soodusmääraga (75% või 100%) väljakirjutamise tingimused	
1733677	atorvastatiin+perindopriil, 40mg+5mg	C10BX15	EUVASCOR, kõvakapsel, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13				kui samaaegselt on täidetud atorvastatiini kõrgema soodusmääraga (75% või 100%) väljakirjutamise tingimused	
1039250	atsetüülsüsteiin, 600mg	R05CB01	ACC LONG, kihisev tablett, 10TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50	J84-J84					
					100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1006625	atsikloviir, 30mg 1g	S01AD03	ZOVIRAX, silmasalv, 4.5g 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	50						
1165384	atsikloviir, 400mg	J05AB01	ACIC 400 MG, tablett, 35TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	Z94-Z94, T86-T86					
					50						
					100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater				
1738289	atsikloviir, 400mg	J05AB01	ACIC 400 MG, tablett, 35TK	Globalex Pharma OÜ	100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					50						
1000731	atsitreiin, 10mg	D05BB02	NEOTIGASON, kõvakapsel, 30TK	Actavis Group PTC ehf	75	L40-L40, M07-M07, L86-L86, Q80-Q80, Q82.8-Q82.8	Dermatoveneroloog, Pediaater				
					50						
1019483	batsitrasiin+neomütsiin, 250RÜ+5000RÜ 1g	D06AX80	BANEOCIN, salv, 20g 1TK	Sandoz GmbH	50						
1117640	beeta-1a-interferoon, 44mcg 0.5ml	L03AB07	REBIF, süstelahus süstlis, 0.5ml 12TK	Merck Europe B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks
1430671	beeta-1a-interferoon, 44mcg 0.5ml	L03AB07	REBIF, süstelahus kolbampullis, 1.5ml 4TK	Merck Europe B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks
1591286	beeta-1a-interferoon, 60mcg 1ml	L03AB07	AVONEX PEN, süstelahus pen-süstlis, 0.5ml 4TK	Biogen Netherlands B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks
1657953	beeta-1a-peginterferoon, 125mcg 0.5ml	L03AB13	PLEGRIDY, süstelahus, 0.5ml 2TK	Biogen Netherlands B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1657975	beeta-1a- peginterferoon, 63mcg/94mcg 0.5ml	L03AB13	PLEGRIDY, süstelahus, 1TK / 1TK	Biogen Netherlands B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks
1071245	beeta-1b-interferoon, 250mcg 1ml	L03AB08	BETAFERON, süstelahuse pulber ja lahusti, 15TK	Bayer AG	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks
1361393	beeta-1b-interferoon, 300mcg	L03AB08	EXTAVIA, süstelahuse pulber ja lahusti, 15TK	Novartis Europharm Limited	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks
1205435	beetaepoetiin, 10000RÜ 0.6ml	B03XA80	NEORECORMON, süstelahus süstlis, 0.6ml 6TK	Roche Registration GmbH	50						
					100	D63-D63, T86-T86	Nefroloog, Uroloog, Pediaater				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					100	D46-D46, D47.1- D47.1	Hematoloog				
1236912	beetahistiin, 16mg	N07CA01	BETAHISTINE ACTAVIS, tablett, 60TK	Actavis Group PTC ehf	50	H81-H81					
1480878	beetahistiin, 16mg	N07CA01	VERTIMED 16MG, tablett, 60TK	Medochemie Ltd.	50	H81-H81					
1115738	beetahistiin, 24mg	N07CA01	BETASERC, tablett, 50TK	BGP Products SIA	50	H81-H81					
1480957	beetahistiin, 24mg	N07CA01	VERTIMED 24MG, tablett, 50TK	Medochemie Ltd.	50	H81-H81					
1515833	beetahistiin, 24mg	N07CA01	BETAHISTINE ACTAVIS, tablett, 50TK	Actavis Group PTC ehf	50	H81-H81					
1620245	beetahistiin, 24mg	N07CA01	BETASERC, suus dispergeeruv tablett, 60TK	Mylan IRE Healthcare Ltd	50	H81-H81					
1004870	beetametasoon, 1mg 1g	D07AC01	BETNOVATE CREAM, kreem, 15g 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1007514	beetametasoon+fusidii nhape, 1mg+20mg 1g	D07CC80	FUCICORT, kreem, 15g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
1062403	beetametasoon+salitsü ülhape, 0,5mg+20mg 1g	D07BC80	DIPROSALIC, nahalahus, 50ml 1TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	50						
1034042	betaksolool, 2,5mg 1ml	S01ED02	BETOPTIC S, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	SIA "Novartis Baltics"	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1012194	bikalutamiid, 150mg	L02BB03	CASODEX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	AstraZeneca UK Limited	50						
					100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosest kastratsioonist)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1258017	bikalutamiid, 150mg	L02BB03	BICALUTAMIDE - TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosest kastratsioonist)
1266173	bikalutamiid, 150mg	L02BB03	BICALUTAMID ACTAVIS 150MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosest kastratsioonist)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1026560	bikalutamiid, 50mg	L02BB03	CASODEX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	AstraZeneca UK Limited	100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosest kastratsioonist)
					50						
1257803	bikalutamiid, 50mg	L02BB03	BICALUTAMIDE - TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	50	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosest kastratsioonist)
					100						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1265891	bikalutamiid, 50mg	L02BB03	BICALUTAMID ACTAVIS 50MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosset kastratsioonist)
1293791	bikalutamiid, 50mg	L02BB03	BICALUTAMIDE ACCORD 50MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare Limited	100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosset kastratsioonist)
					50						
1258983	bisoprolol, 10mg	C07AB07	BISOPROLOL VITABALANS, tablett, 30TK	VITABALANS OY	50						
					75	I10-I13, I15-I15, I20- I20, I47-I49					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1596427	bisoprolol, 10mg	C07AB07	SOBYCOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15, I20- I20, I47-I49					
					50						
1683952	bisoprolol, 10mg	C07AB07	BISOPROLOL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare Limited	75	I10-I13, I15-I15, I20- I20, I47-I49					
					50						
1683794	bisoprolol, 2,5mg	C07AB07	BISOPROLOL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare Limited	75	I10-I13, I15-I15, I20- I20, I47-I49					
					50						
1258905	bisoprolol, 5mg	C07AB07	BISOPROLOL VITABALANS, tablett, 30TK	VITABALANS OY	50						
					75	I10-I13, I15-I15, I20- I20, I47-I49					
1596326	bisoprolol, 5mg	C07AB07	SOBYCOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15, I20- I20, I47-I49					
					50						
1683873	bisoprolol, 5mg	C07AB07	BISOPROLOL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare Limited	50						
					75	I10-I13, I15-I15, I20- I20, I47-I49					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1586718	bosentaan, 125mg	C02KX01	BOSENTAN NORAMEDA 125 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	UAB Norameda	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Reumatoloog, Pediaater, Pulmonoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1628759	bosentaan, 125mg	C02KX01	BOSENTAN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Accord Healthcare Limited	50						
					100	I27.0-I27.0	Pediaater, Pulmonoloog, Reumatoloog, Kardioloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1586684	bosentaan, 62,5mg	C02KX01	BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	UAB Norameda	50						
					100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Reumatoloog, Pulmonoloog, Pediaater				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1612055	bosutiniib, 100mg	L01XE14	BOSULIF, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru bosutiniibravi foonil). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi bosutiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.07.2016. a.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1612077	bosutiniib, 500mg	L01XE14	BOSULIF, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru bosutiniibravi foonil). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi bosutiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.07.2016. a.
1042782	brinsolamiid, 10mg 1ml	S01EC04	AZOPT, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Novartis Europharm Limited	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1581230	brinsolamiid, 10mg 1ml	S01EC04	BRINZOLAMIDE ELVIM, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	SIA ELVIM	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1723047	brinsolamiid, 10mg 1ml	S01EC04	BRINZOLAMIDE SANDOZ, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1657694	brinsolamiid+brimonidii n, 10mg+2mg 1ml	S01EC80	SIMBRINZA, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Novartis Europharm Limited	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui monoteeraapia sh prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku ja beeta-adrenoblokaator on vastunäidustatud
					50						
1531459	bromofenak, 0,9mg 1ml	S01BC11	YELLOX, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o	50						
1008098	bromokriptiin, 2,5mg	G02CB01	BROMOCRIPTIN-RICHTER, tablett, 30TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					100	E24-E24, E22-E22	Endokrinoloog, Pediaater	esmane			
1057542	budesoniid, 0,1mg 1annust	R03BA02	PULMICORT TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 200annust 1TK	AstraZeneca AB	75	J45-J45					
					50						
1038316	budesoniid, 0,25mg 1ml	R03BA02	PULMICORT, nebuliseeritav suspensioon, 2ml 20TK	AstraZeneca AB	50						
					75	J45-J45					
1114827	budesoniid, 0,2mg 1annust	R03BA02	PULMICORT TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 100annust 1TK	AstraZeneca AB	50						
					75	J45-J45					
1124390	budesoniid, 200mcg	R03BA02	MIFLONIDE BREEZHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 60TK	Novartis Finland OY	75	J45-J45					
					50						
1174160	budesoniid, 200mcg 1annust	R03BA02	GIONA EASYHALER, inhalatsioonipulber, 200annust 1TK	Orion Corporation	50						
					75	J45-J45					
1124413	budesoniid, 400mcg	R03BA02	MIFLONIDE BREEZHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 60TK	Novartis Finland OY	75	J45-J45					
					50						
1174182	budesoniid, 400mcg 1annust	R03BA02	GIONA EASYHALER, inhalatsioonipulber, 100annust 1TK	Orion Corporation	75	J45-J45					
					50						
1011070	budesoniid, 50mcg 1annust	R01AD05	BUDESONID SANDOZ, ninasprei, suspensioon, 200annust 1TK	Sandoz GmbH	50						
					75	J30-J30				17,00	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1232660	bupropioon, 150mg	N06AX12	ELONTRIL, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 30TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50	F33-F33, F32-F32					
1232693	bupropioon, 300mg	N06AX12	ELONTRIL, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 30TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50	F33-F33, F32-F32					
1005006	busulfaan, 2mg	L01AB01	MYLERAN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Aspen Pharma Trading Limited	50						
					100	C00-D48	Pediaater, Onkoloog, Hematoloog				
1343382	dabigatraaneteksilaat, 110mg	B01AE07	PRADAXA, kõvakapsel, 10TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	S72.0-S72.2, S72.7- S72.7, M16-M17					kuni 30 päevaks
					50						
1343393	dabigatraaneteksilaat, 110mg	B01AE07	PRADAXA, kõvakapsel, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	I48-I48					
					75	S72.0-S72.2, S72.7- S72.7, M16-M17				kuni 30 päevaks	
					50						
1343405	dabigatraaneteksilaat, 110mg	B01AE07	PRADAXA, kõvakapsel, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	S72.0-S72.2, S72.7- S72.7, M16-M17					kuni 30 päevaks
					75	I48-I48					
					50						
1538759	dabigatraaneteksilaat, 150mg	B01AE07	PRADAXA, kõvakapsel, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	I48-I48					
					50						
1343359	dabigatraaneteksilaat, 75mg	B01AE07	PRADAXA, kõvakapsel, 10TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	S72.0-S72.2, S72.7- S72.7, M16-M17					kuni 30 päevaks
					50						
1343360	dabigatraaneteksilaat, 75mg	B01AE07	PRADAXA, kõvakapsel, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	S72.0-S72.2, S72.7- S72.7, M16-M17					kuni 30 päevaks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1624160	dabrafeniib, 75mg	L01XE23	TAFINLAR, kõvakapsel, 120TK	Novartis Europharm Limited	100	C43-C43	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) otsuse alusel BRAF V600 mutatsiooniga kaugelearenenud mitteresetseeritava või metastaatilise (IIIc-IV st) melanoomi raviks juhul, kui patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ning eelneva 3 ravikuu järel (ravi alustamisel) ja edaspidi 3-kuulise intervalliga hinnatuna püsib haigus vähemalt stabiilsena (KT- või/ja muu asjakohase uuringu alusel hinnatuna haiguse progressiooni ei esine). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi dabrafeniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.01.2016.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1598654	dapaglifloosin, 10mg	A10BK01	FORXIGA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	AstraZeneca AB	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						
1675694	dasabuviir, 250mg	J05AP09	EXVIERA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	B18.2-B18.2	Infektsionist, Gastroenteroloog				1. ja 4. genotüübi kroonilise progresseeruva C- viirushepatiidi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel esineb mõõdukas või raske maksafibroos (F2-4) ja kompenseeritud maksahaigus ning sõltumata maksafibroosi astmest patsientidele, kellel kaasvalt esineb krüoglobulineemia (D89.1), kaasasündinud verehaigus (D56-D57; D66-D68) või kellel on maksasiirik (Z94.4)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1275768	dasatiniib, 50mg	L01XE06	SPRYCEL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi(vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele,kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru dasatiniibravi foonil). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi dasatiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2009. a.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1713956	deferasiroks, 180mg	V03AC03	EXJADE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Novartis Europharm Limited	100	D57-D57, D47.1- D47.1, D56-D56, D60-D61, C81-C96, D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel järgmistele kriteeriumidele vastavate patsientide raviks: seerumi ferritiinitase on >1000 mcg/l; esineb jätkuv regulaarne vereülekannete vajadus (vähemasti 1 aasta jooksul on manustatud vähemasti 2 erütrotsüütide doosi kuu kohta ning sarnane vereülekannete vajadus püsib) või plaanitakse vereloome tüvirakkude siirdamist; müelodüsplastilise sündroomi või müelofibroosiga (D46, D47.1) patsientide riskiskoor on madal või madal-mõõdukas (IPSS 0-1)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1258646	deferasiroks, 250mg	V03AC03	EXJADE, dispergeeruv tablett, 28TK	Novartis Europharm Limited	100	D57-D57, D47.1- D47.1, D56-D56, D60-D61, C81-C96, D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel järgmistele kriteeriumidele vastavate patsientide raviks: seerumi ferritiinitase on >1000 mcg/l; esineb jätkuv regulaarne vereülekannete vajadus (vähemasti 1 aasta jooksul on manustatud vähemasti 2 erütrotsüütide doosi kuu kohta ning sarnane vereülekannete vajadus püsib) või plaanitakse vereloome tüvirakkude siirdamist; müelodüsplastilise sündroomi või müelofibroosiga (D46, D47.1) patsientide riskiskoor on madal või madal-mõõdukas (IPSS 0-1)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1713989	deferasiroks, 360mg	V03AC03	EXJADE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Novartis Europharm Limited	100	D57-D57, D47.1-D47.1, D56-D56, D60-D61, C81-C96, D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel järgmistele kriteeriumidele vastavate patsientide raviks: seerumi ferritiinitase on >1000 mcg/l; esineb jätkuv regulaarne vereülekannete vajadus (vähemasti 1 aasta jooksul on manustatud vähemasti 2 erütrotsüütide doosi kuu kohta ning sarnane vereülekannete vajadus püsib) või plaanitakse vereloome tüvirakkude siirdamist; müelodüsplastilise sündroomi või müelofibroosiga (D46, D47.1) patsientide riskiskoor on madal või madal-mõõdukas (IPSS 0-1)
1605574	degludek-insuliin, 100ühik 1ml	A10AE06	TRESIBA, süstelahus pensüstlis, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	100	E10-E10					
1605619	degludek-insuliin, 200ühik 1ml	A10AE06	TRESIBA, süstelahus pensüstlis, 3ml 3TK	Novo Nordisk A/S	100	E10-E10					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1014972	deksametasoon, 0,5mg	H02AB02	DEXAMETHASON KRKA, tablett, 10TK	KRKA d.d., Novo mesto	100	Z94-Z94, T86-T86					
					50						
					75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10- L10, L20-L20	Allergoloog- immunoloog, Pediaater, Dermatoveneroloog				
					100	C00-D48					
					100	E89.6-E89.6, E27- E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25	Endokrinoloog, Pediaater	esmane			
1647143	deksametasoon, 0,985mg 1g	S01BA01	DEXAGEL, silmageel, 5g 1TK	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.	50						
1007479	deksametasoon, 1mg 1ml	S01BA01	OFTAN DEXA, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Santen Oy	50						
1124288	deksametasoon, 1mg 1ml	S01BA01	MAXIDEX, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	SIA "Novartis Baltics"	50						
1671780	deksametasoon, 20mg	H02AB02	DEXAMETHASON KRKA, tablett, 20TK	Krka d.d. Novo Mesto	50						
					75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10- L10, L20-L20	Dermatoveneroloog, Pediaater, Allergoloog- immunoloog				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					100	C00-D48					
					100	E89.6-E89.6, E27- E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25	Endokrinoloog, Pediaater	esmane			
1671667	deksametasoon, 4mg	H02AB02	DEXAMETHASON KRKA, tablett, 20TK	Krka d.d. Novo Mesto	100	E89.6-E89.6, E27- E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25	Endokrinoloog, Pediaater	esmane			
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					100	C00-D48					
					75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10- L10, L20-L20	Dermatoveneroloog, Allergoloog- immunoloog, Pediaater				
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1008414	deksametasoon, 4mg 1ml	H02AB02	DEXAMETHASON KRKA, süstelahus, 1ml 25TK	KRKA d.d., Novo mesto	100	C00-D48					
					50						
1044379	deksametasoon+kloor amfenikool, 1mg+2mg 1g	S01CA82	OFTAN DEXA-CHLORA, silmasalv, 3.5g 1TK	Santen Oy	50						
1044368	deksametasoon+kloor amfenikool, 1mg+2mg 1ml	S01CA82	OFTAN DEXA-CHLORA, silmatilgad, lahus, 10ml 1TK	Santen Oy	50						
1124301	deksametasoon+neom ütsiin+polümüksiin B, 1mg+3500RÜ+6000R Ü 1ml	S01CA80	MAXITROL, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	SIA "Novartis Baltics"	50						
1150276	deksametasoon+tobra mütsiin, 1mg+3mg 1g	S01CA81	TOBRADEX, silmasalv, 3.5g 1TK	SIA "Novartis Baltics"	50						
1124266	deksametasoon+tobra mütsiin, 1mg+3mg 1ml	S01CA81	TOBRADEX, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	SIA "Novartis Baltics"	50						
1481857	denosumab, 60mg 1ml	M05BX04	PROLIA, süstelahus süstlis, 1ml 1TK	Amgen Europe B.V.	50						
					75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna ja kellel esineb kaasvalt raske neerupuudulikkus või söögituru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20)
1653937	desloratadiin, 0,5mg 1ml	R06AX27	DESLORATADINE SOPHARMA, suukaudne lahus, 120ml 1TK	Sopharma AD	50						
1550797	desloratadiin, 5mg	R06AX27	DASSELTA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1554140	desloratadiin, 5mg	R06AX27	DESLORATADINE ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1064348	desmopressiin, 10mcg 1annust	H01BA02	MINIRIN, ninasprei, lahus, 2.5ml 1TK	FERRING GmbH	50						
					100	E23.2-E23.2	Endokrinoloog, Pediaater	esmane			
1225594	desmopressiin, 120mcg	H01BA02	MINIRIN, suukaudne lüofilisaat, 30TK	FERRING GmbH	50						
					100	E23.2-E23.2	Pediaater, Endokrinoloog	esmane			
1225561	desmopressiin, 60mcg	H01BA02	MINIRIN, suukaudne lüofilisaat, 30TK	FERRING GmbH	100	E23.2-E23.2	Pediaater, Endokrinoloog	esmane			
					50						
1063303	desogestreel, 75mcg	G03AC09	CERAZETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1505450	desogestreel, 75mcg	G03AC09	DESIRETT 75 MCG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	UAB Exeltis Baltics	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1589519	desogestreel, 75mcg	G03AC09	CERAZETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	First Pharma OÜ	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1656143	desogestreel, 75mcg	G03AC09	DELAMONIE, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1062920	desogestreel+etüüülö stradiool, 0,15mg+0,02mg	G03AA09	NOVYNETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK	Gedeon Richter Plc.	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1062931	desogestreel+etüüülö stradiool, 0,15mg+0,03mg	G03AA09	REGULON, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK	Gedeon Richter Plc.	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1161458	desogestrel+etünnüülö stradiool, 25mcg+40mcg/125mc g+30mcg	G03AB05	GRACIAL, tablett, 21TK / 45TK	Aspen Pharma Trading Limited	50						
					75	Z30-Z30				sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral	
1208045	detemir-insuliin, 100ühik 1ml	A10AE05	LEVEMIR FLEXPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1007659	diasepaam, 10mg 2.5ml	N05BA01	DIAZEPAM DESITIN, rektaallahus, 5TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
1007682	diasepaam, 5mg 2.5ml	N05BA01	DIAZEPAM DESITIN, rektaallahus, 5TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
1385276	dienogest, 2mg	G03DB08	VISANNETTE, tablett, 28TK	Bayer AG	50						
1587146	dienogest+etünnüülöstr adiool, 0+0/2mg+0,03mg	G03AA16	SIBILLA PLUS, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK / 21TK	Gedeon Richter Plc.	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1066834	dienogest+etünnüülöstr adiool, 2mg+0,03mg	G03AA16	JEANINE, kaetud tablett, 21TK	Bayer AG	50						
					75	Z30-Z30				sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral	
1305818	dienogest+etünnüülöstr adiool, 2mg+0,03mg	G03AA16	AMMILY 2 MG / 0,03 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	UAB Orivas	50						
					75	Z30-Z30				sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral	
1070592	digoksiin, 0,25mg	C01AA05	DIGOXIN-GRINDEKS, tablett, 50TK	AS Grindeks	75	I50-I50					
					50						
1222209	digoksiin, 0,25mg	C01AA05	DIGOXIN NYCOMED 0,25 MG, tablett, 60TK	Takeda Pharma AS	50						
					75	I50-I50					
1222197	digoksiin, 62,5mcg	C01AA05	DIGOXIN NYCOMED 62,5 MCG, tablett, 60TK	Takeda Pharma AS	50						
					75	I50-I50					
1361786	dihüdrokodeiin, 60mg	N02AA08	DHC CONTINUS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 10TK	MUNDIPHARMA Gesellschaft m.b.H.	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1016109	diklofenak, 100mg	M01AB05	DICLOBERL RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						
					100	C00-D48					
					75	M15-M19			63,00		
1017133	diklofenak, 100mg	M01AB05	DICLOFENAC-RATIOPHARM 100 MG, rektaalsuposiit, 10TK	ratiopharm GmbH	75	M15-M19				63,00	
					50						
					100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
1032589	diklofenak, 100mg	M01AB05	DICLOMELAN RETARD 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	75	M15-M19				63,00	
					100	C00-D48					
					50						
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
1039632	diklofenak, 100mg	M01AB05	OLFEN DEPOCAPS, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 20TK	Teva B.V.	100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		
					50						
1078163	diklofenak, 100mg	M01AB05	DICLAC 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	M15-M19				63,00	
					100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						
1594425	diklofenak, 100mg	M01AB05	NAKLOFEN SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	100	C00-D48					
					50						
					75	M15-M19			63,00		
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1594436	diklofenak, 100mg	M01AB05	NAKLOFEN SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46					
					50						
1071920	diklofenak, 150mg	M01AB05	DICLAC ID 150 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 20TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					100	C00-D48					
					75	M15-M19		63,00			
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46					
1071942	diklofenak, 150mg	M01AB05	DICLAC ID 150 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 100TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
					50						
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46					
1072279	diklofenak, 150mg	M01AB05	DICLOFENAC-RATIOPHARM UNO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 20TK	ratiopharm GmbH	75	M30-M35, M05- M08, M45-M46					
					50						
					75	M15-M19		63,00			
					100	C00-D48					
1072280	diklofenak, 150mg	M01AB05	DICLOFENAC-RATIOPHARM UNO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 50TK	ratiopharm GmbH	100	C00-D48					
					75	M15-M19		63,00			
					50						
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46					
1032590	diklofenak, 50mg	M01AB05	DICLOMELAN 50 MG, gastroresistentne tablett, 10TK	G.L. Pharma GmbH	50						
					100	C00-D48					
					75	M15-M19		63,00			
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1072213	diklofenak, 50mg	M01AB05	DICLOFENAC-RATIOPHARM 50MG, gastroresistentne tablett, 50TK	ratiopharm GmbH	75	M15-M19			63,00		
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46					
					50						
					100	C00-D48					
1012048	diklofenak, 75mg	M01AB05	OLFEN DEPOTABS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva B.V.	50						
					100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46					
					75	M15-M19		63,00			
1071986	diklofenak, 75mg	M01AB05	DICLAC ID 75 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 100TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46					
					75	M15-M19		63,00			
					50						
1614372	diklofenak+omeprasool , 75mg+20mg	M01AB82	DICLOPRAM, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o	50						
1031634	diltiaseem, 180mg	C08DB01	DILTIAZEM LANNACHER, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	100	I27.0-I27.0					
					50						
					75	I47-I49	Pediaater, Kardioloog	esmane			
1031645	diltiaseem, 90mg	C08DB01	DILTIAZEM LANNACHER, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK	G.L. Pharma GmbH	75	I47-I49	Kardioloog, Pediaater	esmane			
					50						
					100	I27.0-I27.0					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1638693	dimetüülfumaraat, 120mg	L04AX07	TECFIDERA, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK	Biogen Netherlands B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks patsientidele, kellele beetainterferoon või glatirameeratsetaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks või talumatuks
1638705	dimetüülfumaraat, 240mg	L04AX07	TECFIDERA, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK	Biogen Netherlands B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks patsientidele, kellele beetainterferoon või glatirameeratsetaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks või talumatuks
1028214	doksasosiin, 2mg	C02CA04	CARDURA, tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1071391	doksasosiin, 2mg	C02CA04	KAMIREN, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
1028225	doksasosiin, 4mg	C02CA04	CARDURA, tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1071379	doksasosiin, 4mg	C02CA04	KAMIREN, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1129799	doksasosiin, 4mg	C02CA04	CARDURA XL 4MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1205895	doksasosiin, 4mg	C02CA04	DOXALFA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	STADA Arzneimittel AG	50						
1018303	doksütsükliin, 100mg	J01AA02	DOXYCYCLIN STADA, tablett, 10TK	STADA Arzneimittel AG	50						
					100	A50-A53	Dermatoveneroloog				
1065877	doksütsükliin, 100mg	J01AA02	DOXYCYCLINE VITABALANS, tablett, 10TK	VITABALANS OY	100	A50-A53	Dermatoveneroloog				
					50						
1065899	doksütsükliin, 100mg	J01AA02	DOXYLAN, tablett, 10TK	G.L. Pharma GmbH	100	A50-A53	Dermatoveneroloog				
					50						
1144976	doksütsükliin, 100mg	J01AA02	DOXY-M-RATIOPHARM 100 MG, tablett, 10TK	ratiopharm GmbH	50						
					100	A50-A53	Dermatoveneroloog				
1240366	domperidoon, 10mg	A03FA03	DOMPERIDON ACTAVIS, tablett, 30TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1324662	domperidoon, 10mg	A03FA03	OROPERIDYS 10 MG, suus dispergeeruv tablett, 30TK	Pierre Fabre Medicament	50						
1292206	donepesiil, 10mg	N06DA02	DONEPEZIL ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1313053	donepesiil, 10mg	N06DA02	DONEPEZIL ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Orion Corporation	50						
1391217	donepesiil, 10mg	N06DA02	DONEPEZIL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare Limited	50						
1453924	donepesiil, 10mg	N06DA02	YASNAL Q-TAB, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Krka, d.d., Novo mesto	50						
1481240	donepesiil, 10mg	N06DA02	DIVARE 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
1292105	donepesiil, 5mg	N06DA02	DONEPEZIL ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1391116	donepesiil, 5mg	N06DA02	DONEPEZIL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare Limited	50						
1453823	donepesiil, 5mg	N06DA02	YASNAL Q-TAB, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Krka, d.d., Novo mesto	50						
1481105	donepesiil, 5mg	N06DA02	DIVARE 5MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
1014961	dorsolamiid, 2%	S01EC03	TRUSOPT, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Santen Oy	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1420108	dorsolamiid, 20mg 1ml	S01EC03	DORZOLAMIDE ELVIM, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	SIA ELVIM	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1454093	dronedaroon, 400mg	C01BD07	MULTAQ, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	sanofi-aventis groupe	50		Kardioloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus kardioloogil siinusrütmi säilitamiseks kodade virvendusarütmia puhul pärast kardioversiooni, kui teised antiarütmikumid on ebasobivad (IC klassi antiarütmikumid ja sotalool on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning amiodaroon on vastunäidustatud) ning patsiendil ei esine südamepuudulikkust ega vasaku vatsakese düsfunksiooni
1316090	drosipirenoon+etünüülö stradiool, 0+0/3mg+0,02mg	G03AA12	YAZ, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK / 24TK	Bayer AG	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1331378	drospirenoon+etünüülö stradiool, 0+0/3mg+0,02mg	G03AA12	MARIONELLE, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK / 21TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1453766	drospirenoon+etünüülö stradiool, 0+0/3mg+0,02mg	G03AA12	DAYLETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK / 24TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1220487	drospirenoon+etünüülö stradiool, 3mg+0,02mg	G03AA12	YASMINELLE, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Bayer AG	50						
1330759	drospirenoon+etünüülö stradiool, 3mg+0,02mg	G03AA12	MADELEINE, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1331019	drospirenoon+etünüülö stradiool, 3mg+0,02mg	G03AA12	JANGEE 0,02 MG/3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	UAB Exeltis Baltics	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1043536	drospirenoon+etünüülö stradiool, 3mg+0,03mg	G03AA12	YARINA, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Bayer AG	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1331053	drospirenoon+etünüülö stradiool, 3mg+0,03mg	G03AA12	JANGEE 0,03 MG/3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	UAB Exeltis Baltics	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1331222	drospirenoon+etünüülö stradiool, 3mg+0,03mg	G03AA12	MADELEINE, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1400870	drospirenoon+etünüülö stradiool, 3mg+0,03mg	G03AA12	MIDIANA, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Gedeon Richter Plc.	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1165711	drospirenoon+östradio ol, 2mg+1mg	G03FA17	ANGELIQ, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Bayer AG	50						
1670745	dulaglutiid, 1,5mg 0.5ml	A10BJ05	TRULICITY, süstelahus pen- süstlis, 0.5ml 4TK	Eli Lilly Nederland B.V.	50	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud
					75	E14-E14, E11-E11				II tüüpi diabeedi raviks rasvumusega patsientidel (KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes talutavates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud	
1195624	duloksetiin, 30mg	N06AX21	CYMBALTA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Eli Lilly Nederland B.V.	50						
1660643	duloksetiin, 30mg	N06AX21	DULSEVIA, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Krka, d.d., Novo mesto	50						
1660834	duloksetiin, 30mg	N06AX21	DULOXETINE TEVA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Teva B.V.	50						
1661677	duloksetiin, 30mg	N06AX21	DULOXETINE ACCORD, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Accord Healthcare Limited	50						
1661701	duloksetiin, 30mg	N06AX21	DULOXGAMMA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1670419	duloksetiin, 30mg	N06AX21	ONELAR, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Medochemie Ltd.	50						
1694921	duloksetiin, 30mg	N06AX21	DULOXETINE ZENTIVA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Zentiva k.s.	50						
1699117	duloksetiin, 30mg	N06AX21	DULOXETINE SANDOZ, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Sandoz d.d.	50						
1195635	duloksetiin, 60mg	N06AX21	CYMBALTA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Eli Lilly Nederland B.V.	50						
					75	G63.2-G63.2	Endokrinoloog, Neuroloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1660733	duloksetiin, 60mg	N06AX21	DULSEVIA, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Krka, d.d., Novo mesto	75	G63.2-G63.2	Neuroloog, Endokrinoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
1661015	duloksetiin, 60mg	N06AX21	DULOXETINE TEVA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Teva B.V.	75	G63.2-G63.2	Neuroloog, Endokrinoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1661699	duloksetiin, 60mg	N06AX21	DULOXETINE ACCORD, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Accord Healthcare Limited	75	G63.2-G63.2	Neuroloog, Endokrinoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					75	G63.2-G63.2	Neuroloog, Endokrinoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1661745	duloksetiin, 60mg	N06AX21	DULOXGAMMA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	50						
					75	G63.2-G63.2	Neuroloog, Endokrinoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
1670510	duloksetiin, 60mg	N06AX21	ONELAR, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Medochemie Ltd.	75	G63.2-G63.2	Neuroloog, Endokrinoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1694954	duloksetiin, 60mg	N06AX21	DULOXETINE ZENTIVA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Zentiva k.s.	75	G63.2-G63.2	Neuroloog, Endokrinoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
1699140	duloksetiin, 60mg	N06AX21	DULOXETINE SANDOZ, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Sandoz d.d.	75	G63.2-G63.2	Endokrinoloog, Neuroloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
1155440	dutasteriid, 0,5mg	G04CB02	AVODART, pehmekapsel, 30TK	GlaxoSmithKline Eesti OÜ	50						
1539929	dutasteriid, 0,5mg	G04CB02	DUTASTERIDE TEVA, pehmekapsel, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1707241	dutasteriid, 0,5mg	G04CB02	DUTRYS, pehmekapsel, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
1054752	düdrogesteron, 10mg	G03DB01	DUPHASTON, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	BGP Products SIA	100	E89.4-E89.4, E28.3- E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Günekoloog, Endokrinoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
					50						
1013803	düdrogesteron+östra diol, 0+1mg/10mg+1mg	G03FB08	FEMOSTON, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK / 14TK	BGP Products SIA	50						
					100	E89.4-E89.4, E28.3- E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Günekoloog, Endokrinoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
1375332	düdrogesteron+östra diol, 2,5mg+0,5mg	G03FA14	FEMOSTON CONTI 0,5 MG/2,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Mylan Healthcare GmbH	100	E89.4-E89.4, E28.3- E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Günekoloog, Endokrinoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
					50						
1082528	düdrogesteron+östra diol, 5mg+1mg	G03FA14	FEMOSTON CONTI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	BGP Products SIA	100	E89.4-E89.4, E28.3- E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Günekoloog, Endokrinoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
					50						
1077937	ebastiin, 20mg	R06AX22	KESTINE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Almirall S.A	50						
1020373	ekonasool, 150mg	G01AF05	GYNO-PEVARYL, vaginaalsuposiit, 3TK	Johnson & Johnson UAB	50						
1039036	ekonasool, 50mg	G01AF05	GYNO-PEVARYL, vaginaalsuposiit, 15TK	Johnson & Johnson UAB	50						
1011148	eksemestaan, 25mg	L02BG06	AROMASIN, kaetud tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
					100	C50-C50	Günekoloog, Üldkirurg, Onkoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
1392780	eksemestaan, 25mg	L02BG06	ESCEPRAN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Krka d.d. Novo Mesto	50						
					100	C50-C50	Günekoloog, Üldkirurg, Onkoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1392960	eksemestaan, 25mg	L02BG06	EXEMESTANE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare Limited	50						
					100	C50-C50	Üldkirurg, Günekoloog, Onkoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
1395772	eksemestaan, 25mg	L02BG06	EXEMESTANE TEVA 25MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	100	C50-C50	Onkoloog, Üldkirurg, Günekoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
					50						
1423134	eksemestaan, 25mg	L02BG06	EXEMESTANE ALVOGEN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Alvogen IPCo S.ar.l.	50						
					100	C50-C50	Günekoloog, Onkoloog, Üldkirurg				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
1453632	eksemestaan, 25mg	L02BG06	EXEMESTANE SANOSWISS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	UAB SanoSwiss	50						
					100	C50-C50	Günekoloog, Üldkirurg, Onkoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
1533787	eksenatiid, 2mg	A10BJ01	BYDUREON, toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti pen-süstlis, 4TK	AstraZeneca AB	50	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud
					75	E14-E14, E11-E11				II tüüpi diabeedi raviks rasvumusega patsientidel (KMI>=35kg/m ²), kellel suukaudsed diabeediravid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes taluvates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1725870	elbasviir+grasopreviir, 50mg+100mg	J05AP54	ZEPATIER, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	100	B18.2-B18.2	Gastroenteroloog, Infektsionist				1. ja 4. genotüübi kroonilise progresseeruva C- viirushepatiidi raviks patsientidele, kellel esineb mõõdukas või raske maksafibroos (F2-4) ja kompenseeritud maksahaigus ning sõltumata maksafibroosi astmest patsientidele, kellel kaasuvalt esineb krüoglobulineemia (D89.1), kaasasündinud verehaigus (D56-D57; D66-D68) või kellel on maksasiirik (Z94.4)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1462003	eltrombopaag, 25mg	B02BX05	REVOLADE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novartis Europharm Limited	100	D69.4-D69.4					patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektoomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh splenektoomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20 000/µl

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1649000	empaglifloosin, 10mg	A10BK03	JARDIANCE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
1649134	empaglifloosin, 25mg	A10BK03	JARDIANCE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	E14-E14, E11-E11				II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud	
1010620	enalapriil, 10mg	C09AA02	ENAHEXAL 10 MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1013599	enalapriil, 10mg	C09AA02	BERLIPRIL 10 MG, tablett, 30TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1133929	enalapriil, 10mg	C09AA02	ENAP, tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1359974	enalapriil, 10mg	C09AA02	ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 30TK	VITABALANS OY	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1010631	enalapriil, 20mg	C09AA02	ENAHEXAL 20 MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1013601	enalapriil, 20mg	C09AA02	BERLIPRIL 20 MG, tablett, 30TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1087512	enalapriil, 20mg	C09AA02	EDNYT, tablett, 30TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1133952	enalapriil, 20mg	C09AA02	ENAP, tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1360033	enalapriil, 20mg	C09AA02	ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 30TK	VITABALANS OY	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1074080	enalapriil, 5mg	C09AA02	BERLIPRIL 5 MG, tablett, 50TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1087499	enalapriil, 5mg	C09AA02	EDNYT, tablett, 30TK	Gedeon Richter Plc.	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1133895	enalapriil, 5mg	C09AA02	ENAP, tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1359918	enalapriil, 5mg	C09AA02	ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 30TK	VITABALANS OY	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1147564	enalapriil+hüdrokloroti asiid, 10mg+12,5mg	C09BA02	ENAP-HL, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1147575	enalapriil+hüdrokloroti asiid, 10mg+12,5mg	C09BA02	ENAP-HL, tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1147597	enalapriil+hüdrokloroti asiid, 10mg+25mg	C09BA02	ENAP-H, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1147609	enalapriil+hüdrokloroti asiid, 10mg+25mg	C09BA02	ENAP-H, tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1074888	enalapriil+hüdrokloroti asiid, 20mg+12,5mg	C09BA02	CO-RENITEC, tablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1129159	enalapriil+hüdrokloroti asiid, 20mg+12,5mg	C09BA02	ENAHEXAL COMP 20 MG/12,5 MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1151389	enalapriil+hüdrokloroti asiid, 20mg+12,5mg	C09BA02	ENAP-HL, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1615700	enalapriil+hüdrokloroti asiid, 20mg+12,5mg	C09BA02	CO-RENITEC, tablett, 28TK	First Pharma OÜ	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1074901	enalapriil+hüdrokloroti asiid, 20mg+6mg	C09BA02	RENITEC PLUS, tablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1619175	ensalutamiid, 40mg	L02BB04	XTANDI, pehmekapsel, 112TK	Astellas Pharma Europe B.V.	100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				metastaseerunud kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks heas üldseisundis (ECOG 0-1 või valusündroomist tingitud ECOG 2) patsientidele, kelle haigus on eelneva dotsetakseeli sisaldava kemoteraapia vältel või pärast seda progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda ravi abiraterooniga.
1247509	entekaviir, 0,5mg	J05AF10	BARACLUDGE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	100	B18.0-B18.1	Gastroenteroloog, Infektsionist				kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks juhul, kui peginterferoon alfa-2a on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud või talumatu
1247510	entekaviir, 1mg	J05AF10	BARACLUDGE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	100	B18.0-B18.1	Gastroenteroloog, Infektsionist				kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks juhul, kui peginterferoon alfa-2a on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud või talumatu
1588844	epinefriin (adrenaliin), 150mcg 0.3ml	C01CA24	EPIPEN, süstelahus pen- süstlis, 2ml 1TK	SIA Meda Pharma	100	T88.6-T88.6, T78.0- T78.0, T88.2-T88.2, T80.5-T80.6, T78.2- T78.3, L50.0-L50.0					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1588866	epinefriin (adrenaliin), 300mcg 0.3ml	C01CA24	EPIPEN, süstelahus pen- süstlis, 2ml 1TK	SIA Meda Pharma	100	T88.6-T88.6, T78.0- T78.0, T88.2-T88.2, T80.5-T80.6, T78.2- T78.3, L50.0-L50.0					
7004911	eritoitesegu,		Lipistart , suukaudse lahuse pulber, 400 g	Vitafllo	100	E71.3-E71.3					ravimi väljakirjutamise õigus pika ahelaga rasvhapete beetaoksüdatsiooni defektide korral
7017667	eritoitesegu,		COMIDA PKU C Formula, pulber, 500g N1	UAB Pharm House	100	E70.0-E70.1					
					50						
7017645	eritoitesegu,		Neocate Syneo, pulber, 400g N4	Nutricia	75	K52.2-K52.2, L20.8- L20.8, K90.4-K90.4, L27.2-L27.2				1,00	
7004955	eritoitesegu,		MONOGEN, pulber, 400g	Nutricia Ltd	100	E71.3-E71.3					ravimi väljakirjutamise õigus pika ahelaga rasvhapete beeta- oksüdatsiooni defektide korral
7017656	eritoitesegu,		COMIDA PKU C Formula Orange, pulber, 500g N1	UAB Pharm House	50						
					100	E70.0-E70.1					
1767483	ertuglifloosin, 5mg	A10BK04	STEGLATRO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumisega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1422335	esetimiib, 10mg	C10AX09	EZOLETA, tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	100	N18-N18					alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					75	I11-I12				raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust	
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66				kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1681174	esetimiib, 10mg	C10AX09	EZETIMIBE ACCORD, tablett, 28TK	Accord Healthcare Limited	50						
					75	I11-I12					raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					100	N18-N18					alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
1087949	esomeprasool, 20mg	A02BC05	NEXIUM, gastroresistentne tablett, 14TK	AstraZeneca AB	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1087950	esomeprasool, 20mg	A02BC05	NEXIUM, gastroresistentne tablett, 28TK	AstraZeneca AB	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1337891	esomeprasool, 20mg	A02BC05	NEXMEZOL 20 MG, gastroresistentne tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1395985	esomeprasool, 20mg	A02BC05	ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1396009	esomeprasool, 20mg	A02BC05	ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1396032	esomeprasool, 20mg	A02BC05	ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1542338	esomeprasool, 20mg	A02BC05	ESOMEPRAZOLE ACTAVIS, gastroresistentne tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1087972	esomeprasool, 40mg	A02BC05	NEXIUM, gastroresistentne tablett, 14TK	AstraZeneca AB	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1087983	esomeprasool, 40mg	A02BC05	NEXIUM, gastroresistentne tablett, 28TK	AstraZeneca AB	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1337981	esomeprasool, 40mg	A02BC05	NEXMEZOL 40 MG, gastroresistentne tablett, 14TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1338005	esomeprasool, 40mg	A02BC05	NEXMEZOL 40 MG, gastroresistentne tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1396098	esomeprasool, 40mg	A02BC05	ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1396111	esomeprasool, 40mg	A02BC05	ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1542462	esomeprasool, 40mg	A02BC05	ESOMEPRAZOLE ACTAVIS, gastroresistentne tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1325023	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	ESCITALOPRAM ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2- F32.3	Psühhiaater	esmane			
1331648	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	ESCITALOPRAM TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	100	F33.2-F33.3, F32.2- F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1336676	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	ESLOREX 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2- F32.3	Psühhiaater	esmane			
1336687	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	ESLOREX 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Zentiva k.s.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2- F32.3	Psühhiaater	esmane			
1400218	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	ELICEA 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2- F32.3	Psühhiaater	esmane			
1484018	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	CIRASET 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	F33.2-F33.3, F32.2- F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1488540	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	ESCITALOPRAM ACCORD 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare Limited	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2- F32.3	Psühhiaater	esmane			
1543137	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	ESTAN, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Medochemie Ltd.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2- F32.3	Psühhiaater	esmane			
1559987	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	ELICEA Q-TAB 10MG, suus dispergeeruv tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	100	F33.2-F33.3, F32.2- F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1325225	estsitalopraam, 20mg	N06AB10	ESCITALOPRAM ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1331907	estsitalopraam, 20mg	N06AB10	ESCITALOPRAM TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1400320	estsitalopraam, 20mg	N06AB10	ELICEA 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1488595	estsitalopraam, 20mg	N06AB10	ESCITALOPRAM ACCORD 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare Limited	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1560046	estsitalopraam, 20mg	N06AB10	ELICEA Q-TAB 20MG, suus disperseeruv tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1589171	etonogestreel, 68mg	G03AC08	NEXPLANON, implantaat, 1TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	50						
1138621	etonogestreel+etünüül östradiol, 120mcg+15mcg 24h	G02BB01	NUVARING, vaginaalravivahend, 1TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	50						
1712584	etonogestreel+etünüül östradiol, 120mcg+15mcg 24h	G02BB01	SETLONA, vaginaalravivahend, 1TK	Mylan S.A.S	50						
1036213	etoposiid, 100mg	L01CB01	VEPESID, pehmekapsel, 10TK	Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedelmi Kft.	100	C00-D48	Onkoloog, Hematoloog				
					50						
1085352	etorikoksiib, 120mg	M01AH05	ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
1127843	etorikoksiib, 120mg	M01AH05	ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
1623260	etorikoksiib, 120mg	M01AH05	COXITOR, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1653241	etorikoksiib, 120mg	M01AH05	ETORICOXIB ZENTIVA 120 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK	Zentiva k.s.	50						
1653252	etorikoksiib, 120mg	M01AH05	ETORICOXIB ZENTIVA 120 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Zentiva k.s.	50						
1658358	etorikoksiib, 120mg	M01AH05	ETORICOXIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK	Teva B.V.	50						
1658369	etorikoksiib, 120mg	M01AH05	ETORICOXIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Teva B.V.	50						
1659809	etorikoksiib, 120mg	M01AH05	OXIDRAXIB, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.	50						
1699577	etorikoksiib, 120mg	M01AH05	ETOXIB, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK	Krka d.d. Novo Mesto	50						
1699588	etorikoksiib, 120mg	M01AH05	ETOXIB, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Krka d.d. Novo Mesto	50						
1248421	etorikoksiib, 30mg	M01AH05	ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
1085318	etorikoksiib, 60mg	M01AH05	ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
1622944	etorikoksiib, 60mg	M01AH05	COXITOR, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1652824	etorikoksiib, 60mg	M01AH05	ETORICOXIB ZENTIVA 60 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Zentiva k.s.	50						
1658189	etorikoksiib, 60mg	M01AH05	ETORICOXIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Teva B.V.	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1659540	etorikoksiib, 60mg	M01AH05	OXIDRAXIB, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.	50						
1699342	etorikoksiib, 60mg	M01AH05	ETOXIB, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Krka d.d. Novo Mesto	50						
1085330	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
1127854	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
1623103	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	COXITOR, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1653173	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	ETORICOXIB ZENTIVA 90 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK	Zentiva k.s.	50						
1653184	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	ETORICOXIB ZENTIVA 90 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Zentiva k.s.	50						
1658268	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	ETORICOXIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK	Teva B.V.	50						
1658279	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	ETORICOXIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Teva B.V.	50						
1659674	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	OXIDRAXIB, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.	50						
1699454	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	ETOXIB, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK	Krka d.d. Novo Mesto	50						
1699465	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	ETOXIB, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Krka d.d. Novo Mesto	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1433315	everoliimus, 10mg	L01XE10	AFINITOR, tablett, 30TK	Novartis Europharm Limited	100	C78-C78, C25-C25, C34-C34, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamise näidustatus everoliimusega on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud kõrgelt diferentseerunud (täielikult) mitteresetseeritav progresseeruva kuluga seedetraktist, kopsust või pankreasest lähtunud neuroendokriinne kasvaja ning süsteemne keemiaravi ja/või ravi somatostatiini analoogiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1739842	everoliimus, 10mg	L01XE10	EVEROLIMUS KRKA, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	100	C78-C78, C25-C25, C34-C34, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kelle ravi alustamise näidustatus everoliimusega on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud kõrgelt diferentseerunud (täielikult) mitteresetseeritav progresseeruva kuluga seedetraktist, kopsust või pankreasest lähtunud neuroendokriinne kasvaja ning süsteemne keemiaravi ja/või ravi somatostatiini analoogiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1433281	everoliimus, 5mg	L01XE10	AFINITOR, tablett, 30TK	Novartis Europharm Limited	100	C78-C78, C25-C25, C34-C34, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamise näidustatus everoliimusega on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud kõrgelt diferentseerunud (täielikult) mitteresetseeritav progresseeruva kuluga seedetraktist, kopsust või pankreasest lähtunud neuroendokriinne kasvaja ning süsteemne keemiaravi ja/või ravi somatostatiini analoogiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1739819	everoliimus, 5mg	L01XE10	EVEROLIMUS KRKA, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	100	C78-C78, C25-C25, C34-C34, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kelle ravi alustamise näidustatus everoliimusega on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud kõrgelt diferentseerunud (täielikult) mitteresetseeritav progresseeruva kuluga seedetraktist, kopsust või pankreasest lähtunud neuroendokriinne kasvaja ning süsteemne keemiaravi ja/või ravi somatostatiini analoogiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks
1680410	faktor VIII inhibiitorist mõõdamineva aktiivsusega hüübimisfaktorid, 25ühik 1ml	B02BD03	FEIBA 25 Ü/ML, infusioonilahuse pulber ja lahusti, 20ml 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	D68.4-D68.4, D66-D66	Pediaater, Hematoloog				
1680421	faktor VIII inhibiitorist mõõdamineva aktiivsusega hüübimisfaktorid, 50ühik 1ml	B02BD03	FEIBA 50 Ü/ML, infusioonilahuse pulber ja lahusti, 20ml 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	D68.4-D68.4, D66-D66	Pediaater, Hematoloog				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1349300	febuksostaat, 120mg	M04AA03	ADENURIC, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)
					50						
1349287	febuksostaat, 80mg	M04AA03	ADENURIC, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)
					50						
1012330	felodipiin, 10mg	C08CA02	PRESID, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1019708	felodipiin, 10mg	C08CA02	PLENDIL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	AstraZeneca AB	50	I10-I13, I15-I15					
					75						
1174474	felodipiin, 10mg	C08CA02	FELODIPIN HEXAL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	HEXAL AG	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1012318	felodipiin, 2,5mg	C08CA02	PRESID, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva B.V.	50	I10-I13, I15-I15					
					75						
1012329	felodipiin, 5mg	C08CA02	PRESID, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1019696	felodipiin, 5mg	C08CA02	PLENDIL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	AstraZeneca AB	75	I10-I13, I15-I15					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1174373	felodipiin, 5mg	C08CA02	FELODIPIN HEXAL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	HEXAL AG	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1029495	fenobarbitaal, 100mg	N03AA02	PHENAEMAL, tablett, 50TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
1026593	fenofibraat, 200mg	C10AB05	LIPANTHYL, kõvakapsel, 30TK	BGP Products SIA	50						
1020340	fenoksümetüülpenitsillii n, 1000000RÜ	J01CE02	OSPEN, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK	Sandoz GmbH	50						
					75	H66-H66, J13-J15				16,00	
1106536	fenoksümetüülpenitsillii n, 1000000RÜ	J01CE02	VEPICOMBIN NOVUM 1 000 000 RÜ, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Takeda Pharma AS	75	H66-H66, J13-J15					16,00
					50						
1105951	fenoksümetüülpenitsillii n, 400000RÜ 5ml	J01CE02	OSPEN, suukaudne suspensioon, 60ml 1TK	Sandoz GmbH	50						
					75	H66-H66, J13-J15				16,00	
1044223	fenoterool, 100mcg 1annust	R03AC04	BEROTEC N, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annust 1TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
					50						
					75	J45-J45					
1009651	fenoterool+ipratroopiu mbromiid, 50mcg+20mcg 1annust	R03AL01	BERODUAL N, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annust 1TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					50						
					75	J45-J45					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1346958	fentanüül, 100mcg	N02AB03	EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK	Teva B.V.	100	C00-D48	Onkoloog, Anestesioloog, Reumatoloog, Neuroloog, Hematoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1400948	fentanüül, 100mcg	N02AB03	LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	C00-D48	Anestesioloog, Reumatoloog, Hematoloog, Neuroloog, Onkoloog	esmane			<p>ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalentsust) annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu</p>

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1223165	fentanüül, 100mcg 1h	N02AB03	MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK	Takeda Pharma AS	100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist
					100	R52.1-R52.1	Anestesioloog, Neuroloog, Reumatoloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1223121	fentanüül, 12mcg 1h	N02AB03	MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK	Takeda Pharma AS	50						
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist
					100	R52.1-R52.1	Neuroloog, Anestesioloog, Reumatoloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1346970	fentanüül, 200mcg	N02AB03	EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK	Teva B.V.	100	C00-D48	Hematoloog, Neuroloog, Anestesioloog, Reumatoloog, Onkoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvialgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1400959	fentanüül, 200mcg	N02AB03	LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK	Gedeon Richter Plc.	100	C00-D48	Reumatoloog, Onkoloog, Anestesioloog, Hematoloog, Neuroloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1514034	fentanüül, 200mcg	N02AB03	BREAKYL, bukaalravimküle, 10TK	Meda Pharma GmbH & Co. KG	100	C00-D48	Onkoloog, Anestesioloog, Neuroloog, Reumatoloog, Hematoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1223132	fentanüül, 25mcg 1h	N02AB03	MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK	Takeda Pharma AS	50						
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist
					100	R52.1-R52.1	Anestesioloog, Reumatoloog, Neuroloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1400960	fentanüül, 300mcg	N02AB03	LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK	Gedeon Richter Plc.	100	C00-D48	Reumatoloog, Anestesioloog, Onkoloog, Neuroloog, Hematoloog	esmane			<p>ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalentsust) annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu</p>
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1346992	fentanüül, 400mcg	N02AB03	EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					100	C00-D48	Neuroloog, Onkoloog, Anestesioloog, Reumatoloog, Hematoloog	esmane			<p>ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu</p>

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1400971	fentanüül, 400mcg	N02AB03	LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	C00-D48	Onkoloog, Neuroloog, Reumatoloog, Anestesioloog, Hematoloog	esmane			<p>ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu</p>

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1586796	fentanüül, 400mcg	N02AB03	BREAKYL, bukaalravimküle, 10TK	Meda Pharma GmbH & Co. KG	100	C00-D48	Anestesioloog, Neuroloog, Hematoloog, Reumatoloog, Onkoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1223143	fentanüül, 50mcg 1h	N02AB03	MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK	Takeda Pharma AS	100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist
					100	R52.1-R52.1	Neuroloog, Anestesioloog, Reumatoloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1347038	fentanüül, 600mcg	N02AB03	EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					100	C00-D48	Onkoloog, Reumatoloog, Neuroloog, Hematoloog, Anestesioloog	esmane			<p>ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu</p>

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1400982	fentanüül, 600mcg	N02AB03	LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	C00-D48	Onkoloog, Neuroloog, Reumatoloog, Anestesioloog, Hematoloog	esmane			<p>ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalentsust) annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu</p>

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1223154	fentanüül, 75mcg 1h	N02AB03	MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK	Takeda Pharma AS	50						
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist
					100	R52.1-R52.1	Anestesioloog, Neuroloog, Reumatoloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1347016	fentanüül, 800mcg	N02AB03	EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					100	C00-D48	Anestesioloog, Neuroloog, Reumatoloog, Onkoloog, Hematoloog	esmane			<p>ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalentsust) annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu</p>

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1400993	fentanüül, 800mcg	N02AB03	LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK	Gedeon Richter Plc.	100	C00-D48	Neuroloog, Reumatoloog, Anestesioloog, Hematoloog, Onkoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opiooni ekvialgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
					50						
1077050	fenütoiin, 100mg	N03AB02	PHENHYDAN, tablett, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1300587	finasteriid, 5mg	G04CB01	FINASTERIDE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare Limited	50						
1338724	finasteriid, 5mg	G04CB01	FINASTERIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
1070637	flekainiid, 100mg	C01BC04	TAMBOCOR, tablett, 100TK	Teva B.V.	50						
1756942	flekainiid, 100mg	C01BC04	TAMBOCOR, tablett, 60TK	Teva B.V.	50						
1036954	flukonasool, 150mg	J02AC01	DIFLAZON, kõvakapsel, 1TK	KRKA d.d., Novo mesto	100	B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
					50						
1140275	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOL NYCOMED 150MG, kõvakapsel, 1TK	Takeda Pharma AS	100	B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1140286	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOL TAKEDA 150MG, kõvakapsel, 2TK	Takeda Pharma AS	100	B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
					50						
1140703	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOLE MEDOCHEMIE, kõvakapsel, 1TK	Medochemie Ltd.	50						
					100	B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
1144842	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOLE SANDOZ 150MG, kõvakapsel, 2TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					100	B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1395165	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOLE ELVIM, kõvakapsel, 1TK	SIA ELVIM	50						
					100	B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
1395176	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOLE ELVIM, kõvakapsel, 2TK	SIA ELVIM	100	B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
					50						
1395187	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOLE ELVIM, kõvakapsel, 4TK	SIA ELVIM	100	B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1490688	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOLE ACTAVIS, kõvakapsel, 1TK	Actavis Group PTC ehf	100	B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
					50						
1490699	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOLE ACTAVIS, kõvakapsel, 2TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					100	B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
1531279	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOLE MEDOCHEMIE, kõvakapsel, 2TK	Medochemie Ltd.	100	B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1140691	flukonasool, 50mg	J02AC01	FLUCONAZOLE MEDOCHEMIE, kõvakapsel, 7TK	Medochemie Ltd.	100	B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
					50						
1395660	flukonasool, 50mg	J02AC01	FLUCONAZOLE ELVIM, kõvakapsel, 7TK	SIA ELVIM	100	B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
					50						
1167971	fluokortoloon+lidokaiin, 1mg+20mg 1g	C05AA84	DOLOPROCT 1MG/20MG/G REKTAALKREEM, rektaalkreem, 15g 1TK	Bayer AG	50						
1167948	fluokortoloon+lidokaiin, 1mg+40mg	C05AA84	DOLOPROCT 1MG/40MG REKTAALSUPOSIIDID, rektaalsuposiit, 10TK	Bayer AG	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1107122	fluoksetiin, 20mg	N06AB03	FLUX, kõvakapsel, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
1456691	fluoksetiin, 20mg	N06AB03	FLUOXETINE VITABALANS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	VITABALANS OY	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
1456703	fluoksetiin, 20mg	N06AB03	FLUOXETINE VITABALANS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	VITABALANS OY	50		Psühhiaater	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1489765	flupentiksool, 1mg	N05AF01	FLUANXOL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	H. LUNDBECK A/S	50						
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
1006175	flupentiksool, 20mg 1ml	N05AF01	FLUANXOL DEPOT, süstelahus, 1ml 1TK	H. LUNDBECK A/S	100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
1007840	flutikasoon, 100mcg 1annust	R03BA05	FLIXOTIDE DISKUS 100 MCG, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	75	J45-J45					
					50						
1007884	flutikasoon, 250mcg 1annust	R03BA05	FLIXOTIDE DISKUS 250 MCG, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	50						
					75	J45-J45					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1006344	flutikasoon, 500mcg 1g	D07AC17	CUTIVATE CREAM, kreem, 15g 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	75	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater	esmane			
					75	L23-L23, L20-L20	Dermatoveneroloog, Allergoloog- immunoloog, Pediaater	esmane			
					50						
1007233	flutikasoon, 50mcg 1annust	R01AD08	FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, ninasprei, suspensioon, 120annust 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	50						
1007862	flutikasoon, 50mcg 1annust	R03BA05	FLIXOTIDE DISKUS 50 MCG, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	75	J45-J45					
					50						
1130690	flutikasoon, 50mcg 1annust	R03BA05	FLIXOTIDE INHALER, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annust 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	50						
					75	J45-J45					
1004847	flutikasoon, 50mcg 1g	D07AC17	CUTIVATE OINTMENT, salv, 15g 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	50						
					75	L23-L23, L20-L20	Dermatoveneroloog, Pediaater, Allergoloog- immunoloog	esmane			
					75	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater	esmane			
1343034	flutikasoonfuroaat, 27,5mcg 1annust	R01AD12	AVAMYS, ninasprei, suspensioon, 120annust 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1011126	fluvastatiin, 80mg	C10AA04	LESCOL XL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	SIA "Novartis Baltics"	75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					50						
					100	N18-N18				alates III staadiumist	
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					75	I11-I12			raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel		
1287187	fluvastatiin, 80mg	C10AA04	FLUVASTATIN ACTAVIS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	100	N18-N18					alates III staadiumist
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
					50						
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1723216	fluvastatiin, 80mg	C10AA04	LESCOL XL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	First Pharma OÜ	100	N18-N18					alates III staadiumist
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					50						
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
1039564	fluvoksamiin, 100mg	N06AB08	FEVARIN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	BGP Products SIA	50						
1087152	formoterool, 12mcg	R03AC13	FORADIL AEROLIZER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 60TK	SIA "Novartis Baltics"	75	J45-J45					
					50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
1178939	formoterool, 12mcg 1annust	R03AC13	FOMEDA EASYHALER, inhalatsioonipulber, 120annust 1TK	Orion Corporation	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					75	J45-J45					
1034075	formoterool, 9mcg 1annust	R03AC13	OXIS TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	AstraZeneca AB	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					75	J45-J45					
					50						
1669697	formoterool+aklidiinium , 11,8mcg+340mcg 1annust	R03AL05	BRIMICA GENUAIR, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	AstraZeneca AB	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1314256	formoterool+beklometa soon, 6mcg+100mcg 1annust	R03AK08	FOSTER, inhalatsiooniaerosool, lahus, 180annust 1TK	Chiesi Pharmaceuticals GmbH	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			III-IV staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel on viimase 3 aasta jooksul esinenud vähemalt 3 süsteemse glükokortikoidiga ravitud haiguse ägenemist
					75	J45-J45					
1653410	formoterool+beklometa soon, 6mcg+200mcg 1annust	R03AK08	FOSTER, inhalatsiooniaerosool, lahus, 180annust 1TK	Chiesi Pharmaceuticals GmbH	75	J45-J45					
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			III-IV staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel on viimase 3 aasta jooksul esinenud vähemalt 3 süsteemse glükokortikoidiga ravitud haiguse ägenemist
					50						
1068443	formoterool+budesonii d, 4,5mcg+160mcg 1annust	R03AK07	SYMBICORT TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 120annust 1TK	AstraZeneca AB	75	J45-J45					
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			III-IV staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel on viimase 3 aasta jooksul esinenud vähemalt 3 süsteemse glükokortikoidiga ravitud haiguse ägenemist
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1611470	formoterool+budesonii d, 4,5mcg+160mcg 1annust	R03AK07	BUFOMIX EASYHALER, inhalatsioonipulber, 120annust 1TK	Orion Corporation	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			III-IV staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel on viimase 3 aasta jooksul esinenud vähemalt 3 süsteemse glükokortikoidiga ravitud haiguse ägenemist
					75	J45-J45					
					50						
1156250	formoterool+budesonii d, 9mcg+320mcg 1annust	R03AK07	SYMBICORT TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	AstraZeneca AB	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			III-IV staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel on viimase 3 aasta jooksul esinenud vähemalt 3 süsteemse glükokortikoidiga ravitud haiguse ägenemist
					75	J45-J45					
					50						
1611481	formoterool+budesonii d, 9mcg+320mcg 1annust	R03AK07	BUFOMIX EASYHALER, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	Orion Corporation	75	J45-J45					
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			III-IV staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel on viimase 3 aasta jooksul esinenud vähemalt 3 süsteemse glükokortikoidiga ravitud haiguse ägenemist
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1786596	formoterool+glükopürr oonium, 5mcg+7,2mcg 1annuses	R03AL07	BEVESPI AEROSPHERE, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annust 1TK	AstraZeneca AB	75 50	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
1750227	formoterool+glükopürr oonium+beklometasoo n, 5mcg+9mcg+87mcg 1annust	R03AL09	TRIMBOW, inhalatsiooniaerosool, lahus, 120annust 1TK	Chiesi Farmaceutici S.p.A.	50 75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			III-IV staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel on viimase 3 aasta jooksul esinenud vähemalt 3 süsteemse glükokortikoidiga ravitud haiguse ägenemist
1027145	fosinopriil, 10mg	C09AA09	MONOPRIL, tablett, 28TK	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o	75 50	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1193767	fosinopriil, 10mg	C09AA09	FOSINOPRIL ACTAVIS, tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	75 50	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1027336	fosinopriil, 20mg	C09AA09	MONOPRIL, tablett, 28TK	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o	50 75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1193891	fosinopriil, 20mg	C09AA09	FOSINOPRIL ACTAVIS, tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50 75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1107021	fosinopriil+hüdrokloroti asiid, 20mg+12,5mg	C09BA09	MONOZIDE, tablett, 28TK	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o	75 50	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1250581	fosinopriil+hüdrokloroti asiid, 20mg+12,5mg	C09BA09	FOSINOPRIL HCT ACTAVIS, tablett, 30TK	Actavis Group PTC ehf	50 75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1161548	frovatriptaan, 2,5mg	N02CC07	MIGARD, õhukese polümeerikattega tablett, 2TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1060399	furosemiid, 40mg	C03CA01	FUROSEMID NYCOMED 40 mg, tablett, 100TK	Takeda Pharma AS	50						
					75	I50-I50					
					100	I27.0-I27.0					
1039362	furosemiid, 60mg	C03CA01	LASIX RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50						
					75	I50-I50					
					100	I27.0-I27.0					
1018606	fusidiinhape, 10mg 1g	S01AA13	FUCITHALMIC, silmatilgad, suspensioon, 5g 1TK	Amdipharm Limited	50						
1007727	fusidiinhape, 20mg 1g	D06AX01	FUCIDIN 20 mg/g salv, salv, 15g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
1007750	fusidiinhape, 20mg 1g	D06AX01	FUCIDIN 20 mg/g kreem, kreem, 15g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
1032815	gabapentiin, 300mg	N03AX12	NEURONTIN, kõvakapsel, 50TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					75	G63.2-G63.2	Endokrinoloog, Neuroloog	esmane		kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti, ravimi esmase väljakirjutamise õigus valuravi arstil	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1126055	gabapentiin, 300mg	N03AX12	GABAGAMMA 300MG, kõvakapsel, 50TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	75	G63.2-G63.2	Endokrinoloog, Neuroloog	esmane			kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti, ravimi esmase väljakirjutamise õigus valuravi arstil
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1696417	gabapentiin, 300mg	N03AX12	GABAPENTIN ACCORD, kõvakapsel, 50TK	Accord Healthcare B.V.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
					75	G63.2-G63.2	Neuroloog, Endokrinoloog	esmane			kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti, ravimi esmase väljakirjutamise õigus valuravi arstil

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1125953	gabapentiin, 400mg	N03AX12	GABAGAMMA 400MG, kõvakapsel, 50TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					75	G63.2-G63.2	Neuroloog, Endokrinoloog	esmane			kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti, ravimi esmase väljakirjutamise õigus valuravi arstil
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1696529	gabapentiin, 400mg	N03AX12	GABAPENTIN ACCORD, kõvakapsel, 50TK	Accord Healthcare B.V.	75	G63.2-G63.2	Endokrinoloog, Neuroloog	esmane			kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti, ravimi esmase väljakirjutamise õigus valuravi arstil
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1035098	gestodeen+etüüülöstr adiool, 0,075mg+0,02mg	G03AA10	LOGEST, kaetud tablett, 21TK	Bayer AG	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1115716	gestodeen+etüüülöstr adiool, 0,075mg+0,02mg	G03AA10	LINDYNETTE 20, kaetud tablett, 63TK	Gedeon Richter Plc.	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1665301	gestodeen+etüüülöstr adiool, 0,075mg+0,02mg	G03AA10	BRILLEVE, tablett, 63TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1023624	gestodeen+etüüülöstr adiool, 0,075mg+0,03mg	G03AA10	FEMODEN, kaetud tablett, 21TK	Bayer AG	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1115693	gestodeen+etünüülöstr adiool, 0,075mg+0,03mg	G03AA10	LINDYNETTE 30, kaetud tablett, 63TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1665334	gestodeen+etünüülöstr adiool, 0,075mg+0,03mg	G03AA10	BRILLEVE, tablett, 63TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1510030	gestodeen+etünüülöstr adiool, 60mcg+15mcg	G03AA10	VONILLE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Exeltis Baltics, UAB	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1062953	gestodeen+etünüülöstr adiool, 75mcg+20mcg	G03AA10	HARMONET, kaetud tablett, 63TK	Pfizer Europe MA EEIG	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1364105	gestodeen+etünüülöstr adiool, 75mcg+20mcg	G03AA10	GESYTIL 75/20 MIKROGRAMMI, kaetud tablett, 63TK	ratiopharm GmbH	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1364138	gestodeen+etünüülöstr adiool, 75mcg+30mcg	G03AA10	GESYTIL 75/30 MIKROGRAMMI, kaetud tablett, 63TK	ratiopharm GmbH	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1061334	glargiin-insuliin, 100ühik 1ml	A10AE04	LANTUS, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					
1265790	glargiin-insuliin, 100ühik 1ml	A10AE04	LANTUS SOLOSTAR, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1665053	glargiin-insuliin, 100ühik 1ml	A10AE04	ABASAGLAR KWIKPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1684043	glargiin-insuliin, 300ühik 1ml	A10AE04	TOUJEO, süstelahus pen- süstlis, 1.5ml 5TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					
1737042	glargiin- insuliin+liksisenatiid, 100ühik+33mcg 1ml	A10AE54	SULIQUA, süstelahus pen- süstlis, 3ml 5TK	sanofi-aventis groupe	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks kombinatsioonis metformiiniga rasvumusega patsientidele (KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes taluvates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud
					50	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks kombinatsioonis metformiiniga juhul kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1737020	glargiin- insuliin+liksisenatiid, 100ühik+50mcg 1ml	A10AE54	SULIQUA, süstelahus pen- süstlis, 3ml 5TK	sanofi-aventis groupe	50	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks kombinatsioonis metformiiniga juhul kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud
					75	E14-E14, E11-E11				II tüüpi diabeedi raviks kombinatsioonis metformiiniga rasvumusega patsientidele (KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes taluvates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud	
1241244	glatirameeratsetaat, 20mg 1ml	L03AX13	COPAXONE, süstelahus süstlis, 1ml 28TK	TEVA GmbH	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks
1659360	glatirameeratsetaat, 20mg 1ml	L03AX13	REMUREL, süstelahus süstlis, 1ml 28TK	Alvogen IPCo S.ar.l.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1618196	glatirameeratsetaat, 40mg 1ml	L03AX13	COPAXONE, süstelahus süstlis, 1ml 12TK	TEVA GmbH	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks
1716993	glatirameeratsetaat, 40mg 1ml	L03AX13	REMUREL, süstelahus süstlis, 1ml 12TK	Alvogen IPCo S.ar.l.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks
1751037	glekapreviir+pibrentasv iir, 100mg+40mg	J05AP57	MAVIRET, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	B18.2-B18.2	Gastroenteroloog, Infektsionist				sõltumata genotüübist, kroonilise progresseeruva C- viirushepatiidi raviks patsientidele, kellel esineb mõõdukas või raske maksafibroos (F2-4) ja kompenseeritud maksahaigus ning sõltumata maksafibroosi astmest patsientidele, kellel kaasuvalt esineb krüoglobulineemia (D89.1), kaasasündinud verehaigus (D56-D57; D66-D68) või kellel on maksasiirik (Z94.4)
1261066	gliklasiid, 30mg	A10BB09	GLICLADA 30 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1261101	gliklasiid, 30mg	A10BB09	GLICLADA 30 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 120TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	E14-E14, E11-E11					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1603145	gliklasiid, 30mg	A10BB09	GLICLAZIDE KRKA, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1643778	gliklasiid, 30mg	A10BB09	GLICLAZIDE ACTAVIS, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 60TK	Actavis Group PTC ehf	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1350054	gliklasiid, 60mg	A10BB09	DIAPREL MR 60MG, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 60TK	Les Laboratories Servier	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1551822	gliklasiid, 60mg	A10BB09	GLICLADA 60 MG, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1551855	gliklasiid, 60mg	A10BB09	GLICLADA 60 MG, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 120TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1551945	gliklasiid, 60mg	A10BB09	GLICLAZIDE KRKA 60 MG, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1644601	gliklasiid, 60mg	A10BB09	GLICLAZIDE ACTAVIS, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 60TK	Actavis Group PTC ehf	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1668146	gliklasiid, 60mg	A10BB09	GLICLAZIDE TEVA, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 60TK	Teva B.V.	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1046405	gliklasiid, 80mg	A10BB09	DIAPREL, tablett, 60TK	Les Laboratories Servier	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1084957	glimepiriid, 1mg	A10BB12	AMARYL, tablett, 30TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1176948	glimepiriid, 1mg	A10BB12	OLTAR 1MG, tablett, 30TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1334821	glimepiriid, 1mg	A10BB12	GLIMEPIRIDE ACCORD, tablett, 30TK	Accord Healthcare Limited	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1110328	glimepiriid, 2mg	A10BB12	AMARYL, tablett, 30TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1177039	glimepiriid, 2mg	A10BB12	OLTAR 2 MG, tablett, 30TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50						
					75	E14-E14, E11-E11					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1191709	glimepiriid, 2mg	A10BB12	MEGLIMID, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1334865	glimepiriid, 2mg	A10BB12	GLIMEPIRIDE ACCORD, tablett, 30TK	Accord Healthcare Limited	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1671195	glimepiriid, 2mg	A10BB12	AMARYL, tablett, 30TK	First Pharma OÜ	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1110339	glimepiriid, 3mg	A10BB12	AMARYL, tablett, 30TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1177129	glimepiriid, 3mg	A10BB12	OLTAR 3 MG, tablett, 30TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1191787	glimepiriid, 3mg	A10BB12	MEGLIMID, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1334900	glimepiriid, 3mg	A10BB12	GLIMEPIRIDE ACCORD, tablett, 30TK	Accord Healthcare Limited	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1670992	glimepiriid, 3mg	A10BB12	AMARYL, tablett, 30TK	First Pharma OÜ	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1125391	glimepiriid, 4mg	A10BB12	AMARYL, tablett, 30TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1191844	glimepiriid, 4mg	A10BB12	MEGLIMID, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1334944	glimepiriid, 4mg	A10BB12	GLIMEPIRIDE ACCORD, tablett, 30TK	Accord Healthcare Limited	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1395121	glimepiriid, 6mg	A10BB12	AMARYL, tablett, 30TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1029338	glipisiid, 10mg	A10BB07	GLIBENESE GITS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1029349	glipisiid, 5mg	A10BB07	GLIBENESE GITS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1201396	glulisiin-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB06	APIDRA, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1294398	glulisiin-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB06	APIDRA SOLOSTAR, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1165878	glükagoon, 1mg	H04AA01	GLUCAGEN 1MG HYPOKIT, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Novo Nordisk A/S	50						
1326653	glükoosamiin, 1178mg	M01AX05	GLUCOSAMIN- RATIOPHARM 1178 MG, suukaudse lahuse pulber, 20TK	ratiopharm GmbH	50						
1183687	glükoosamiin, 400mg	M01AX05	GLUCOSAMINE PHARMA NORD, kõvakapsel, 90TK	PHARMA NORD ApS	50						
1183698	glükoosamiin, 400mg	M01AX05	GLUCOSAMINE PHARMA NORD, kõvakapsel, 270TK	PHARMA NORD ApS	50						
1220094	glükoosamiin, 400mg	M01AX05	GLUCADOL, õhukese polümeerikattega tablett, 180TK	Takeda Pharma AS	50						
1595954	glükopürroonium, 44mcg 1annust	R03BB06	SEEBRI BREEZHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 30TK	Novartis Europharm Limited	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1648403	gosereliin, 10,8mg	L02AE03	RESELIGO, implantaat süstlis, 1TK	Alvogen IPCo S.ar.l.	75	N80-N80					III-IV astme endometriooosi põdevatele patsientidele
					100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				lokaalse või lokaalselt levinud ja kõrge riskiga eesnäärmevähiga patsientidele (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne reseksioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel
					50						
					100	N97.0-N97.9, Z31.0- Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1002621	gosereliin, 3,6mg	L02AE03	ZOLADEX, implantaat, 1TK	AstraZeneca AB	50						
					75	N80-N80					III-IV astme endometriooosi põdevatele patsientidele
					100	N97.0-N97.9, Z31.0- Z31.9			41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks	
					100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog			lokaalse või lokaalselt levinud ja kõrge riskiga eesnäärmevähiga patsientidele (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1648425	gosereliin, 3,6mg	L02AE03	RESELIGO, implantaat süstlis, 1TK	Alvogen IPCo S.ar.l.	75	N80-N80					III-IV astme endometriooosi põdevatele patsientidele
					100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				lokaalse või lokaalselt levinud ja kõrge riskiga eesnäärmevähiga patsientidele (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel
					100	N97.0-N97.9, Z31.0- Z31.9			41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks	
					50						
1023950	granisetroon, 1mg	A04AA02	KYTRIL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Atnahs Pharma UK Limited	50						
					100	C00-D48				suukaudsest keemiaravist põhjustatud iivelduse ja oksendamise profülaktikaks ja raviks juhul, kui metoklopramiid ei ole esmase valikuna soovitatud või see on osutunud ebaefektiivseks	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1014680	haloperidool, 1,5mg	N05AD01	HALOPERIDOL-RICHTER, tablett, 50TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	F33.2-F33.3, F18.4-F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4-F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00-F09, F20-F29, F32.2-F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4-F12.7, F10.4-F10.7	Psühhiaater	esmane			
1014691	haloperidool, 2mg 1ml	N05AD01	HALOPERIDOL-RICHTER, suukaudsed tilgad, lahus, 10ml 1TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	F33.2-F33.3, F18.4-F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4-F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00-F09, F20-F29, F32.2-F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4-F12.7, F10.4-F10.7	Psühhiaater	esmane			
1064674	haloperidool, 50mg 1ml	N05AD01	HALOPERIDOL DECANOATE-RICHTER, süstelahus, 1ml 5TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	F33.2-F33.3, F18.4-F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4-F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00-F09, F20-F29, F32.2-F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4-F12.7, F10.4-F10.7	Psühhiaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1014679	haloperidool, 5mg	N05AD01	HALOPERIDOL-RICHTER, tablett, 50TK	Gedeon Richter Plc.	100	F33.2-F33.3, F18.4- F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4- F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4- F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00-F09, F20-F29, F32.2- F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4- F12.7, F10.4-F10.7	Psühhiaater	esmane			
					50						
1054055	höbesulfadiasiin, 10mg 1g	D06BA01	SULFARGIN, salv, 50g 1TK	AS Grindeks	50						
1015478	hüdroklorotiasiid, 25mg	C03AA03	HYPOTHIAZID, tablett, 20TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	100	I27.0-I27.0					
					75	I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50					
					50						
1008841	hüdroklorotiasiid+amilo riid, 50mg+5mg	C03EA81	MODURETIC, tablett, 30TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	100	N25.1-N25.1					
1137013	hüdrokortisoon, 10mg 1g	D07AA02	HYDROCORTISONE DAK, salv, 30g 1TK	Takeda Pharma AS	50						
1018594	hüdrokortisoon+fusidiin hape, 10mg+20mg 1g	D07CA83	FUCIDIN H, kreem, 15g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
1035403	hüdrokortisoon+kloorh eksidiin, 10mg+10mg 1g	D07BA80	SIBICORT, kreem, 20g 1TK	Orion Corporation	50						
1045145	hüdrokortisoon+tsiprofl oksatsiin, 10mg+2mg 1ml	S02CA82	CIPROBAY HC, kõrvatilgad, suspensioon, 10ml 1TK	SIA "Novartis Baltics"	50						
1036022	hüdroksükarbamiid, 500mg	L01XX05	HYDREA, kõvakapsel, 100TK	Bristol-Myers Squibb Kft.	100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog				
					50						
1615698	hüdroksükarbamiid, 500mg	L01XX05	HYDREA, kõvakapsel, 100TK	First Pharma OÜ	100	C00-D48	Onkoloog, Hematoloog				
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1027291	hüdroksüklorokviin, 200mg	P01BA02	PLAQUENIL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	75	M45-M46, M08- M08, M30-M35, M05-M06	Pediaater, Reumatoloog				
					50						
1529579	hüdroksüklorokviin, 200mg	P01BA02	PLAQUENIL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	First Pharma OÜ	50						
					75	M45-M46, M08- M08, M30-M35, M05-M06	Reumatoloog, Pediaater				
1566086	hüdroksüklorokviin, 200mg	P01BA02	PLAQUENIL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	First Pharma OÜ	50						
					75	M45-M46, M08- M08, M30-M35, M05-M06	Pediaater, Reumatoloog				
1400858	ibandronhape, 150mg	M05BA06	BAXOGAR, õhukese polümeerikattega tablett, 1TK	Alvogen IPCo S.ar.l.	75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
					50						
1498978	ibandronhape, 150mg	M05BA06	IBANDRONIC ACID TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 1TK	Teva B.V.	75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
					50						
1498989	ibandronhape, 150mg	M05BA06	IBANDRONIC ACID TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	Teva B.V.	50						
					75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1668034	ibrutiniib, 140mg	L01XE27	IMBRUVICA, kõvakapsel, 90TK	Janssen-Cilag International N.V.	100	C91.1-C91.1	Hematoloog				monoteraapiana patsientidele, kellel esineb 17p deletsioon või TP53 mutatsioon ning kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole eelnevale ravile allunud või on taastekinud lühema aja kui 36 kuu jooksul eelneva ravi alustamisest alates. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi ibrutiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.04.2017.
1073012	ibuprofeen, 400mg	M01AE01	IBUMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	VITABALANS OY	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						
					100	C00-D48					
					75	M15-M19		63,00			
1073089	ibuprofeen, 400mg	M01AE01	IBUMETIN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Takeda Pharma AS	75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
					50						
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
1473588	ibuprofeen, 400mg	M01AE01	IBUPROFEN LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	G.L. Pharma GmbH	100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					75	M15-M19		63,00			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1032714	ibuprofeen, 600mg	M01AE01	IBUPROFEN LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46					
					75	M15-M19		63,00			
					100	C00-D48					
1073113	ibuprofeen, 600mg	M01AE01	IBUMETIN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Takeda Pharma AS	75	M30-M35, M05- M08, M45-M46					
					75	M15-M19		63,00			
					50						
					100	C00-D48					
1085194	ibuprofeen, 600mg	M01AE01	IBUMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	VITABALANS OY	100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46					
					50						
					75	M15-M19		63,00			
1085206	ibuprofeen, 600mg	M01AE01	IBUMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	VITABALANS OY	100	C00-D48					
					50						
					75	M15-M19		63,00			
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46					
1473599	ibuprofeen, 600mg	M01AE01	IBUPROFEN LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	G.L. Pharma GmbH	75	M30-M35, M05- M08, M45-M46					
					100	C00-D48					
					75	M15-M19		63,00			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1697126	idebenoon, 150mg	N06BX13	RAXONE, õhukese polümeerikattega tablett, 180TK	Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH	100	H47.2-H47.2	Oftalmoloog				<p>ravimi väljakirjutamise õigus geneetilise testiga kinnitatud Leberi päriliku optilise neuropaatia näidustusel. Soodustus kehtib alates kliiniliselt olulise paranemise (clinically relevant recovery, CRR) saavutamisest võrreldes idebenoon-ravi alustamisega. Ravivastuse hindamine toimub iga 3 kuu järel kuni CRR saavutamiseni ning seejärel iga 6 kuu tagant. Ravi lõpetatakse, kui pärast CCR saavutamist ei ole kahel järjestikusel mõõtmisel enam toimunud täiendavat nägemisteravuse paranemist. Off-chart patsiendil, kes enne ravi alustamist ei näe ühtegi tähte logMAR lugemistabelil, tähendab CRR võimet lugeda lugemistabelilt vähemalt 5 tähte (võrdne ühe rea lugemisega) ning on-chart patsiendil, kes suutis lugeda tähti lugemistabelilt enne ravi alustamist, tähendab CRR võimet lugeda täiendavalt</p>

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											vähemalt 10 tähte (võrdne 2 rea lugemisega lugemistabelil).
1291890	iloprost, 10mcg 1ml	B01AC11	VENTAVIS, nebuliseeritav lahus, 1ml 30TK	Bayer AG	100	I27.0-I27.0	Pediaater, Reumatoloog, Pulmonoloog, Kardioloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1291902	iloprost, 10mcg 1ml	B01AC11	VENTAVIS, nebuliseeritav lahus, 1ml 168TK	Bayer AG	50						
					100	I27.0-I27.0	Pediaater, Kardioloog, Pulmonoloog, Reumatoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1548592	imatiniiib, 100mg	L01XE01	IMATINIB ZENTIVA 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Zentiva k.s.	100	C49.9-C49.9, C16- C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KIT-positiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KIT-positiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)
					100	C83.5-C83.5, C91.0-C91.0	Hematoloog				patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1566413	imatiniib, 100mg	L01XE01	MEAXIN, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	KRKA d.d., Novo mesto	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	C49.9-C49.9, C16- C20	Onkoloog				patsientidele, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KIT-positiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KIT-positiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	C83.5-C83.5, C91.0- C91.0	Hematoloog				patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph- positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1588417	imatiniib, 100mg	L01XE01	IMATINIB GRINDEKS, kõvakapsel, 120TK	AS Grindeks	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	C49.9-C49.9, C16- C20	Onkoloog				patsientidele, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KIT-positiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KIT-positiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	C83.5-C83.5, C91.0- C91.0	Hematoloog				patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph- positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1604900	imatiniib, 100mg	L01XE01	IMATINIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Teva B.V.	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	C49.9-C49.9, C16- C20	Onkoloog				patsientidele, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KIT-positiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KIT-positiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	C83.5-C83.5, C91.0- C91.0	Hematoloog				patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph- positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1619726	imatiniib, 100mg	L01XE01	IMATINIB ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	C49.9-C49.9, C16- C20	Onkoloog				patsientidele, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KIT-positiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KIT-positiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	C83.5-C83.5, C91.0- C91.0	Hematoloog				patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph- positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1658448	imatiniib, 100mg	L01XE01	GLIPOX, kõvakapsel, 120TK	UAB Norameda	100	C49.9-C49.9, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KIT-positiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KIT-positiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	C83.5-C83.5, C91.0-C91.0	Hematoloog				patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni
					100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1658471	imatiniib, 400mg	L01XE01	GLIPOX, kõvakapsel, 30TK	UAB Norameda	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	C83.5-C83.5, C91.0- C91.0	Hematoloog				patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph- positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	C49.9-C49.9, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KIT-positiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloomalise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KIT-positiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloomalise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
7000063	imikute toitesegu,		Neocate (aminohapete segu) , pulber, 400 g	N.V. Nutricia	75	K52.2-K52.2, L20.8-L20.8, K90.4-K90.4, L27.2-L27.2				1,00	
7000074	imikute toitesegu,		APTAMIL ALLERGY CARE (Aptamil Pepti), pulber, 450 g	N.V. Nutricia	75	K52.2-K52.2, L20.8-L20.8, K90.4-K90.4, L27.2-L27.2				1,00	
7000085	imikute toitesegu,		APTAMIL DIGESTIVE CARE (Aptamil Pepti MCT), pulber, 450 g	N.V. Nutricia	75	K52.2-K52.2, L20.8-L20.8, K90.4-K90.4, L27.2-L27.2				1,00	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
7002313	imikute toitesegu,		MILUPA APTAMIL FMS, pulber, 200 g	N.V. Nutricia	75	P05-P05, E42-E42, P07-P07, P27.1- P27.1				0,58	
7002863	imikute toitesegu,		FRISOLAC GOLD PEP AC, pulber, 400g	Friesland Foods BV	75	K52.2-K52.2, L20.8- L20.8, K90.4-K90.4, L27.2-L27.2				1,00	
7002874	imikute toitesegu,		FRISOLAC GOLD PREMATURE, pulber, 400g	Friesland Foods BV	75	P05-P05, E42-E42, P07-P07, P27.1- P27.1				0,58	
7002885	imikute toitesegu,		FRISOLAC GOLD PEP, pulber, 400g	Friesland Foods BV	75	K52.2-K52.2, L20.8- L20.8, K90.4-K90.4, L27.2-L27.2				1,00	
7017432	imikute toitesegu,		INFATRINI, suspensioon, 125ml N24	Nutricia	75	E42-E42				1,00	lastele, kellele on paigaldatud gastrostoom või jejunostoom
7004933	imikute toitesegu,		APTAMIL PREMATIL, pulber, 400 g	Nutricia Cuijk BV.	75	P05-P05, E42-E42, P07-P07, P27.1- P27.1				0,58	
1060322	imikvimood, 5%	D06BB10	ALDARA, kreem, 250mg 12TK	Meda AB	50						
1452169	indakaterool, 150mcg	R03AC18	ONBREZ BREEZHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 30TK	Novartis Europharm Limited	75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
					50						
1452215	indakaterool, 300mcg	R03AC18	ONBREZ BREEZHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 30TK	Novartis Europharm Limited	50						
					75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
1626555	indakaterool+glükopürr oonium, 85mcg+43mcg 1annust	R03AL04	ULTIBRO BREEZHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 30TK	Novartis Europharm Limited	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
1167780	indapamiid, 1,5mg	C03BA11	TERTENSIF SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Les Laboratories Servier	100	I27.0-I27.0					
					75	I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1185230	indapamiid, 1,5mg	C03BA11	RAWEL SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50					
					100	I27.0-I27.0					
					50						
1379741	indapamiid, 1,5mg	C03BA11	INDAMAX, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	100	I27.0-I27.0					
					50						
					75	I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50					
1019416	indapamiid, 2,5mg	C03BA11	TERTENSIF, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratories Servier	75	I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50					
					50						
					100	I27.0-I27.0					
1038383	indapamiid, 2,5mg	C03BA11	PROINDAP, kõvakapsel, 30TK	PRO.MED.CS Praha a.s.	50						
					100	I27.0-I27.0					
					75	I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50					
1071841	indometatsiin, 50mg	M01AB01	INDOMET- RATIOPHARM 50MG, kõvakapsel, 50TK	ratiopharm GmbH	75	M15-M19			63,00		
					50						
					75	M30-M33, M05- M08, M35-M35, M45-M46					
					100	C00-D48					
1105940	ipratroopiumbromiid, 20mcg 1annust	R03BB01	ATROVENT N, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annust 1TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	75	J45-J45					
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					50						
1000348	isokonasool, 10mg 1g	D01AC05	TRAVOGEN, kreem, 20g 1TK	Bayer AG	50						
1000416	isokonasool+diflukortol oon, 10mg+1mg 1g	D01AC80	TRAVOCORT, kreem, 15g 1TK	Bayer AG	50						
1015074	isosorbiitdinitraat, 20mg	C01DA08	ISDN-RATIOPHARM 20 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	I20-I20					
1008964	isosorbiitdinitraat, 40mg	C01DA08	ISDN-RATIOPHARM 40 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	ratiopharm GmbH	75	I20-I20					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1146361	isosorbiitmononitraat, 20mg	C01DA14	ISOSORBIDE MONONITRATE VITABALANS, tablett, 30TK	VITABALANS OY	50						
					75	I20-I20					
1146372	isosorbiitmononitraat, 20mg	C01DA14	ISOSORBIDE MONONITRATE VITABALANS, tablett, 100TK	VITABALANS OY	75	I20-I20					
					50						
1101913	isosorbiitmononitraat, 40mg	C01DA14	OLICARD 40 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Mylan Healthcare GmbH	75	I20-I20					
					50						
1046786	isosorbiitmononitraat, 60mg	C01DA14	IMDUR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	TopRidge Pharma (Ireland) Limited	50						
					75	I20-I20					
1101924	isosorbiitmononitraat, 60mg	C01DA14	OLICARD 60 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Mylan Healthcare GmbH	75	I20-I20					
					50						
1127584	isosorbiitmononitraat, 60mg	C01DA14	ISOMONIT 60 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	HEXAL AG	75	I20-I20					
					50						
1252741	isosorbiitmononitraat, 60mg	C01DA14	ISOMONIT 60 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	HEXAL AG	75	I20-I20					
					50						
1004364	isotretinoiin, 10mg	D10BA01	ROACCUTANE 10 MG, pehmekapsel, 30TK	Roche Eesti OÜ	75	L70.1-L70.2	Dermatoveneroloog				
					50						
1112230	isotretinoiin, 20mg	D10BA01	ROACCUTANE 20 MG, pehmekapsel, 30TK	Roche Eesti OÜ	50						
					75	L70.1-L70.2	Dermatoveneroloog				
1164035	itrakonasool, 100mg	J02AC02	PROKANAZOL, kõvakapsel, 4TK	PRO.MED.CS Praha a.s.	50						
					100	B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1164057	itrakonasool, 100mg	J02AC02	PROKANAZOL, kõvakapsel, 28TK	PRO.MED.CS Praha a.s.	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
					50						
1230488	itrakonasool, 100mg	J02AC02	ITRACONAZOL ACTAVIS, kõvakapsel, 28TK	Actavis Group PTC ehf	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
					50						
1219553	ivabradiin, 5mg	C01EB17	PROCORALAN, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Les Laboratoires Servier	50						
1700413	ivabradiin, 5mg	C01EB17	BIXEBRA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
1700772	ivabradiin, 5mg	C01EB17	IVABRADINE GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	AS Grindeks	50						
1715712	ivabradiin, 5mg	C01EB17	IVABRADINE MYLAN, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Mylan S.A.S	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1715790	ivabradiin, 5mg	C01EB17	BREDIWAL, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1219485	ivabradiin, 7,5mg	C01EB17	PROCORALAN, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Les Laboratoires Servier	50						
1700514	ivabradiin, 7,5mg	C01EB17	BIXEBRA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Krka d.d. Novo Mesto	50						
					50						
					50						
					50						
1700783	ivabradiin, 7,5mg	C01EB17	IVABRADINE GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	AS Grindeks	50						
1715891	ivabradiin, 7,5mg	C01EB17	IVABRADINE MYLAN, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Mylan S.A.S	50						
1715970	ivabradiin, 7,5mg	C01EB17	BREDIWAL, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1038068	IX hüübimisfaktor, 1200RÜ	B02BD04	IMMUNINE, süste-/infusioonilahuse pulber ja lahusti, 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	D67-D67	Hematoloog, Pediaater				
1038057	IX hüübimisfaktor, 600RÜ	B02BD04	IMMUNINE, süste-/infusioonilahuse pulber ja lahusti, 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	D67-D67	Hematoloog, Pediaater				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1728840	kabosantiniib, 20mg	L01XE26	CABOMETRYX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ipsen Pharma	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast esimese rea sunitiniib- või pasopaniibravi patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine kabosantiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkologi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ning kellel mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1728862	kabosantiniib, 40mg	L01XE26	CABOMETRYX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ipsen Pharma	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast esimese rea sunitiniib- või pasopaniibravi patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine kabosantiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkologi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ning kellel mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1728884	kabosantiniib, 60mg	L01XE26	CABOMETRYX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ipsen Pharma	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast esimese rea sunitiniib- või pasopaniibravi patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine kabosantiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkologi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ning kellel mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
1093340	kaltsipotriool+beetamet asoon, 50mcg+0,5mg 1g	D05AX80	DAIVOBET, salv, 30g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
					75	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater	esmane			
1408036	kaltsipotriool+beetamet asoon, 50mcg+0,5mg 1g	D05AX80	XAMIOL, geel, 30g 1TK	LEO Pharma A/S	75	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog	esmane			
					50						
1534610	kaltsipotriool+beetamet asoon, 50mcg+0,5mg 1g	D05AX80	DAIVOBET, geel, 15g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
					75	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater	esmane			
1534621	kaltsipotriool+beetamet asoon, 50mcg+0,5mg 1g	D05AX80	DAIVOBET, geel, 30g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
					75	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1676369	kaltsipotriool+beetamet asoon, 50mcg+0,5mg 1g	D05AX80	CABEMET, salv, 30g 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater	esmane			
1676370	kaltsipotriool+beetamet asoon, 50mcg+0,5mg 1g	D05AX80	CABEMET, salv, 60g 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog	esmane			
					50						
1004599	kaltsitriool, 0,25mcg	A11CC04	ROCALTROL, pehmekapsel, 30TK	Roche Eesti OÜ	50						
					100	N25-N25, N18-N18	Pediaater, Nefrooloog				
					100	E89.2-E89.2, E20- E20	Endokrinoloog, Pediaater				
1392016	kaltsium+kolekaltsifero ol, 500mg+400RÜ	A12AX80	CALCIGRAN FORTE, närimistablett, 120TK	Takeda Pharma AS	75	M80-M80					kombinatsioonravi osana patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
					100	N18-N18					
1046337	kaltsiumkarbonaat, 1250mg	A12AA04	CALCIGRAN SINE, närimistablett, 100TK	Takeda Pharma AS	100	N18-N18					
					100	E89.2-E89.2, E20- E20	Pediaater, Endokrinoloog				
1129519	kaltsiumnadropariin, 2850RÜ anti Xa 0.3ml	B01AB06	FRAXIPARINE, süstelahus süstlis, 0.3ml 10TK	Aspen Pharma Trading Limited	50						
					100	O99.8-O99.8					
					75	M17-M17, S72.7- S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16- M16, S72.0-S72.0				kuni 30 päevaks	
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6				kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1065664	kaltsiumnadropariin, 3800RÜ anti Xa 0.4ml	B01AB06	FRAXIPARINE, süstelahus süstlis, 0.4ml 10TK	Aspen Pharma Trading Limited	100	O99.8-O99.8					
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6				kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel	
					50						
					75	M17-M17, S72.7- S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16- M16, S72.0-S72.0			kuni 30 päevaks		
1124110	kaltsiumnadropariin, 5700RÜ anti Xa 0.6ml	B01AB06	FRAXIPARINE, süstelahus süstlis, 0.6ml 10TK	Aspen Pharma Trading Limited	100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
					100	O99.8-O99.8					
					75	M17-M17, S72.7- S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16- M16, S72.0-S72.0			kuni 30 päevaks		
1129496	kaltsiumnadropariin, 7600RÜ anti Xa 0.8ml	B01AB06	FRAXIPARINE, süstelahus süstlis, 0.8ml 10TK	Aspen Pharma Trading Limited	100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					100	O99.8-O99.8					
					50						
					75	M17-M17, S72.7- S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16- M16, S72.0-S72.0			kuni 30 päevaks		
1291058	kandesartaan, 16mg	C09CA06	PRESCANDEN 16MG, tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1455061	kandesartaan, 16mg	C09CA06	CANDESARTAN ACTAVIS, tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1475962	kandesartaan, 16mg	C09CA06	CANTAR, tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1487572	kandesartaan, 16mg	C09CA06	CARZAN 16MG, tablett, 28TK	Zentiva k.s.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1497630	kandesartaan, 16mg	C09CA06	CANOCORD 16 MG, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1183867	kandesartaan, 32mg	C09CA06	ATACAND, tablett, 28TK	AstraZeneca AB	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1396458	kandesartaan, 32mg	C09CA06	PRESCANDEN 32MG, tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1455140	kandesartaan, 32mg	C09CA06	CANDESARTAN ACTAVIS, tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1476110	kandesartaan, 32mg	C09CA06	CANTAR, tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1487651	kandesartaan, 32mg	C09CA06	CARZAN 32MG, tablett, 28TK	Zentiva k.s.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1497719	kandesartaan, 32mg	C09CA06	CANOCORD 32 MG, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1497551	kandesartaan, 8mg	C09CA06	CANOCORD 8 MG, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1589665	kandesartaan+amlodipiin, 16mg+10mg	C09DB07	ZENICAMO, tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1355879	kandesartaan+hüdroklorotiasiid, 16mg+12,5mg	C09DA06	PRESCANDEN HCT 16 MG/12,5 MG, tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1455375	kandesartaan+hüdrokl orotiasiid, 16mg+12,5mg	C09DA06	CANDESARTAN HCT ACTAVIS, tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1487819	kandesartaan+hüdrokl orotiasiid, 16mg+12,5mg	C09DA06	CARZAN HCT 16MG/12,5MG, tablett, 28TK	Zentiva k.s.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1501063	kandesartaan+hüdrokl orotiasiid, 16mg+12,5mg	C09DA06	CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLORO THIAZIDE TEVA, tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1634419	kandesartaan+hüdrokl orotiasiid, 16mg+12,5mg	C09DA06	CANOCOMBI, tablett, 30TK	Krka, d.d., Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1634600	kandesartaan+hüdrokl orotiasiid, 32mg+12,5mg	C09DA06	CANOCOMBI, tablett, 30TK	Krka, d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1634329	kandesartaan+hüdrokl orotiasiid, 32mg+25mg	C09DA06	CANOCOMBI, tablett, 30TK	Krka, d.d., Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1634510	kandesartaan+hüdrokl orotiasiid, 8mg+12,5mg	C09DA06	CANOCOMBI, tablett, 30TK	Krka, d.d., Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1013319	kapetsitabiin, 150mg	L01BC06	XELODA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Roche Registration GmbH	50						
					100	C18-C20	Onkoloog				kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliativseks monokemoteraapiaks
					100	C22-C25	Onkoloog				biliopankreatilise süsteemi kasvajate adjuvantraviks
1534205	kapetsitabiin, 150mg	L01BC06	CAPECITABINE NORAMEDA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	UAB Norameda	50						
					100	C22-C25	Onkoloog				biliopankreatilise süsteemi kasvajate adjuvantraviks
					100	C18-C20	Onkoloog				kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliativseks monokemoteraapiaks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1567986	kapetsitabiin, 150mg	L01BC06	CAPECITABINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C22-C25	Onkoloog				biliopankreatilise süsteemi kasvajate adjuvantraviks
					50						
					100	C18-C20	Onkoloog			kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliatiivseks monokemoteraapiaks	
1013308	kapetsitabiin, 500mg	L01BC06	XELODA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Roche Registration GmbH	50						
					100	C18-C20	Onkoloog			kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliatiivseks monokemoteraapiaks	
					100	C22-C25	Onkoloog			biliopankreatilise süsteemi kasvajate adjuvantraviks	
1534216	kapetsitabiin, 500mg	L01BC06	CAPECITABINE NORAMEDA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	UAB Norameda	50						
					100	C22-C25	Onkoloog			biliopankreatilise süsteemi kasvajate adjuvantraviks	
					100	C18-C20	Onkoloog			kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliatiivseks monokemoteraapiaks	
1540099	kapetsitabiin, 500mg	L01BC06	CAPECITABINE ZENTIVA 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Zentiva k.s.	100	C22-C25	Onkoloog				biliopankreatilise süsteemi kasvajate adjuvantraviks
					50						
					100	C18-C20	Onkoloog			kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliatiivseks monokemoteraapiaks	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1544004	kapetsitabiin, 500mg	L01BC06	CAPECITABINE SANDOZ, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	C22-C25	Onkoloog				biliopankreatilise süsteemi kasvajate adjuvantraviks
					100	C18-C20	Onkoloog			kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliatiivseks monokemoteraapiaks	
					50						
1568055	kapetsitabiin, 500mg	L01BC06	CAPECITABINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C22-C25	Onkoloog				biliopankreatilise süsteemi kasvajate adjuvantraviks
					100	C18-C20	Onkoloog			kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliatiivseks monokemoteraapiaks	
					50						
1077117	karbamasepiin, 150mg	N03AF01	TIMONIL 150 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	75	G50.0-G50.0					
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1008649	karbamasepiin, 200mg	N03AF01	CARBAMAZEPINE NYCOMED, tablett, 50TK	Takeda Pharma AS	75	G50.0-G50.0					
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1035942	karbamasepiin, 200mg	N03AF01	FINLEPSIN, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 50TK	Teva Pharma B.V.	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					75	G50.0-G50.0					
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1036055	karbamasepiin, 200mg	N03AF01	FINLEPSIN, tablett, 50TK	Teva Pharma B.V.	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					75	G50.0-G50.0					
1042311	karbamasepiin, 200mg	N03AF01	CARBALEX 200 MG, tablett, 50TK	G.L. Pharma GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
					75	G50.0-G50.0					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1077207	karbamasepiin, 300mg	N03AF01	TIMONIL 300 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					75	G50.0-G50.0					
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
1115592	karbamasepiin, 300mg	N03AF01	CARBALEX RETARD 300 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK	G.L. Pharma GmbH	75	G50.0-G50.0					
					50						
					100	F18.4-F18.7, F33.2- F33.3, F70-F79, F00-F09, F15.4- F15.7, F14.4-F14.7, F12.4-F12.7, F30- F31, F11.4-F11.7, F60.3-F60.3, F10.4- F10.7, F16.4-F16.7, F32.2-F32.3, F13.4- F13.7, F20-F29, F19.4-F19.7	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1035953	karbamasepiin, 400mg	N03AF01	FINLEPSIN, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 50TK	Teva Pharma B.V.	75	G50.0-G50.0					
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
1042322	karbamasepiin, 400mg	N03AF01	CARBALEX 400 MG, tablett, 50TK	G.L. Pharma GmbH	75	G50.0-G50.0					
					50						
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1007716	karbamasepiin, 600mg	N03AF01	TIMONIL 600 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK	Desitin Arzneimittel GmbH	75	G50.0-G50.0					
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
1042333	karbamasepiin, 600mg	N03AF01	CARBALEX RETARD 600 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK	G.L. Pharma GmbH	100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
					75	G50.0-G50.0					
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1110564	karvedilool, 12,5mg	C07AG02	CARVEDILOLHEXAL 12,5 MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	75	I50-I50, I47-I49					
					50						
1157543	karvedilool, 12,5mg	C07AG02	CORYOL 12,5 MG, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	I50-I50, I47-I49					
1318733	karvedilool, 12,5mg	C07AG02	AVEDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pharmaceutical Works Polpharma S.A.	75	I50-I50, I47-I49					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1110520	karvedilool, 25mg	C07AG02	CARVEDILOLHEXAL 25 MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	75	I50-I50, I47-I49					
					50						
1157644	karvedilool, 25mg	C07AG02	CORYOL 25 MG, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	I50-I50, I47-I49					
1318755	karvedilool, 25mg	C07AG02	AVEDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pharmaceutical Works Polpharma S.A.	50						
					75	I50-I50, I47-I49					
1110609	karvedilool, 6,25mg	C07AG02	CARVEDILOLHEXAL 6,25 MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	75	I50-I50, I47-I49					
					50						
1318711	karvedilool, 6,25mg	C07AG02	AVEDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pharmaceutical Works Polpharma S.A.	50						
					75	I50-I50, I47-I49					
1115637	keskmise toimeajaga humaaninsuliin, 100TÜ 1ml	A10AC01	HUMULIN N KWIKPEN, süstesuspensioon pen-süstlis, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1018189	ketokonasool, 20mg 1g	D01AC08	NIZORAL, kreem, 15g 1TK	Johnson & Johnson UAB	50						
1073461	ketoprofeen, 100mg	M01AE03	KETO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	VITABALANS OY	50						
1073483	ketoprofeen, 100mg	M01AE03	KETO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	VITABALANS OY	50						
1073506	ketoprofeen, 50mg	M01AE03	KETO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	VITABALANS OY	50						
1073517	ketoprofeen, 50mg	M01AE03	KETO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	VITABALANS OY	50						
1486559	klaritromütsiin, 125mg 5ml	J01FA09	LEKOKLAR, suukaudse suspensiooni graanulid, 100ml 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1028887	klaritromütsiin, 250mg	J01FA09	FROMILID, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1032747	klaritromütsiin, 250mg	J01FA09	KLACID 250 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	BGP Products SIA	50						
1110261	klaritromütsiin, 250mg	J01FA09	KLERIMED 250MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Medochemie Ltd.	50						
1549582	klaritromütsiin, 250mg	J01FA09	CLARITHROMYCIN GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	AS Grindeks	50						
1068881	klaritromütsiin, 25mg 1ml	J01FA09	KLACID 125 MG/5 ML, suukaudse suspensiooni graanulid, 100ml 1TK	BGP Products SIA	50						
1028876	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	FROMLID, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
1032758	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	KLACID SR 500 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 5TK	BGP Products SIA	50						
1068904	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	KLACID SR 500 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 7TK	BGP Products SIA	50						
1110238	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	KLERIMED 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Medochemie Ltd.	50						
1141276	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	FROMLID UNO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 5TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
1141287	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	FROMLID UNO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 7TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
1188086	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	LEKOKLAR XL 500 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 7TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1405460	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	KLACID, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	BGP Products SIA	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1549627	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	CLARITHROMYCIN GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	AS Grindeks	50						
1011160	klindamütsiin, 100mg	G01AA10	DALACIN, vaginaalsuposiit, 3TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1021914	klindamütsiin, 10mg 1ml	D10AF01	DALACIN T, nahalahus, 30ml 1TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1007503	klindamütsiin, 150mg	J01FF01	DALACIN C, kõvakapsel, 16TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1007536	klindamütsiin, 300mg	J01FF01	DALACIN C, kõvakapsel, 16TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1108561	klindamütsiin, 300mg	J01FF01	CLINDAMYCIN - MIP 300, õhukese polümeerikattega tablett, 16TK	MIP Pharma GmbH	50						
1108606	klindamütsiin, 600mg	J01FF01	CLINDAMYCIN - MIP 600, õhukese polümeerikattega tablett, 16TK	MIP Pharma GmbH	50						
1432268	klindamütsiin, 600mg	J01FF01	CLINDAMYCIN - MIP 600, õhukese polümeerikattega tablett, 32TK	MIP Pharma GmbH	50						
1527814	klindamütsiin+tretinoiin , 10mg+0,25mg 1g	D10AF82	TRECLINAC, geel, 30g 1TK	SIA Meda Pharma	50						
1005208	klobetasool, 500mcg 1g	D07AD01	DERMOVATE OINTMENT, salv, 25g 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
1005242	klobetasool, 500mcg 1g	D07AD01	DERMOVATE CREAM, kreem, 25g 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
1005286	klobetasool, 500mcg 1ml	D07AD01	DERMOVATE, nahalahus, 25ml 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
1011407	klomipramiin, 10mg	N06AA04	ANAFRANIL, kaetud tablett, 30TK	SIA "Novartis Baltics"	50						
1001462	klomipramiin, 25mg	N06AA04	ANAFRANIL, kaetud tablett, 30TK	SIA "Novartis Baltics"	50						
1011418	klomipramiin, 75mg	N06AA04	ANAFRANIL SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK	SIA "Novartis Baltics"	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1004544	klonasepaam, 2mg	N03AE01	RIVOTRIL, tablett, 30TK	Roche Eesti OÜ	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50	G20-G26, G63-G63					
1007345	kloorambutsiil, 2mg	L01AA02	LEUKERAN, õhukese polümeerikattega tablett, 25TK	Aspen Pharma Trading Limited	100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog				
					50						
1044357	klooramfenikool, 5mg 1ml	S01AA01	OFTAN AKVAKOL, silmatilgad, lahus, 10ml 1TK	Santen Oy	50						
1356937	kloormadinoon+etünüü löstradiool, 2mg+0,03mg	G03AA15	CLORMETIN 2 MG/0,03 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	UAB Exeltis Baltics	50						
					75	Z30-Z30				sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral	
1356948	kloormadinoon+etünüü löstradiool, 2mg+0,03mg	G03AA15	CLORMETIN 2 MG/0,03 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK	UAB Exeltis Baltics	50						
					75	Z30-Z30				sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral	
1006063	kloorprotikseen, 25mg	N05AF03	TRUXAL, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	H. LUNDBECK A/S	50						
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1006096	kloorprotikseen, 50mg	N05AF03	TRUXAL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	H. LUNDBECK A/S	50						
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
1040588	klopidogreel, 75mg	B01AC04	PLAVIX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sanofi Clir SNC	75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Sisearst, Kardioloog	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel
					50						
1065743	klopidogreel, 75mg	B01AC04	PLAVIX, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	Sanofi Clir SNC	50						
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Sisearst, Kardioloog	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel
1357141	klopidogreel, 75mg	B01AC04	TROMBEX 75 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Sisearst, Kardioloog	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1367197	klopidogreel, 75mg	B01AC04	CLOPIDOGREL SANOSWISS 75MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	UAB SanoSwiss	75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Sisearst, Kardioloog	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel
					50						
1369874	klopidogreel, 75mg	B01AC04	GLOPENEL 75MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Auxilia Pharma OÜ	50						
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Sisearst, Kardioloog	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel
1369908	klopidogreel, 75mg	B01AC04	GLOPENEL 75MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Auxilia Pharma OÜ	50						
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Sisearst, Kardioloog	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel
1371484	klopidogreel, 75mg	B01AC04	CLOPIDOGREL ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Kardioloog, Sisearst	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1371530	klopidogreel, 75mg	B01AC04	CLOPIDOGREL ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Actavis Group PTC ehf	75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Kardioloog, Sisearst	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
					50						
1431256	klopidogreel, 75mg	B01AC04	CLOPIDOGREL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Kardioloog, Sisearst	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
					50						
1437465	klopidogreel, 75mg	B01AC04	ZYLLT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Kardioloog, Sisearst	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
					50						
1437500	klopidogreel, 75mg	B01AC04	ZYLLT, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	KRKA d.d., Novo mesto	50		Kardioloog, Sisearst	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1448489	klopidogreel, 75mg	B01AC04	CLOPIDOGREL KRKA, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Kardioloog, Sisearst	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel
					50						
1004724	klosapiin, 100mg	N05AH02	LEPONEX, tablett, 50TK	BGP Products SIA	50						
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31					
1663859	klosapiin, 100mg	N05AH02	CLOZAPINE ACCORD, tablett, 50TK	Accord Healthcare Limited	100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1004768	klosapiin, 25mg	N05AH02	LEPONEX, tablett, 50TK	BGP Products SIA	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31					
1663657	klosapiin, 25mg	N05AH02	CLOZAPINE ACCORD, tablett, 30TK	Accord Healthcare Limited	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31					
					50						
1033692	klotrimasool, 1%/100mg	G01AF02	CANIFUG CREMOLUM, kreem + vaginaalsuposiit, 20g 1TK / 6TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1033726	klotrimasool, 100mg	G01AF02	CANIFUG CREMOLUM, vaginaalsuposiit, 6TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1045123	klotrimasool, 100mg	G01AF02	KLOTTRIMASOOL GSK, vaginaaltablett, 6TK	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	50						
1033737	klotrimasool, 200mg	G01AF02	CANIFUG CREMOLUM, vaginaalsuposiit, 3TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1140815	kodeiin+paratsetamool, 30mg+500mg	N02AJ06	PARACETAMOL/CODEINE VITABALANS, tablett, 30TK	VITABALANS OY	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1140826	kodeiin+paratsetamool , 30mg+500mg	N02AJ06	PARACETAMOL/CODEINE VITABALANS, tablett, 100TK	VITABALANS OY	50						
1485187	kodeiin+paratsetamool , 30mg+500mg	N02AJ06	ALGOCALM, tablett, 30TK	Zentiva k.s.	50						
1001631	kromoglütsiinhape, 40mg 1ml	S01GX01	LECROLYN, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Santen Oy	50						
1241356	kvetiapiin, 100mg	N05AH04	KETIPINOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1258297	kvetiapiin, 100mg	N05AH04	KVENTIAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1636792	kvetiapiin, 150mg	N05AH04	KVENTIAX SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Krka d.d. Novo Mesto	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1115086	kvetiapiin, 200mg	N05AH04	SEROQUEL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	AstraZeneca AB	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1241378	kvetiapiin, 200mg	N05AH04	KETIPINOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1258477	kvetiapiin, 200mg	N05AH04	KVENTIAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1301847	kvetiapiin, 200mg	N05AH04	QUETIAPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Teva Pharma B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1454059	kvetiapiin, 200mg	N05AH04	QUETIAPINE ACCORD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Accord Healthcare Limited	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1636859	kvetiapiin, 200mg	N05AH04	KVENTIAX SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Krka d.d. Novo Mesto	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1241334	kvetiapiin, 25mg	N05AH04	KETIPINOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1258208	kvetiapiin, 25mg	N05AH04	KVENTIAX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1258242	kvetiapiin, 25mg	N05AH04	KVENTIAX, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1377503	kvetiapiin, 25mg	N05AH04	QUETIAPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1274587	kvetiapiin, 300mg	N05AH04	SEROQUEL XR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	AstraZeneca UK Limited	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1301937	kvetiapiin, 300mg	N05AH04	QUETIAPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Teva Pharma B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1454149	kvetiapiin, 300mg	N05AH04	QUETIAPINE ACCORD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Accord Healthcare Limited	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1496998	kvetiapiin, 300mg	N05AH04	QUETIAPINE TEVA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Teva Pharma B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1636916	kvetiapiin, 300mg	N05AH04	KVENTIAX SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Krka d.d. Novo Mesto	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1274611	kvetiapiin, 400mg	N05AH04	SEROQUEL XR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	AstraZeneca UK Limited	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1454206	kvetiapiin, 400mg	N05AH04	QUETIAPINE ACCORD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Accord Healthcare Limited	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1497067	kvetiapiin, 400mg	N05AH04	QUETIAPINE TEVA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Teva Pharma B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1724510	kvetiapiin, 400mg	N05AH04	KVENTIAX SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Krka d.d. Novo Mesto	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1555253	kvetiapiin, 50mg	N05AH04	QUETIAPINE ACCORD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Accord Healthcare Limited	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1007828	labetalool, 100mg	C07AG01	TRANDATE, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Aspen Pharma Trading Limited	75 50	O10-O16					
1043042	lamivudiin, 100mg	J05AF05	ZEFFIX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
1025873	lamivudiin, 150mg	J05AF05	EPIVIR, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	ViiV Healthcare BV	50		Infektsionist				HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega
1379123	lamotrigiin, 100mg	N03AX09	LAMICTAL 100MG, närimis- /dispergeeruv tablett, 28TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
					100	F30-F31	Psühhiaater				
1394210	lamotrigiin, 25mg	N03AX09	LAMICTAL 25MG, närimis- /dispergeeruv tablett, 28TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
					100	F30-F31	Psühhiaater				
1379088	lamotrigiin, 50mg	N03AX09	LAMICTAL 50MG, närimis- /dispergeeruv tablett, 28TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					100	F30-F31	Psühhiaater				
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1394018	lamotrigiin, 5mg	N03AX09	LAMICTAL 5MG, närimis- /dispergeeruv tablett, 28TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
					100	F30-F31	Psühhiaater				
1235056	lantaan, 750mg	V03AE03	FOSRENOL, närimistablett, 90TK	Shire Pharmaceuticals Ireland Limited	100	N18-N18	Nefroloog, Pediaater				juhul, kui kaltsiumipõhine fosforisiduja on vastunäidustatud (seerumi kaltsiumisisaldus >2,54 mmol/l)
					50						
1041196	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE01	XALATAN, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1165733	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE01	GLAUMAX, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Kevelt AS	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1316438	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE01	LATANOPROST- RATIOPHARM, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	ratiopharm GmbH	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1316449	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE01	LATANOPROST- RATIOPHARM, silmatilgad, lahus, 2.5ml 3TK	ratiopharm GmbH	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1346790	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE01	LATANOPROST ACTAVIS, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1346802	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE01	LATANOPROST ACTAVIS, silmatilgad, lahus, 2.5ml 3TK	Actavis Group PTC ehf	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1377873	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE01	UNILAT, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Unimed Pharma spol. s.r.o.	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1385771	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE01	LATIZOLIL, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1073001	latsidipiin, 4mg	C08CA09	LACIPIL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1073023	latsidipiin, 4mg	C08CA09	LACIPIL, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1122567	latsidipiin, 6mg	C08CA09	LACIPIL 6MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	GlaxoSmithKline SpA	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1122578	latsidipiin, 6mg	C08CA09	LACIPIL 6MG, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	GlaxoSmithKline SpA	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1009921	leflunomiid, 10mg	L04AA13	ARAVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	50						
					75	M05-M06	Reumatoloog, Pediaater				kui mono- ja kombinatsioonravi metotreksaadi ja sulfasalasiiniga pole küllaldaselt efektiivne, on vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					75	M07-M07	Reumatoloog, Pediaater				kui metotreksaat pole küllaldaselt efektiivne, on vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1009932	leflunomiid, 20mg	L04AA13	ARAVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	75	M07-M07	Pediaater, Reumatoloog				kui metotreksaat pole küllaldaselt efektiivne, on vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
					75	M05-M06	Pediaater, Reumatoloog			kui mono- ja kombinatsioonravi metotreksaadi ja sulfasalasiiniga pole küllaldaselt efektiivne, on vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1299551	lenalidomiid, 10mg	L04AX04	REVLIMID, kõvakapsel, 21TK	Celgene Europe BV	100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti kolme hematoologi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müüjiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	C90-C90	Hematoloog				<p>kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)</p>

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1780411	lenalidomiid, 10mg	L04AX04	LENALIDOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 21TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C90-C90	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoologi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1299562	lenalidomiid, 15mg	L04AX04	REVLIMID, kõvakapsel, 21TK	Celgene Europe BV	100	C90-C90	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoologi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1780433	lenalidomiid, 15mg	L04AX04	LENALIDOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 21TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C90-C90	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoologi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1299573	lenalidomiid, 25mg	L04AX04	REVLIMID, kõvakapsel, 21TK	Celgene Europe BV	100	C90-C90	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoologi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1780455	lenalidomiid, 25mg	L04AX04	LENALIDOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 21TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C90-C90	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoologi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1299540	lenalidomiid, 5mg	L04AX04	REVLIMID, kõvakapsel, 21TK	Celgene Europe BV	100	C90-C90	Hematoloog				<p>kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoologi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)</p>

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti kolme hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1780376	lenalidomiid, 5mg	L04AX04	LENALIDOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 21TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C90-C90	Hematoloog				kuni haiguse progressseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoologi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)
1474950	lerkanidipiin, 10mg	C08CA13	LERCAPIN, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1611234	lerkanidipiin, 10mg	C08CA13	LERCANIDIPINE ACTAVIS 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1474994	lerkanidipiin, 20mg	C08CA13	LERCAPIN, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1611245	lerkanidipiin, 20mg	C08CA13	LERCANIDIPINE ACTAVIS 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Actavis Group PTC ehf	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1034334	letrosool, 2,5mg	L02BG04	FEMARA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	SIA "Novartis Baltics"	50						
					100	C50-C50	Üldkirurg, Günekoloog, Onkoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
1302398	letrosool, 2,5mg	L02BG04	LETROZOLE SANOSWISS 2,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	UAB SanoSwiss	100	C50-C50	Üldkirurg, Onkoloog, Günekoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
					50						
1349771	letrosool, 2,5mg	L02BG04	LETROZOLE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	C50-C50	Üldkirurg, Onkoloog, Günekoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
1409352	letrosool, 2,5mg	L02BG04	LETROZOLE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	100	C50-C50	Üldkirurg, Onkoloog, Günekoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
					50						
1554702	letrosool, 2,5mg	L02BG04	LORTANDA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					100	C50-C50	Onkoloog, Üldkirurg, Günekoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1198975	levetiratsetaam, 1000mg	N03AX14	KEPPRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	UCB Pharma SA	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad
1544981	levetiratsetaam, 1000mg	N03AX14	LEVETIRACETAM TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad
					50						
1545566	levetiratsetaam, 1000mg	N03AX14	LEVETIRACETAM ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1546130	levetiratsetaam, 1000mg	N03AX14	MATEVER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	PHARMATHEN S.A.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad
					50						
1198762	levetiratsetaam, 250mg	N03AX14	KEPPRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	UCB Pharma SA	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad
1544802	levetiratsetaam, 250mg	N03AX14	LEVETIRACETAM TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1545353	levetiratsetaam, 250mg	N03AX14	LEVETIRACETAM ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad
					50						
1545904	levetiratsetaam, 250mg	N03AX14	MATEVER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	PHARMATHEN S.A.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad
					50						
1198829	levetiratsetaam, 500mg	N03AX14	KEPPRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	UCB Pharma SA	50	G40-G40	Neuroloog	esmane			ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad
					100						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1495054	levetiratsetaam, 500mg	N03AX14	NORMEG 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad
1544868	levetiratsetaam, 500mg	N03AX14	LEVETIRACETAM TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad
					50						
1545421	levetiratsetaam, 500mg	N03AX14	LEVETIRACETAM ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1545960	levetiratsetaam, 500mg	N03AX14	MATEVER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	PHARMATHEN S.A.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad
1077049	levodopa+benserasiid, 100mg+25mg	N04BA80	MADOPAR, disperseeruv tablett, 100TK	Roche Eesti OÜ	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1082922	levodopa+benserasiid, 100mg+25mg	N04BA80	MADOPAR, kõvakapsel, 100TK	Roche Eesti OÜ	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1085161	levodopa+benserasiid, 100mg+25mg	N04BA80	MADOPAR HBS, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 100TK	Roche Eesti OÜ	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1002014	levodopa+benserasiid, 200mg+50mg	N04BA80	MADOPAR, tablett, 100TK	Roche Eesti OÜ	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1599611	levodopa+benserasiid, 200mg+50mg	N04BA80	MADOPAR, tablett, 100TK	First Pharma OÜ	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1560338	levodopa+karbidopa, 100mg+25mg	N04BA81	SINEMET 25/100, tablett, 56TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1006894	levodopa+karbidopa, 200mg+50mg	N04BA81	SINEMET CR 50/200 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1560349	levodopa+karbidopa, 250mg+25mg	N04BA81	SINEMET 25/250, tablett, 98TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1172854	levodopa+karbidopa+e ntakapoon, 100mg+25mg+200mg	N04BA03	STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1629716	levodopa+karbidopa+e ntakapoon, 100mg+25mg+200mg	N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/EN TACAPONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Teva Pharma B.V.	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1172898	levodopa+karbidopa+e ntakapoon, 150mg+37,5mg+200m g	N04BA03	STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1630257	levodopa+karbidopa+e ntakapoon, 150mg+37,5mg+200m g	N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/EN TACAPONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Teva Pharma B.V.	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1538580	levodopa+karbidopa+e ntakapoon, 175mg+43,75mg+200 mg	N04BA03	STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1368020	levodopa+karbidopa+e ntakapoon, 200mg+50mg+200mg	N04BA03	STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1630527	levodopa+karbidopa+e ntakapoon, 200mg+50mg+200mg	N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/EN TACAPONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1472228	levodopa+karbidopa+e ntakapoon, 75mg+18,75mg+200m g	N04BA03	STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1629974	levodopa+karbidopa+e ntakapoon, 75mg+18,75mg+200m g	N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/EN TACAPONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1549650	levonorgestreel, 13,5mg	G02BA03	FLEREE, intrauteriinne ravivahend, 1TK	Bayer AG	50						
1703955	levonorgestreel, 19,5mg	G02BA03	KYLEENA, intrauteriinne ravivahend, 1TK	Bayer AG	50						
1009493	levonorgestreel, 52mg	G02BA03	MIRENA, intrauteriinne ravivahend, 1TK	Bayer AG	50						
1621752	levonorgestreel+etünü ülöstradiol, 0,15mg+0,03mg	G03AA07	LEVERETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	UAB Exeltis Baltics	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1223064	levotsetirisiin, 0,5mg 1ml	R06AE09	XYZAL, suukaudne lahus, 200ml 1TK	UCB Pharma Oy Finland	50						
1138137	levotsetirisiin, 5mg	R06AE09	XYZAL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	UCB Pharma Oy Finland	50						
1512065	levotsetirisiin, 5mg	R06AE09	CEZERA 5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
1607240	liksisenatiid, 10mcg/20mcg 0.2ml	A10BJ03	LYXUMIA, süstelahus, 3ml 1TK / 3ml 1TK	sanofi-aventis groupe	50	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud
					75	E14-E14, E11-E11				II tüüpi diabeedi raviks rasvumusega patsientidel (KMI \geq 35kg/m ²), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes taluvates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1607228	liksisenatiid, 20mcg 0.2ml	A10BJ03	LYXUMIA, süstelahus, 3ml 2TK	sanofi-aventis groupe	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks rasvumusega patsientidel (KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes taluvates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud
					50	E14-E14, E11-E11				II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud	
1539288	linagliptiin, 5mg	A10BH05	TRAJENTA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1733071	linagliptiin+empagliflosi in, 5mg+10mg	A10BD19	GLYXAMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	E14-E14, E11-E11				II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud	
1733161	linagliptiin+empagliflosi in, 5mg+25mg	A10BD19	GLYXAMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						
1044469	lipaas+amülaas+prote aas, 10000TÜ+8000TÜ+60 0TÜ	A09AA02	KREON 10 000 U, gastroresistentne kõvakapsel, 20TK	Mylan Healthcare GmbH	100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1063763	lipaas+amülaas+prote aas, 10000TÜ+8000TÜ+60 0TÜ	A09AA02	KREON 10 000 U, gastroresistentne kõvakapsel, 50TK	Mylan Healthcare GmbH	50						
					100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
1020205	lipaas+amülaas+prote aas, 10000ühik+9000ühik+ 500ühik	A09AA02	PANGROL 10000, gastroresistentne kõvakapsel, 20TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1060434	lipaas+amülaas+prote aas, 20000ühik+12000ühik +900ühik	A09AA02	MEZYM 20 000, gastroresistentne tablett, 100TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1044470	lipaas+amülaas+prote aas, 25000TÜ+18000TÜ+1 000TÜ	A09AA02	KREON 25 000 U, gastroresistentne kõvakapsel, 20TK	Mylan Healthcare GmbH	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					50						
1063707	lipaas+amülaas+prote aas, 25000TÜ+18000TÜ+1 000TÜ	A09AA02	KREON 25 000 U, gastroresistentne kõvakapsel, 50TK	Mylan Healthcare GmbH	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1020182	lipaas+amülaas+prote aas, 25000ühik+22500ühik +1250ühik	A09AA02	PANGROL 25000, gastroresistentne kõvakapsel, 20TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50						
					100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1426845	liraglutiid, 6mg 1ml	A10BJ02	VICTOZA, süstelahus pen- süstlis, 3ml 2TK	Novo Nordisk A/S	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks rasvumusega patsientidel (KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes taluvates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud
					50	E14-E14, E11-E11				II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud	
1300598	lisinopriil+amlodipiin, 10mg+5mg	C09BB03	DIRONORM, tablett, 30TK	Gedeon Richter Plc.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1501456	lisinopriil+amlodipiin, 20mg+5mg	C09BB03	DIRONORM, tablett, 30TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1111284	lispro-insuliin, 100TÜ 1ml	A10AB04	HUMALOG, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					
1364510	lispro-insuliin, 100TÜ 1ml	A10AB04	HUMALOG KWIKPEN, süstelahus, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1364532	lispro-insuliin, 100TÜ 1ml	A10AD04	HUMALOG MIX25 KWIKPEN, süstesuspensioon, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1364554	lispro-insuliin, 100TÜ 1ml	A10AD04	HUMALOG MIX50 KWIKPEN, süstesuspensioon, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1754692	lispro-insuliin, 100TÜ 1ml	A10AB04	HUMALOG JUNIOR KWIKPEN, süstelahus pen- süstlis, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					
1713248	lispro-insuliin, 200TÜ 1ml	A10AB04	HUMALOG KWIKPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					
1063482	loperamiid, 2mg	A07DA03	IMODIUM, kõvakapsel, 20TK	McNeil Healthcare (Ireland) Limited	50						
1503571	loperamiid, 2mg	A07DA03	LOPACUT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	VITABALANS OY	50						
1284320	lopinaviir+ritonaviir, 200mg+50mg	J05AR10	KALETRA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	50		Infektsionist				HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega
1082472	lopinaviir+ritonaviir, 80mg+20mg 1ml	J05AR10	KALETRA, suukaudne lahus, 60ml 5TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	50		Infektsionist				HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega
1134638	lornoksikaam, 8mg	M01AC05	XEFO RAPID, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Takeda Pharma AS	50						
1147339	lornoksikaam, 8mg	M01AC05	XEFO RAPID, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Takeda Pharma AS	50						
1770522	lornoksikaam, 8mg	M01AC05	XEFO RAPID, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	First Pharma OÜ	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1207167	losartaan, 100mg	C09CA01	LOZAP 100, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva a.s.	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1210688	losartaan, 100mg	C09CA01	LOZAP 100, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Zentiva a.s.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1268962	losartaan, 100mg	C09CA01	LORISTA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1288256	losartaan, 100mg	C09CA01	LOSARTAN ACCORD 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1013735	losartaan, 50mg	C09CA01	LORISTA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1207134	losartaan, 50mg	C09CA01	LOZAP 50, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva a.s.	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1210701	losartaan, 50mg	C09CA01	LOZAP 50, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Zentiva a.s.	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1288245	losartaan, 50mg	C09CA01	LOSARTAN ACCORD 50 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1166059	losartaan+hüdrokloroti asiid, 50mg+12,5mg	C09DA01	LORISTA H, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1217809	losartaan+hüdrokloroti asiid, 50mg+12,5mg	C09DA01	LOZAP H, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1217810	losartaan+hüdrokloroti asiid, 50mg+12,5mg	C09DA01	LOZAP H, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1408597	losartaan+hüdrokloroti asiid, 50mg+12,5mg	C09DA01	LOSARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1185195	loteprednool, 0,5%	S01BA14	LOTEMAX, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	DR. GERHARD MANN CHEM.-PHARM. FABRIK GmbH	50						
7000175	L-tsitrulliin,		L-CITRULLINE , pulber, 100 g N1	SHS	50						
7017476	L-tsitrulliin,		L-CITRULLINE, pulber, 100g N10	SHS International Ltd	50						
1029417	lühikese toimeajaga humaaninsuliin, 100RÜ 1ml	A10AB01	HUMULIN R, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1479416	makrogool+naatriumsu lfaat, veevaba+naatriumklorii d+kaaliumkloriid+askor biinhape+naatriumask orbaat, 100g+7,5g+2,691g+1, 015g+0+0/0+0+0+0+4, 7g+5,9g	A06AD83	MOVIPREP, suukaudse lahuse pulber, 2TK / 2TK	Norgine BV	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1566480	mannitool, 40mg	R05CB16	BRONCHITOL, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 280TK	Pharmaxis Europe Limited	100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog				patsientidele, kellele ravi alfadornaasi ja hüpertoonilise soolalahusega on ebaefektiivne või talumatu. Ravi jätkatakse ravi alustamisel 3 ravikuu järel ja edaspidi 6- kuulise intervalliga hinnatuna, kui saavutatakse ravivastus ehk kopsufunktsioon (hinnatuna FEV1% eeldatavast) ei halvene. Soodustus ei kehti mannitooli ja alfadornaasi kooskasutamisel.
1007222	mebendasool, 100mg	P02CA01	VERMOX 100 MG, tablett, 6TK	Gedeon Richter Plc.	50						
1008245	mebendasool, 100mg	P02CA01	MEBENDAZOLE-GRINDEKS, tablett, 6TK	AS Grindeks	50						
1136696	mebeveriin, 200mg	A03AA04	DUSPATALIN, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	BGP Products SIA	50						
1013195	medroksüprogesteron , 500mg	L02AB02	FARLUTAL, tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C00-D48	Onkoloog				
					50						
1004410	melfalaan, 2mg	L01AA03	ALKERAN, õhukese polümeerikattega tablett, 25TK	Aspen Pharma Trading Limited	100	C00-D48	Onkoloog, Hematoloog				
					50						
1035021	meloksikaam, 15mg	M01AC06	MOVALIS, tablett, 20TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50						
1140680	meloksikaam, 15mg	M01AC06	MELOX 15MG, tablett, 20TK	Medochemie Ltd	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1149779	meloksikaam, 15mg	M01AC06	MEXOLAN 15 MG, tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						
1175936	meloksikaam, 15mg	M01AC06	RECOXA, tablett, 20TK	Zentiva k.s.	50						
1189199	meloksikaam, 15mg	M01AC06	LORMED 15 MG, tablett, 20TK	PRO. MED. CS. PRAHA a.s	50						
1240254	meloksikaam, 15mg	M01AC06	RECOXA, tablett, 60TK	Zentiva k.s.	50						
1360189	meloksikaam, 15mg	M01AC06	MELOXICAM-RATIOPHARM 15 MG, tablett, 20TK	ratiopharm GmbH	50						
1560260	meloksikaam, 15mg	M01AC06	MELOX 15MG, tablett, 60TK	Medochemie Ltd	50						
1035009	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	MOVALIS, tablett, 20TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50						
1140679	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	MELOX 7,5MG, tablett, 30TK	Medochemie Ltd	50						
1146350	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	MOVALIS, tablett, 50TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50						
1149746	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	MEXOLAN 7,5 MG, tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						
1360134	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	MELOXICAM-RATIOPHARM 7,5 MG, tablett, 20TK	ratiopharm GmbH	50						
1360156	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	MELOXICAM-RATIOPHARM 7,5 MG, tablett, 50TK	ratiopharm GmbH	50						
1560271	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	MELOX 7,5MG, tablett, 60TK	Medochemie Ltd	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1006007	melperoon, 25mg	N05AD03	BURONIL, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Medilink A/S	50						
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
1006030	melperoon, 50mg	N05AD03	BURONIL, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Medilink A/S	100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
1123524	memantiin, 10mg	N06DX01	AXURA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Merz Pharmaceuticals GmbH	50						
1123535	memantiin, 10mg	N06DX01	AXURA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Merz Pharmaceuticals GmbH	50						
1583636	memantiin, 10mg	N06DX01	COGNOMEM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	50						
1614563	memantiin, 10mg	N06DX01	MARIXINO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Krka, d.d., Novo mesto	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1614608	memantiin, 10mg	N06DX01	MARIXINO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Krka, d.d., Novo mesto	50						
1618747	memantiin, 10mg	N06DX01	MEMANTINE RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	ratiopharm GmbH	50						
1618781	memantiin, 10mg	N06DX01	MEMANTINE RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	ratiopharm GmbH	50						
1621998	memantiin, 10mg	N06DX01	MANTOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Medochemie Ltd.	50						
1622023	memantiin, 10mg	N06DX01	MANTOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Medochemie Ltd.	50						
1635331	memantiin, 10mg	N06DX01	MEMANTINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
1635375	memantiin, 10mg	N06DX01	MEMANTINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
1648739	memantiin, 10mg	N06DX01	MEMANTINE GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	AS Grindeks	50						
1621819	memantiin, 20mg	N06DX01	MANTOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Medochemie Ltd.	50						
1004971	merkaptopuriin, 50mg	L01BB02	PURI-NETHOL, tablett, 25TK	Aspen Pharma Trading Limited	50						
					100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog				
1023815	mesalasiin, 1g	A07EC02	PENTASA, rektaalsuposiit, 28TK	FERRING GmbH	50						
					75	K51-K51, K50-K50	Pediaater, Gastroenteroloog				
1352810	mesalasiin, 1g	A07EC02	PENTASA 1G, toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 50TK	FERRING GmbH	75	K51-K51, K50-K50	Pediaater, Gastroenteroloog				
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused	
1352854	mesalasiin, 2g	A07EC02	PENTASA 2G, toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 60TK	FERRING GmbH	75	K51-K51, K50-K50	Gastroenteroloog, Pediaater					
					50							
1146574	mesalasiin, 400mg	A07EC02	ASACOL 400MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 100TK	Tillotts Pharma AB	75	K51-K51, K50-K50	Gastroenteroloog, Pediaater					
					50							
1044863	mesalasiin, 4g	A07EC02	SALOFALK, rektaalsuspensioon, 7TK	Dr. Falk Pharma GmbH	75	K51-K51, K50-K50	Pediaater, Gastroenteroloog				põletikulise soolehaiguse ägenemise raviks	
					50							
1023826	mesalasiin, 500mg	A07EC02	PENTASA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	FERRING GmbH	50	K51-K51, K50-K50	Pediaater, Gastroenteroloog					
					75							
1146541	mesalasiin, 500mg	A07EC02	ASACOL, rektaalsuposiit, 20TK	Tillotts Pharma AB	50	K51-K51, K50-K50	Pediaater, Gastroenteroloog					
					75							
1184970	mesalasiin, 800mg	A07EC02	ASACOL 800 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 50TK	Tillotts Pharma AB	75	K51-K51, K50-K50	Gastroenteroloog, Pediaater					
					50							
1034109	metadoon, 1mg 1ml	N07BC02	METADON DAK 1 MG/ML, suukaudne lahus, 1000ml 1TK	Takeda Pharma AS	100	C00-D48	Neuroloog, Anestesioloog, Reumatoloog	esmane				esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul
					100	R52.1-R52.1						
					50							

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1684155	metadoon, 20mg	N07BC02	METADON DAK, tablett, 100TK	Takeda Pharma AS	100	R52.1-R52.1	Neuroloog, Reumatoloog, Anestesioloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul
					50						
					100	C00-D48					
1164798	metformiin, 1000mg	A10BA02	METFORAL 1000 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Laboratori Guidotti S.p.A.	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1302949	metformiin, 1000mg	A10BA02	METFOGAMMA 1000, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1568246	metformiin, 1000mg	A10BA02	METFORMIN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Teva Pharma B.V.	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1064719	metformiin, 500mg	A10BA02	METFORAL 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1083169	metformiin, 500mg	A10BA02	METFORMIN-RATIOPHARM 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1116380	metformiin, 500mg	A10BA02	METFOGAMMA 500, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1064731	metformiin, 850mg	A10BA02	METFORAL 850 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1083158	metformiin, 850mg	A10BA02	METFORMIN-RATIOPHARM 850 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	E14-E14, E11-E11					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1111262	metformiin, 850mg	A10BA02	METFOGAMMA 850, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1156609	metformiin, 850mg	A10BA02	METFORMIN SANDOZ 850 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Sandoz GmbH	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1637917	metformiin+dapagliflo- sin, 1000mg+5mg	A10BD15	XIGDUO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	AstraZeneca AB	50						
					75	E14-E14, E11-E11				kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m ²); kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud	
1637861	metformiin+dapagliflo- sin, 850mg+5mg	A10BD15	XIGDUO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	AstraZeneca AB	50						
					75	E14-E14, E11-E11				kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m ²); kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1687136	metformiin+empagliflo- iin, 1000mg+12,5mg	A10BD20	SYNJARDY, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	E14-E14, E11-E11					kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						
1686955	metformiin+empagliflo- iin, 1000mg+5mg	A10BD20	SYNJARDY, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	E14-E14, E11-E11					kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
1687046	metformiin+empagliflo- iin, 850mg+12,5mg	A10BD20	SYNJARDY, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	E14-E14, E11-E11					kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1686865	metformiin+empagliflo- siin, 850mg+5mg	A10BD20	SYNJARDY, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	E14-E14, E11-E11					kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI \geq 30kg/m ²); kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
1767731	metformiin+ertugliflosii- n, 1000mg+2,5mg	A10BD23	SEGLUROMET, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	50						
					75	E14-E14, E11-E11					kombinatsioonraviks rasvumisega patsientidel (KMI \geq 30kg/m ²); kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
1767876	metformiin+ertugliflosii- n, 1000mg+7,5mg	A10BD23	SEGLUROMET, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	50						
					75	E14-E14, E11-E11					kombinatsioonraviks rasvumisega patsientidel (KMI \geq 30kg/m ²); kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1590599	metformiin+linagliptiin, 1000mg+2,5mg	A10BD11	JENTADUETO, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						
1590465	metformiin+linagliptiin, 850mg+2,5mg	A10BD11	JENTADUETO, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						
1550326	metformiin+saksagliptii n, 1000mg+2,5mg	A10BD10	KOMBOGLYZE, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	AstraZeneca AB	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1550270	metformiin+saksagliptiin, 850mg+2,5mg	A10BD10	KOMBOGLYZE, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	AstraZeneca AB	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						
1361034	metformiin+sitagliptiin, 1000mg+50mg	A10BD07	JANUMET, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud. Soodustus kehtib patsientidele, kelle ravi sitagliptiini sisaldavate ravimpreparaatidega on alustatud enne 01.01.2019.a.
					50					ravimi väljakirjutamise õigus on patsientidele, kelle ravi sitagliptiini sisaldavate ravimpreparaatidega on alustatud enne 01.01.2019.a	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1360965	metformiin+sitagliptiin, 850mg+50mg	A10BD07	JANUMET, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	50						ravimi väljakirjutamise õigus on patsientidele, kelle ravi sitagliptiini sisaldavate ravimpreparaatidega on alustatud enne 01.01.2019.a
					75	E14-E14, E11-E11				II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud. Soodustus kehtib patsientidele, kelle ravi sitagliptiini sisaldavate ravimpreparaatidega on alustatud enne 01.01.2019.a.	
1349401	metformiin+vildagliptiin , 1000mg+50mg	A10BD08	EUCREAS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Novartis Europharm Limited	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1714968	metformiin+vildagliptiin , 1000mg+50mg	A10BD08	VILSPOX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
1720864	metformiin+vildagliptiin , 1000mg+50mg	A10BD08	DALTEX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Medochemie Ltd	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						
1349344	metformiin+vildagliptiin , 850mg+50mg	A10BD08	EUCREAS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Novartis Europharm Limited	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1714913	metformiin+vildagliptiin , 850mg+50mg	A10BD08	VILSPOX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	E14-E14, E11-E11				II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud	
1720796	metformiin+vildagliptiin , 850mg+50mg	A10BD08	DALTEX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Medochemie Ltd	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						
1000674	metoklopramiid, 10mg	A03FA01	CERUCAL, tablett, 50TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	C00-D48					
1699050	metoklopramiid, 10mg	A03FA01	METOCLOPRAMIDE ACCORD, tablett, 50TK	Accord Healthcare Limited	100	C00-D48					
					50						
1327643	metoksüpolüetüleenglü kool-beetaepoetiin, 100mcg 0.3ml	B03XA03	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Pediaater, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					100	D46-D46, D47.1- D47.1	Hematoloog				
					50						
1370540	metoksüpolüetüleenglü kool-beetaepoetiin, 120mcg 0.3ml	B03XA03	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	D46-D46, D47.1- D47.1	Hematoloog				
					50						
					100	D63-D63, T86-T86	Nefroloog, Pediaater, Uroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1327665	metoksüpolüetüleenglü kool-beetaepoetiin, 200mcg 0.3ml	B03XA03	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration GmbH	50						
					100	D46-D46, D47.1- D47.1	Hematoloog				
					100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Pediaater, Nefroloog			kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral	
1327621	metoksüpolüetüleenglü kool-beetaepoetiin, 50mcg 0.3ml	B03XA03	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration GmbH	50						
					100	D63-D63, T86-T86	Pediaater, Nefroloog, Uroloog			kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral	
					100	D46-D46, D47.1- D47.1	Hematoloog				
1327632	metoksüpolüetüleenglü kool-beetaepoetiin, 75mcg 0.3ml	B03XA03	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	D46-D46, D47.1- D47.1	Hematoloog				
					100	D63-D63, T86-T86	Pediaater, Uroloog, Nefroloog			kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral	
					50						
1010811	metoprolol, 100mg	C07AB02	EMZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva B.V.	75	I47-I49, I50-I50, I20- I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1019720	metoprolol, 100mg	C07AB02	BETALOC ZOK 100, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	AstraZeneca AB	50						
					75	I47-I49, I50-I50, I20- I20, I10-I13, I15-I15					
1224278	metoprolol, 100mg	C07AB02	METOZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I47-I49, I50-I50, I20- I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1224290	metoprolol, 100mg	C07AB02	METOZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I47-I49, I50-I50, I20- I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1282249	metoprolol, 100mg	C07AB02	METOPROLOL- RATIOPHARM RETARD 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	I47-I49, I50-I50, I20- I20, I10-I13, I15-I15					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1296592	metoprolol, 100mg	C07AB02	METOPROLOL POLPHARMA 100, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	Pharmaceutical Works Polpharma S.A.	50						
					75	I47-I49, I50-I50, I20- I20, I10-I13, I15-I15					
1672286	metoprolol, 100mg	C07AB02	BLOXAZOC 100, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Krka d.d. Novo Mesto	75	I47-I49, I50-I50, I20- I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1083406	metoprolol, 25mg	C07AB02	BETALOC ZOK 25, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	AstraZeneca AB	75	I47-I49, I50-I50, I20- I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1224201	metoprolol, 25mg	C07AB02	METOZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I47-I49, I50-I50, I20- I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1672130	metoprolol, 25mg	C07AB02	BLOXAZOC 25, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Krka d.d. Novo Mesto	75	I47-I49, I50-I50, I20- I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1009055	metoprolol, 50mg	C07AB02	METOPROLOL- RATIOPHARM 50 MG, tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	75	I47-I49, I50-I50, I20- I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1010800	metoprolol, 50mg	C07AB02	EMZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva B.V.	75	I47-I49, I50-I50, I20- I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1019719	metoprolol, 50mg	C07AB02	BETALOC ZOK 50, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	AstraZeneca AB	50						
					75	I47-I49, I50-I50, I20- I20, I10-I13, I15-I15					
1072190	metoprolol, 50mg	C07AB02	METOPROLOL STADA, tablett, 100TK	STADA Arzneimittel AG	75	I47-I49, I50-I50, I20- I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1224245	metoprolol, 50mg	C07AB02	METOZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I47-I49, I50-I50, I20- I20, I10-I13, I15-I15					
1224267	metoprolol, 50mg	C07AB02	METOZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I47-I49, I50-I50, I20- I20, I10-I13, I15-I15					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1282160	metoprolol, 50mg	C07AB02	METOPROLOL- RATIOPHARM RETARD 50 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	75	I47-I49, I50-I50, I20- I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1296491	metoprolol, 50mg	C07AB02	METOPROLOL POLPHARMA 50, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	Pharmaceutical Works Polpharma S.A.	75	I47-I49, I50-I50, I20- I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1672174	metoprolol, 50mg	C07AB02	BLOXAZOC 50, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Krka d.d. Novo Mesto	50						
					75	I47-I49, I50-I50, I20- I20, I10-I13, I15-I15					
1672242	metoprolol, 50mg	C07AB02	BLOXAZOC 50, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Krka d.d. Novo Mesto	50						
					75	I47-I49, I50-I50, I20- I20, I10-I13, I15-I15					
1001136	metotreksaat, 2,5mg	L04AX03	TREXAN, tablett, 100TK	Orion Corporation	75	M30-M35, M05- M08, M45-M46	Reumatoloog, Pediaater				
					100	C00-D48	Onkoloog, Hematoloog				
					50						
					75	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater				
1033658	metronidasool, 1g	G01AF01	ARILIN, vaginaalsuposiit, 2TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1033636	metronidasool, 250mg/100mg	P01AB01	ARILIN, õhukese polümeerikattega tablett + vaginaalsuposiit, 12TK / 6TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1008706	metronidasool, 500mg	P01AB01	METRONIDAZOL NYCOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Takeda Pharma AS	50						
1046180	metronidasool, 7,5mg 1g	D06BX01	ROZEX, geel, 30g 1TK	GALDERMA INTERNATIONAL	50						
1223749	metronidasool, 7,5mg 1g	D06BX01	METROSA, geel, 25g 1TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1396335	metüülfenidaat, 10mg	N06BA04	MEDIKINET XL 10MG, toimeainet modifitseeritud vabastav kõvakapsel, 30TK	MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20- aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1313569	metüülfenidaat, 18mg	N06BA04	CONCERTA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	UAB JOHNSON & JOHNSON	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20- aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1396368	metüülfenidaat, 20mg	N06BA04	MEDIKINET XL 20MG, toimeainet modifitseeritud vabastav kõvakapsel, 30TK	MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C- GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20- aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1396391	metüülfenidaat, 30mg	N06BA04	MEDIKINET XL 30MG, toimeainet modifitseeritud vabastav kõvakapsel, 30TK	MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20- aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1313581	metüülfenidaat, 36mg	N06BA04	CONCERTA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	UAB JOHNSON & JOHNSON	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20- aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1395266	metüülfenidaat, 40mg	N06BA04	MEDIKINET XL 40MG, toimeainet modifitseeritud vabastav kõvakapsel, 30TK	MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C- GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20- aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1313660	metüülfenidaat, 54mg	N06BA04	CONCERTA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	UAB JOHNSON & JOHNSON	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C- GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul.
1009099	metüülprednisoloon, 16mg	H02AB04	MEDROL, tablett, 50TK	Pfizer Europe MA EEIG	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46	Reumatoloog, Pediaater	esmane			
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20	Allergoloog-immunoloog, Dermatoveneroloog, Pediaater				
					50						
					75	N00-N08	Pediaater, Nefroloog				
					100	G35-G35	Neuroloog, Pediaater	esmane			
					75	K50-K51, K73-K74	Pediaater, Gastroenteroloog				
1009190	metüülprednisoloon, 40mg 1ml	H02AB04	DEPO-MEDROL, süstesuspensioon, 1ml 1TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	G35-G35	Pediaater, Neuroloog	esmane			
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46	Reumatoloog, Pediaater	esmane			
					50						
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater				
					100	Z94-Z94, T86-T86					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1065754	metüülprednisoloon, 4mg	H02AB04	MEDROL, tablett, 100TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
					75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10- L10, L20-L20	Allergoloog- immunoloog, Pediaater, Dermatoveneroloog				
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46	Pediaater, Reumatoloog	esmane			
					75	N00-N08	Pediaater, Nefrooloog				
					75	K50-K51, K73-K74	Pediaater, Gastroenteroloog				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
1028102	metüülprednisoloonats eponaat, 1mg 1g	D07AC14	ADVANTAN, kreem, 15g 1TK	Bayer AG	75	L23-L23, L20-L20	Allergoloog- immunoloog, Dermatoveneroloog, Pediaater	esmane			
					50						
					75	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater	esmane			
1062009	metüülprednisoloonats eponaat, 1mg 1g	D07AC14	ADVANTAN, salv, 15g 1TK	Bayer AG	50						
					75	L23-L23, L20-L20	Pediaater, Allergoloog- immunoloog, Dermatoveneroloog	esmane			
					75	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater	esmane			
1133356	metüülprednisoloonats eponaat, 1mg 1g	D07AC14	ADVANTAN MILK, nahaemulsioon, 20g 1TK	Bayer AG	75	L23-L23, L20-L20	Dermatoveneroloog, Pediaater, Allergoloog- immunoloog	esmane			
					50						
					75	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1764794	midostauriin, 25mg	L01XE39	RYDAPT, pehmekapsel, 56TK	Novartis Europharm Limited	100	C92-C92	Hematoloog				esmakordselt diagnoositud ägeda müeloidleukeemia ja FLT3 mutatsiooniga täiskasvanud patsientidele koos standardse antratsükliini ja tsütarabiini induktsioonkeemiaravi ga ning koos suures annuses tsütarabiini konsolideeriva keemiaraviga, millele täieliku ravivastuse korral järgneb säilitusravi ainult midostauriiniga
1024579	mikonasool, 20mg 1g	A01AB09	DAKTARIN, suukaudne geel, 40g 1TK	Johnson & Johnson UAB	50						
1604337	mirabegroon, 50mg	G04BD12	BETMIGA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Astellas Pharma Europe B.V.	50						
1181607	mirtasapiin, 15mg	N06AX11	MIRTASTAD 15 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	STADA Arzneimittel AG	50						
1243684	mirtasapiin, 15mg	N06AX11	MIRTAZAPIN ORION, suus dispergeeruv tablett, 30TK	Orion Corporation	50						
1273137	mirtasapiin, 15mg	N06AX11	MIRTAZAPIN ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 30TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1314683	mirtasapiin, 15mg	N06AX11	MIRZATEN Q-TAB, suus dispergeeruv tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
1170166	mirtasapiin, 30mg	N06AX11	ESPRITAL 30, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	50						
1181797	mirtasapiin, 30mg	N06AX11	MIRTASTAD 30 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	STADA Arzneimittel AG	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1243729	mirtasapiin, 30mg	N06AX11	MIRTAZAPIN ORION, suus dispergeeruv tablett, 30TK	Orion Corporation	50						
1273227	mirtasapiin, 30mg	N06AX11	MIRTAZAPIN ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 30TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1301522	mirtasapiin, 30mg	N06AX11	MIRZATEN Q-TAB, suus dispergeeruv tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
1243741	mirtasapiin, 45mg	N06AX11	MIRTAZAPIN ORION, suus dispergeeruv tablett, 30TK	Orion Corporation	50						
1154618	moksifloksatsiin, 400mg	J01MA14	AVELOX, õhukese polümeerikattega tablett, 5TK	Bayer AG	50	J44-J44, J41-J41, J47-J47, J13-J15					kui beetalaktaam- antibiootikum, tetratsükliin ja makroliid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud
1145999	moksonidiin, 0,2mg	C02AC05	MOXONIDINHEXAL 0,2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	HEXAL AG	50						
1155091	moksonidiin, 0,2mg	C02AC05	STADAPRESS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	STADA Arzneimittel AG	50						
1157778	moksonidiin, 0,2mg	C02AC05	MOXOGAMMA 0,2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	50						
1247598	moksonidiin, 0,2mg	C02AC05	MOXONIDIN ACTAVIS 0,2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1146079	moksonidiin, 0,3mg	C02AC05	MOXONIDINHEXAL 0,3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	HEXAL AG	50						
1157857	moksonidiin, 0,3mg	C02AC05	MOXOGAMMA 0,3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	50						
1247677	moksonidiin, 0,3mg	C02AC05	MOXONIDIN ACTAVIS 0,3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Actavis Group PTC ehf	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1013791	moksonidiin, 0,4mg	C02AC05	PHYSIOTENS 0,4 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Mylan Healthcare GmbH	50						
1146170	moksonidiin, 0,4mg	C02AC05	MOXONIDINHEXAL 0,4 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	HEXAL AG	50						
1155259	moksonidiin, 0,4mg	C02AC05	STADAPRESS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	STADA Arzneimittel AG	50						
1157947	moksonidiin, 0,4mg	C02AC05	MOXOGAMMA 0,4 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	50						
1247756	moksonidiin, 0,4mg	C02AC05	MOXONIDIN ACTAVIS 0,4 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1028933	mometasoon, 1mg 1g	D07AC13	ELOCON, nahalahus, 20ml 1TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	50						
					75	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog	esmane			
					75	L23-L23, L20-L20	Allergoloog- immunoloog, Pediaater, Dermatoveneroloog	esmane			
1028944	mometasoon, 1mg 1g	D07AC13	ELOCON, salv, 20g 1TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	50						
					75	L23-L23, L20-L20	Allergoloog- immunoloog, Pediaater, Dermatoveneroloog	esmane			
					75	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog	esmane			
1028955	mometasoon, 1mg 1g	D07AC13	ELOCON, kreem, 20g 1TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	75	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater	esmane			
					75	L23-L23, L20-L20	Allergoloog- immunoloog, Pediaater, Dermatoveneroloog	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1028966	mometasoon, 50mcg 1annust	R01AD09	NASONEX, ninasprei, suspensioon, 140annust 1TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	50						
1484298	mometasoon, 50mcg 1annust	R01AD09	NASOMETIN, ninasprei, suspensioon, 140annust 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1621224	mometasoon, 50mcg 1annust	R01AD09	BRESO, ninasprei, suspensioon, 140annust 1TK	UAB Norameda	50						
1193509	mometasoon+salitsüül hape, 1mg+50mg 1g	D07XC03	ELOSALIC, salv, 45g 1TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	50						
					75	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog	esmane			
					75	L23-L23, L20-L20	Dermatoveneroloog, Pediaater, Allergoloog- immunoloog	esmane			
1274116	montelukast, 10mg	R03DC03	MONTELUKAST TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	75	J45-J45			11,00		mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga
					50						
					75	J45-J45			11,00		
1289987	montelukast, 10mg	R03DC03	MONKASTA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	J45-J45			11,00		mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga
					50						
					75	J45-J45			11,00		
1496415	montelukast, 10mg	R03DC03	MONTELUKAST ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare Limited	75	J45-J45				11,00	
					75	J45-J45			11,00		mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1273722	montelukast, 4mg	R03DC03	MONTELUKAST TEVA, närimistablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	75	J45-J45				11,00	
					50						
					75	J45-J45			11,00		mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga
1289718	montelukast, 4mg	R03DC03	MONKASTA, närimistablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	J45-J45			11,00		mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga
					50						
					75	J45-J45			11,00		
1447084	montelukast, 4mg	R03DC03	MONTELUKAST ACCORD, närimistablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	J45-J45			11,00		mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga
					75	J45-J45			11,00		
1273845	montelukast, 5mg	R03DC03	MONTELUKAST TEVA, närimistablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	75	J45-J45				11,00	
					75	J45-J45			11,00		mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga
					50						
1289831	montelukast, 5mg	R03DC03	MONKASTA, närimistablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	J45-J45				11,00	
					50						
					75	J45-J45			11,00		mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1447242	montelukast, 5mg	R03DC03	MONTELUKAST ACCORD, närimistablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	75	J45-J45				11,00	
					75	J45-J45			11,00	mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga	
					50						
1035740	morfiin, 100mg	N02AA01	VENDAL RETARD 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	100	R52.1-R52.1	Anestesioloog, Neuroloog, Reumatoloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul
					50						
					100	C00-D48					
1035717	morfiin, 10mg	N02AA01	VENDAL RETARD 10 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						
					100	C00-D48					
					100	R52.1-R52.1	Neuroloog, Anestesioloog, Reumatoloog	esmane		esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul	
1382284	morfiin, 10mg	N02AA01	SEVREDOL, õhukese polümeerikatttega tablett, 60TK	MUNDIPHARMA Gesellschaft m.b.H.	50						
					100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Anestesioloog, Neuroloog	esmane		esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul	
					100	C00-D48					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1339376	morfiin, 120mg	N02AA01	MXL 120 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	MUNDIPHARMA Gesellschaft m.b.H.	100	C00-D48					
					100	R52.1-R52.1	Anestesioloog, Neuroloog, Reumatoloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul
					50						
1382307	morfiin, 20mg	N02AA01	SEVREDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	MUNDIPHARMA Gesellschaft m.b.H.	50						
					100	C00-D48					
					100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Neuroloog, Anestesioloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul
1043222	morfiin, 20mg 1ml	N02AA01	MORFIN DAK 20 MG/ML, süstelahus, 1ml 10TK	Takeda Pharma AS	100	C00-D48					
					50						
					100	R52.1-R52.1	Neuroloog, Anestesioloog, Reumatoloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1743421	morfiin, 20mg 1ml	N02AA01	MARACEX, süste- /infusioonilahus, 1ml 10TK	AS Kalceks	100	C00-D48					
					50						
					100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Anestesioloog, Neuroloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul
1035728	morfiin, 30mg	N02AA01	VENDAL RETARD 30 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	100	R52.1-R52.1	Neuroloog, Reumatoloog, Anestesioloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul
					50						
					100	C00-D48					
1080289	morfiin, 30mg	N02AA01	MST CONTINUS 30 MG, suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 30TK	MUNDIPHARMA Gesellschaft m.b.H.	100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Anestesioloog, Neuroloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul
					50						
					100	C00-D48					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1339422	morfiin, 30mg	N02AA01	MXL 30 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	MUNDIPHARMA Gesellschaft m.b.H.	50						
					100	C00-D48					
					100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Anestesioloog, Neuroloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul
1035739	morfiin, 60mg	N02AA01	VENDAL RETARD 60 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	100	C00-D48					
					100	R52.1-R52.1	Anestesioloog, Neuroloog, Reumatoloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul
					50						
1023556	mükofenoolhape, 250mg	L04AA06	CELLCEPT, kõvakapsel, 100TK	Roche Registration GmbH	100	Z94-Z94, T86-T86					
					50						
1164697	mükofenoolhape, 360mg	L04AA06	MYFORTIC, gastroresistentne tablett, 120TK	SIA "Novartis Baltics"	100	Z94-Z94, T86-T86					
					50						
1088344	mükofenoolhape, 500mg	L04AA06	CELLCEPT, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Roche Registration GmbH	50						
					100	Z94-Z94, T86-T86					
1276736	mükofenoolhape, 500mg	L04AA06	MYCOPHENOLATE MOFETIL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Accord Healthcare Limited	100	Z94-Z94, T86-T86					
					50						
1454879	naatriumbemipariin, 25000RÜ anti Xa 1ml	B01AB12	ZIBOR, süstelahus, 0.3ml 2TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
					100	O99.8-O99.8					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1455230	naatriumbemipariin, 25000RÜ anti Xa 1ml	B01AB12	ZIBOR, süstelahus, 0.4ml 2TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
					100	O99.8-O99.8					
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6				kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel	
1193127	naatriumbemipariin, 2500RÜ anti Xa 0.2ml	B01AB12	ZIBOR, süstelahus, 10TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	100	O99.8-O99.8					
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6				kuni 10 päevaks	
					50						
1193172	naatriumbemipariin, 3500RÜ anti Xa 0.2ml	B01AB12	ZIBOR, süstelahus, 10TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	100	O99.8-O99.8					
					50						
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6				kuni 10 päevaks	
					75	M17-M17, S72.7- S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16- M16, S72.0-S72.0				kuni 30 päevaks	
1065596	naatriumenoksapariin, 10000RÜ 1ml	B01AB05	CLEXANE, süstelahus süstlis, 1ml 2TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50						
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6				kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel	
					100	O99.8-O99.8					
1065529	naatriumenoksapariin, 2000RÜ 0.2ml	B01AB05	CLEXANE, süstelahus süstlis, 0.2ml 10TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50						
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6				kuni 10 päevaks	
					100	O99.8-O99.8					
1065541	naatriumenoksapariin, 4000RÜ 0.4ml	B01AB05	CLEXANE, süstelahus süstlis, 0.4ml 10TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50						
					75	M17-M17, S72.7- S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16- M16, S72.0-S72.0				kuni 30 päevaks	
					100	O99.8-O99.8					
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6				kuni 10 päevaks	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1065552	naatriumenoksapariin, 6000RÜ 0.6ml	B01AB05	CLEXANE, süstelahus süstlis, 0.6ml 2TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50						
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					100	O99.8-O99.8					
1065574	naatriumenoksapariin, 8000RÜ 0.8ml	B01AB05	CLEXANE, süstelahus süstlis, 0.8ml 2TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50						
					100	O99.8-O99.8					
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
1201521	naatriumfenüülbutüraat , 500mg	A16AX03	AMMONAPS, tablett, 250TK	Horizon Pharma Ireland Limited	100	E72.2-E72.2					konsiiliumi (vähemalt 2 pediaatri ühise) otsuse alusel järgmistel tingimustel: haigus kulgeb metaboolsete kriisidega vaatamata muule suukaudsele ravile; patsiendi prognoos paranemisele on hea (püsivat ajukahjustust või organpuudulikkust ei esine); ravi jätkatakse patsiendil, kellel 1 kuu kestnud ravi on andnud hea tulemuse (hüperammoneemilisi kriise ei ole esinenud või on nende sagedus oluliselt vähenenud)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1201543	naatriumfenüübutüraat , 940mg 1g	A16AX03	AMMONAPS, graanulid, 266g 1TK	Horizon Pharma Ireland Limited	100	E72.2-E72.2					konsiiliumi (vähemalt 2 pediaatri ühise) otsuse alusel järgmistel tingimustel: haigus kulgeb metaboolsete kriisidega vaatamata muule suukaudsele ravile; patsiendi prognoos paranemisele on hea (püsivat ajukahjustust või organpuudulikkust ei esine); ravi jätkatakse patsiendil, kellel 1 kuu kestnud ravi on andnud hea tulemuse (hüperammoneemilisi kriise ei ole esinenud või on nende sagedus oluliselt vähenenud)
1065822	naatriumlevotüroksiin, 100mcg	H03AA01	L-THYROXIN BERLIN- CHEMIE, tablett, 100TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	100	E89.0-E89.0, E03- E03, E89.3-E89.3					
					50						
1065866	naatriumlevotüroksiin, 50mcg	H03AA01	L-THYROXIN BERLIN- CHEMIE, tablett, 100TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50						
					100	E89.0-E89.0, E03- E03, E89.3-E89.3					
1035346	naatriumsulfaat, veevaba+kaaliumklorii d+naatriumkloriid+mak rogool+naatriumvesinik karbonaat, 5,7g+0,75g+1,46g+64 g+1,68g	A06AD81	FORTTRANS, suukaudse lahuse pulber, 4TK	Ipsen Pharma	50						
1023949	nabumetoon, 1g	M01AX01	RELIFEX, dispergeeruv tablett, 20TK	Meda AB	50						
1205479	nabumetoon, 1g	M01AX01	RELIFEX, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Meda AB	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1147902	naftidrofurüül, 100mg	C04AX21	ENELBIN 100 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK	Zentiva k.s.	50						
1147913	naftidrofurüül, 100mg	C04AX21	ENELBIN 100 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Zentiva k.s.	50						
1671263	naloksegool, 25mg	A06AH03	MOVENTIG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Kyowa Kirin Holdings B.V.	75	K59.0-K59.0					kroonilise opioid- indutseeritud kõhukinnisuse raviks patsiendile, kes kasutab igapäevaselt tugevatoimelist opiodi (morfiin, oksükodoon, fentanüül) ning kes ei ole vähemalt 2 kuu möödumisel opiodravi alustamisest saavutanud lahtistite abil piisavat raviefekti
1622731	naprokseen, 550mg	M01AE02	NALGESIN FORTE, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
1644713	naprokseen, 550mg	M01AE02	NALGESIN FORTE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
1437791	naprokseen+esomepra sool, 500mg+20mg	M01AE52	VIMOVO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	AstraZeneca AB	50						
1072437	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBILET, tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
					75	I10-I13, I47-I49, I15- I15, I50-I50					
1237429	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBIVOLOL STADA, tablett, 100TK	STADA Arzneimittel AG	75	I10-I13, I47-I49, I15- I15, I50-I50					
					50						
1259355	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBICARD 5MG, tablett, 60TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I10-I13, I47-I49, I15- I15, I50-I50					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused	
1259377	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBICARD 5MG, tablett, 90TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50							
					75	I10-I13, I47-I49, I15- I15, I50-I50						
1269862	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBIVOLOL ACTAVIS, tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	75	I10-I13, I47-I49, I15- I15, I50-I50						
					50							
1269907	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBIVOLOL ACTAVIS, tablett, 90TK	Actavis Group PTC ehf	75	I10-I13, I47-I49, I15- I15, I50-I50						
					50							
1284386	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBIVOLOL ORION, tablett, 30TK	Orion Corporation	50							
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13						
					75	I47-I49	Pediaater, Kardioloog	esmane				
1344259	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBIPHAR, tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	75	I10-I13, I47-I49, I15- I15, I50-I50						
					50							
1445149	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBILET, tablett, 90TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50							
					75	I10-I13, I47-I49, I15- I15, I50-I50						
1343001	nepafenak, 1mg 1ml	S01BC10	NEVANAC, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Novartis Europharm Limited	50						katarakti operatsiooni järgseks kuni 60 päevaseks raviks kaasuva diabeetilise retinopaatia esinemisel	
1072572	nifedipiin, 10mg	C08CA05	CORINFAR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Teva Pharma B.V.	50							
1005703	nifedipiin, 20mg	C08CA05	CORDIPIN RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	M34-M34	Reumatoloog, Pediaater	esmane				
					50							
					75	I10-I13, I15-I15, I20- I20, O10-O16						
					100	I27.0-I27.0						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1034301	nifedipiin, 20mg	C08CA05	CORINFAR RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	100	I27.0-I27.0					
					75	I10-I13, I15-I15, I20- I20, O10-O16					
					75	M34-M34	Pediaater, Reumatoloog	esmane			
					50						
1072550	nifedipiin, 20mg	C08CA05	CORINFAR RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	M34-M34	Pediaater, Reumatoloog	esmane			
					75	I10-I13, I15-I15, I20- I20, O10-O16					
					100	I27.0-I27.0					
1023422	nifedipiin, 40mg	C08CA05	CORDIPIN XL, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 20TK	KRKA d.d., Novo mesto	100	I27.0-I27.0					
					75	M34-M34	Pediaater, Reumatoloog	esmane			
					75	I10-I13, I15-I15, I20- I20, O10-O16					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1342190	nilotiniib, 200mg	L01XE08	TASIGNA, kõvakapsel, 112TK	Novartis Europharm Limited	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				<p>konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru nilotiniibravi foonil). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi nilotiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2009. a.</p>

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1670688	nintedaniib, 100mg	L01XE31	VARGATEF, pehmekapsel, 120TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	100	C34-C34	Onkoloog				patsiendile, kelle ravi alustamise nintedaniibiga on hinnanud konsilium (vähemalt 2 onkologi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamiseks lokaalselt levinud, metastaatilise või lokaalselt retsidiveerunud adenokartsinoomi histoloogilise leiuga mitteväikerakk- kopsuvähiga täiskasvanud patsientide raviks pärast esimese valiku keemiaravi, kui patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-1 ECOG järgi), kombinatsioonis dotsetakseeliga (4 kuni 6 ravikuuri) ning soodsa raviefekti püsimisel monoteraapiana kuni haiguse progresseerumiseni

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1675571	nintedaniib, 100mg	L01XE31	OFEV, pehmekapsel, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1670699	nintedaniib, 150mg	L01XE31	VARGATEF, pehmekapsel, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	100	C34-C34	Onkoloog				patsiendile, kelle ravi alustamise nintedaniibiga on hinnanud konsilium (vähemalt 2 onkologi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamiseks lokaalselt levinud, metastaatilise või lokaalselt retsidiveerunud adenokartsinoomi histoloogilise leiuga mitteväikerakk- kopsuvähiga täiskasvanud patsientide raviks pärast esimese valiku keemiaravi, kui patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-1 ECOG järgi), kombinatsioonis dotsetakseeliga (4 kuni 6 ravikuuri) ning soodsa raviefekti püsimisel monoteraapiana kuni haiguse progresseerumiseni

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1675593	nintedaniib, 150mg	L01XE31	OFEV, pehmekapsel, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.
1261842	nitrendipiin, 10mg	C08CA08	NITRESAN 10 MG, tablett, 50TK	PRO.MED.CS Praha a.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1014545	nitrendipiin, 20mg	C08CA08	LUSOPRESS, tablett, 28TK	Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.A.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1261886	nitrendipiin, 20mg	C08CA08	NITRESAN 20 MG, tablett, 50TK	PRO.MED.CS Praha a.s.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1003857	nitrofurantoiin, 50mg	J01XE01	NITROFURANTOIN NYCOMED, tablett, 20TK	Takeda Pharma AS	50						
1131589	norelgestromiin+etüünü ülöstradiool, 6mg+0,6mg	G03AA13	EVRA, transdermaalne plaaster, 3TK	Janssen-Cilag International N.V.	50						
1175464	noretisteroon+östradio ol, 0,5mg+1mg	G03FA01	ACTIVEELLE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novo Nordisk A/S	50						
1731013	noretisteroon+östradio ol, 0,5mg+1mg	G03FA01	ACTIVEELLE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	First Pharma OÜ	50						
1030453	noretisteroon+östradio ol, 0+1mg/1mg+2mg/0+2 mg	G03FB05	TRISEQUENS, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK / 10TK / 12TK	Novo Nordisk A/S	50						
					100	E89.4-E89.4, E28.3- E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Günekoloog, Endokrinoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
1116560	noretisteroon+östradio ol, 1mg+1mg/0+1mg	G03FB05	NOVOFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK / 16TK	Novo Nordisk A/S	100	E89.4-E89.4, E28.3- E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Endokrinoloog, Günekoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1030464	noretisteroon+östradio ol, 1mg+2mg	G03FA01	KLIOGEST, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novo Nordisk A/S	50						
1005455	norfloksatsiin, 400mg	J01MA06	NOLICIN, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
1005927	nortriptüliin, 25mg	N06AA10	NORITREN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	H. LUNDBECK A/S	100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					75	G62.0-G62.0, G63- G63					
					50						
1012374	ofloksatsiin, 200mg	J01MA01	MEDOFLOXINE 200 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Medochemie Ltd.	50						
1089402	ofloksatsiin, 200mg	J01MA01	OFLOXIN 200, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Zentiva k.s.	50						
1009673	okskarbesepiin, 300mg	N03AF02	TRILEPTAL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	SIA "Novartis Baltics"	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1036044	okskarbesepiin, 300mg	N03AF02	APYDAN 300 MG, tablett, 50TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1326855	okskarbesepiin, 300mg	N03AF02	OXCARBAZEPINE TEVA 300 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Teva Pharma B.V.	50	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					100						
1009684	okskarbesepiin, 600mg	N03AF02	TRILEPTAL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	SIA "Novartis Baltics"	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1036033	okskarbesepiin, 600mg	N03AF02	APYDAN 600 MG, tablett, 50TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1326989	okskarbesepiin, 600mg	N03AF02	OXCARBAZEPINE TEVA 600 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Teva Pharma B.V.	50	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					100						
1028483	oksübutüniin, 5mg	G04BD04	DRIPTANE, tablett, 60TK	BGP Products SIA	75	N31-N31	Pediaater, Neuroloog, Uroloog	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1730764	oksübutüniin, 5mg	G04BD04	DRIPTANE, tablett, 60TK	Globalex Pharma OÜ	75	N31-N31	Uroloog, Pediaater, Neuroloog	esmane			
					50						
1402568	oksükodoon, 10mg	N02AA05	OXYCONTIN 10 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	MUNDIPHARMA Gesellschaft m.b.H.	100	R52.1-R52.1	Neuroloog, Anestesioloog, Reumatoloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					50						
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1416293	oksükodoon, 10mg	N02AA05	DOLOCODON 10 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 56TK	Zentiva k.s.	100	R52.1-R52.1	Anestesioloog, Reumatoloog, Neuroloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					50						
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1526576	oksükodoon, 10mg	N02AA05	OXYCODONE VITABALANS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	VITABALANS OY	100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					50						
					100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Anestesioloog, Neuroloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1402580	oksükodoon, 20mg	N02AA05	OXYCONTIN 20 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	MUNDIPHARMA Gesellschaft m.b.H.	100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					100	R52.1-R52.1	Neuroloog, Reumatoloog, Anestesioloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1416440	oksükodoon, 20mg	N02AA05	DOLOCODON 20 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 56TK	Zentiva k.s.	100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					50						
					100	R52.1-R52.1	Neuroloog, Reumatoloog, Anestesioloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1402603	oksükodoon, 40mg	N02AA05	OXYCONTIN 40 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	MUNDIPHARMA Gesellschaft m.b.H.	50						
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					100	R52.1-R52.1	Neuroloog, Anestesioloog, Reumatoloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1416541	oksükodoon, 40mg	N02AA05	DOLOCODON 40 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 56TK	Zentiva k.s.	100	R52.1-R52.1	Neuroloog, Anestesioloog, Reumatoloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					100	C00-D48				patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist	
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1526554	oksükodoon, 5mg	N02AA05	OXYCODONE VITABALANS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	VITABALANS OY	100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					50						
					100	R52.1-R52.1	Neuroloog, Anestesioloog, Reumatoloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1402625	oksükodoon, 80mg	N02AA05	OXYCONTIN 80 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	MUNDIPHARMA Gesellschaft m.b.H.	100	R52.1-R52.1	Neuroloog, Reumatoloog, Anestesioloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					100	C00-D48				patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist	
					50						
1267714	olansapiin, 10mg	N05AH03	OLANZAPIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1289516	olansapiin, 10mg	N05AH03	OLANZAPINE ACTAVIS, suus disperseeruv tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1326259	olansapiin, 10mg	N05AH03	ZALASTA, tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1326507	olansapiin, 10mg	N05AH03	ZALASTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1342820	olansapiin, 10mg	N05AH03	OLANZAPINE TEVA, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Teva B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1354294	olansapiin, 10mg	N05AH03	OLANZAPINE ACCORD 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare Limited	50	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					100						
1404481	olansapiin, 10mg	N05AH03	OLANZAPINE ORION 10 MG, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Orion Corporation	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1289572	olansapiin, 15mg	N05AH03	OLANZAPINE ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					100						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1326552	olansapiin, 15mg	N05AH03	ZALASTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1342886	olansapiin, 15mg	N05AH03	OLANZAPINE TEVA, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Teva B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1354351	olansapiin, 15mg	N05AH03	OLANZAPINE ACCORD 15 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare Limited	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1404559	olansapiin, 15mg	N05AH03	OLANZAPINE ORION 15 MG, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Orion Corporation	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1267455	olansapiin, 5mg	N05AH03	OLANZAPIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1289459	olansapiin, 5mg	N05AH03	OLANZAPINE ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1326406	olansapiin, 5mg	N05AH03	ZALASTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1342763	olansapiin, 5mg	N05AH03	OLANZAPINE TEVA, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Teva B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1354104	olansapiin, 5mg	N05AH03	OLANZAPINE ACCORD 5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare Limited	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1404414	olansapiin, 5mg	N05AH03	OLANZAPINE ORION 5 MG, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Orion Corporation	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1771196	olapariib, 100mg	L01XX46	LYNPARZA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	AstraZeneca AB	100	C48-C48, C57.0- C57.0, C56-C56	Onkoloog				monoteraapiaks retsivedeerunud BRCA mutatsiooniga (idurakuline või somaatiline) madalalt diferentseerunud seroosse epiteeliale munasarja-, munajuha või primaarse peritoneaalvähiga täiskasvanud patsientide säilitusraviks, keda on eelnevalt ravitud kahe või enama plaatinaapõhise keemiaraviga ning kes on saanud osalise või täieliku ravivastuse viimasele plaatinaapõhisele keemiaravile. Soodustus kehtib alates 21. ravinädalast ega laiene patsientidele, kelle ravi olapariibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. juulit 2017. a ning patsientidele, kellele ravim esimese 20 ravinädala jooksul positiivset toimet ei avalda.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1771219	olapariib, 150mg	L01XX46	LYNPARZA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	AstraZeneca AB	100	C48-C48, C57.0- C57.0, C56-C56	Onkoloog				monoteraapiaks retsivedeerunud BRCA mutatsiooniga (idurakuline või somaatiline) madalalt diferentseerunud seroosse epiteeliale munasarja-, munajuha või primaarse peritoneaalvähiga täiskasvanud patsientide säilitusraviks, keda on eelnevalt ravitud kahe või enama plaatina põhise keemiaraviga ning kes on saanud osalise või täieliku ravivastuse viimasele plaatina põhisele keemiaravile. Soodustus kehtib alates 21. ravinädalast ega laiene patsientidele, kelle ravi olapariibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. juulit 2017. a ning patsientidele, kellele ravim esimese 20 ravinädala jooksul positiivset toimet ei avalda.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1673995	olapariib, 50mg	L01XX46	LYNPARZA, kõvakapsel, 448TK	AstraZeneca AB	100	C48-C48, C57.0- C57.0, C56-C56	Onkoloog				monoteraapiaks retsidiiveerunud BRCA mutatsiooniga (idurakuline või somaatiline) madalalt diferentseerunud seroosse epiteliaalse munasarja-, munajuha või primaarse peritoneaalvähiga täiskasvanud patsientide säilitusraviks, keda on eelnevalt ravitud kahe või enama plaatina põhise keemiaraviga ning kes on saanud osalise või täieliku ravivastuse viimasele plaatina põhisele keemiaravile. Soodustus kehtib alates 21. ravinädalast ega laiene patsientidele, kelle ravi olapariibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. juulit 2017. a ning patsientidele, kellele ravim esimese 20 ravinädala jooksul positiivset toimet ei avalda.
1407664	olmesartaanmedokso miil, 10mg	C09CA08	OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1676459	olmesartaanmedokso miil, 10mg	C09CA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare Limited	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1407833	olmesartaanmedokso miil, 20mg	C09CA08	OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1676538	olmesartaanmedokso miil, 20mg	C09CA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare Limited	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1407934	olmesartaanmedokso miil, 40mg	C09CA08	OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1676617	olmesartaanmedokso miil, 40mg	C09CA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare Limited	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1727434	olmesartaanmedokso miil+amlodipiin, 20mg+5mg	C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare Limited	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1308563	olmesartaanmedokso miil+amlodipiin, 40mg+10mg	C09DB02	SANORAL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1720628	olmesartaanmedokso miil+amlodipiin, 40mg+10mg	C09DB02	OLSSA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Krka d.d. Novo Mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1727232	olmesartaanmedokso miil+amlodipiin, 40mg+10mg	C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINE ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1727579	olmesartaanmedokso miil+amlodipiin, 40mg+10mg	C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare Limited	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1308451	olmesartaanmedokso miil+amlodipiin, 40mg+5mg	C09DB02	SANORAL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1720538	olmesartaanmedokso miil+amlodipiin, 40mg+5mg	C09DB02	OLSSA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Krka d.d. Novo Mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1727175	olmesartaanmedokso miil+amlodipiin, 40mg+5mg	C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINE ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1727502	olmesartaanmedokso miil+amlodipiin, 40mg+5mg	C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare Limited	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1452866	olmesartaanmedokso miil+amlodipiin+hüdrok lorotiasiid, 40mg+10mg+12,5mg	C09DX03	SANORAL HCT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1452709	olmesartaanmedokso miil+amlodipiin+hüdrok lorotiasiid, 40mg+5mg+12,5mg	C09DX03	SANORAL HCT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1530672	olmesartaanmedokso miil+hüdroklorotiasiid, 20mg+12,5mg	C09DA08	CO-OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1530762	olmesartaanmedokso miil+hüdroklorotiasiid, 20mg+25mg	C09DA08	CO-OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1648481	olodaterool+tiotroopium, 2,5mcg+2,5mcg 1pihustus	R03AL06	SPIOLTO RESPIMAT, inhalatsioonilahus, 60pihustus 1TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					50						
1140220	olopatadiin, 1mg 1ml	S01GX09	OPATANOL, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Novartis Europharm Limited	50						
1674716	ombitasviir+paritapreviir+ritonaviir, 12,5mg+75mg+50mg	J05AP53	VIEKIRAX, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	B18.2-B18.2	Infektsionist, Gastroenteroloog				1. ja 4. genotüübi kroonilise progresseeruva C- viirushepatiidi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel esineb mõõdukas või raske maksafibroos (F2-4) ja kompenseeritud maksahaigus ning sõltumata maksafibroosi astmest patsientidele, kellel kaasuvalt esineb krüoglobulineemia (D89.1), kaasasündinud verehaigus (D56-D57; D66-D68) või kellel on maksasiirik (Z94.4)
1062166	omeprasool, 20mg	A02BC01	OMEPRAZOLE- RATIOPHARM, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	ratiopharm GmbH	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1062201	omeprasool, 20mg	A02BC01	GASEC GASTROCAPS 20 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1269222	omeprasool, 20mg	A02BC01	OMEPRASOOL 20MG, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1269244	omeprasool, 20mg	A02BC01	OMEPRASOOL 20MG, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1352393	omeprasool, 20mg	A02BC01	OMEPRASOOL STADA 20 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	STADA Arzneimittel AG	50	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					75						
1423077	omeprasool, 20mg	A02BC01	ULTOP, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	50	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					75						
1516250	omeprasool, 20mg	A02BC01	GASEC GASTROCAPS 20 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK	Teva B.V.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1112825	omeprasool, 40mg	A02BC01	GASEC GASTROCAPS 40 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Teva B.V.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1269301	omeprasool, 40mg	A02BC01	OMEPRASOOL 40MG, gastroresistentne kõvakapsel, 15TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1269323	omeprasool, 40mg	A02BC01	OMEPRASOOL 40MG, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1269345	omeprasool, 40mg	A02BC01	OMEPRASOOL 40MG, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					75						
1137372	oomega-3-rasvhappe etüülestrid 90, 1000mg	C10AX80	OMACOR, pehmekapsel, 28TK	BASF AS	50						
1110643	oseltamiviir, 75mg	J05AH02	TAMIFLU, kõvakapsel, 10TK	Roche Registration GmbH	50						
1649088	oseltamiviir, 75mg	J05AH02	EBILFUMIN, kõvakapsel, 10TK	Actavis Group PTC ehf	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1710379	osimertiniib, 40mg	L01XE35	TAGRISSO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	AstraZeneca AB	100	C34-C34	Onkoloog				monoteraapiaks lokaalselt levinud või metastaatilise epidermaalse kasvufaktori retseptori (EGFR) T790M- mutatsioonpositiivse mitteväikerakk kopsuvähiga patsientidele, kelle haigus on progresseerunud pärast ravi EGFR- türosiini kinaasi inhibiitoritega
1710380	osimertiniib, 80mg	L01XE35	TAGRISSO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	AstraZeneca AB	100	C34-C34	Onkoloog				monoteraapiaks lokaalselt levinud või metastaatilise epidermaalse kasvufaktori retseptori (EGFR) T790M- mutatsioonpositiivse mitteväikerakk kopsuvähiga patsientidele, kelle haigus on progresseerunud pärast ravi EGFR- türosiini kinaasi inhibiitoritega

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1696068	panobinostaat, 10mg	L01XX42	FARYDAK, kõvakapsel, 6TK	Novartis Europharm Limited	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				<p>kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise panobinostaadiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoologi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamiseks kombinatsioonis bortesomiibi ja deksametasooniga, retsiveerunud ja/või refraktaarse hulgemüeloomiga täiskasvanud patsientidele, keda on varasemalt ravitud vähemalt kahe raviskeemiga, sealhulgas bortesomiibi ja immuunomoduleeriva ravimiga ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi panobinostaadiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. aprilli 2018. a.</p>

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1696091	panobinostaat, 15mg	L01XX42	FARYDAK, kõvakapsel, 6TK	Novartis Europharm Limited	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				kuni haiguse progressseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise panobinostaadiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoologi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamiseks kombinatsioonis bortesomiibi ja deksametasooniga, retsidiveerunud ja/või refraktaarse hulgimüeloomiga täiskasvanud patsientidele, keda on varasemalt ravitud vähemalt kahe raviskeemiga, sealhulgas bortesomiibi ja immuunomoduleeriva ravimiga ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi panobinostaadiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. aprilli 2018. a.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1696125	panobinostaat, 20mg	L01XX42	FARYDAK, kõvakapsel, 6TK	Novartis Europharm Limited	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				<p>kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise panobinostaadiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoologi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamiseks kombinatsioonis bortesomiibi ja deksametasooniga, retsiveerunud ja/või refraktaarse hulgemüeloomiga täiskasvanud patsientidele, keda on varasemalt ravitud vähemalt kahe raviskeemiga, sealhulgas bortesomiibi ja immuunomoduleeriva ravimiga ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi panobinostaadiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. aprilli 2018. a.</p>

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1043020	pantoprasool, 20mg	A02BC02	CONTROLOC 20 MG, gastroresistentne tablett, 14TK	Takeda GmbH	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1249758	pantoprasool, 20mg	A02BC02	NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 14TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1249770	pantoprasool, 20mg	A02BC02	NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1277232	pantoprasool, 20mg	A02BC02	PANTOPRAZOLE ACTAVIS, gastroresistentne tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1418813	pantoprasool, 20mg	A02BC02	OZZION, gastroresistentne tablett, 28TK	Zentiva k.s.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1441178	pantoprasool, 20mg	A02BC02	PANTOPRAZOLE-MEPHA, gastroresistentne tablett, 14TK	Teva B.V.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1441189	pantoprasool, 20mg	A02BC02	PANTOPRAZOLE-MEPHA, gastroresistentne tablett, 28TK	Teva B.V.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1537006	pantoprasool, 20mg	A02BC02	PANTOPRAZOLE-MEPHA, gastroresistentne tablett, 56TK	Teva B.V.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1043031	pantoprasool, 40mg	A02BC02	CONTROLOC 40 MG, gastroresistentne tablett, 14TK	Takeda GmbH	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1249646	pantoprasool, 40mg	A02BC02	NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 14TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1249668	pantoprasool, 40mg	A02BC02	NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1277344	pantoprasool, 40mg	A02BC02	PANTOPRAZOLE ACTAVIS, gastroresistentne tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1280449	pantoprasool, 40mg	A02BC02	PANTOPRAZOL - RATIOPHARM 40 MG, gastroresistentne tablett, 14TK	ratiopharm GmbH	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1418835	pantoprasool, 40mg	A02BC02	OZZION, gastroresistentne tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1441190	pantoprasool, 40mg	A02BC02	PANTOPRAZOLE-MEPHA, gastroresistentne tablett, 14TK	Teva B.V.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1441202	pantoprasool, 40mg	A02BC02	PANTOPRAZOLE-MEPHA, gastroresistentne tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1537028	pantoprasool, 40mg	A02BC02	PANTOPRAZOLE-MEPHA, gastroresistentne tablett, 56TK	Teva B.V.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1299405	parikaltsitool, 1mcg	H05BX02	ZEMPLAR, pehmekapsel, 28TK	AbbVie SIA	100	N18-N18	Pediaater, Nefroloog				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi teiste vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust <=300 pg/ml ei saavutata)
					50						
1299438	parikaltsitool, 2mcg	H05BX02	ZEMPLAR, pehmekapsel, 28TK	AbbVie SIA	50	N18-N18	Nefroloog, Pediaater				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi teiste vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust <=300 pg/ml ei saavutata)
					100						
1060232	paroksetiin, 20mg	N06AB05	SEROXAT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					100						
1096837	paroksetiin, 20mg	N06AB05	REXETIN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Gedeon Richter Plc.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1110799	paroksetiin, 20mg	N06AB05	PAROXETIN HEXAL 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	HEXAL AG	50	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					100						
1185072	paroksetiin, 20mg	N06AB05	PAROXETIN ACTAVIS 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Actavis Group PTC ehf	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1244900	paroksetiin, 20mg	N06AB05	ARKETIS 20 MG, tablett, 30TK	Medochemie Ltd	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2- F32.3	Psühhiaater	esmane			
1110834	paroksetiin, 40mg	N06AB05	PAROXETIN HEXAL 40 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	HEXAL AG	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2- F32.3	Psühhiaater	esmane			
1245103	paroksetiin, 40mg	N06AB05	ARKETIS 40 MG, tablett, 30TK	Medochemie Ltd	100	F33.2-F33.3, F32.2- F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1482027	pasopaniib, 200mg	L01XE11	VOTRIENT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Novartis Europharm Limited	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi esimese rea ravina või teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine pasopaniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1482050	pasopaniib, 400mg	L01XE11	VOTRIENT, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Novartis Europharm Limited	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi esimese rea ravina või teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kelle ravi alustamine ja jätkamine pasopaniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
1009404	pentoksüfülliin, 400mg	C04AD03	TRENTAL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Takeda GmbH	50						
1147980	pentoksüfülliin, 400mg	C04AD03	PENTILIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
1028854	pentoksüfülliin, 600mg	C04AD03	VASONIT RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK	G.L. Pharma GmbH	50						
1473409	pentoksüfülliin, 600mg	C04AD03	VASONIT RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	G.L. Pharma GmbH	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1168422	perindopriil, 10mg	C09AA04	PRESTARIUM ARGININE 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1302860	perindopriil, 4mg	C09AA04	STOPRESS, tablett, 30TK	Pharmaceutical Works Polpharma S.A.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1377233	perindopriil, 4mg	C09AA04	PRENESSA, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1168310	perindopriil, 5mg	C09AA04	PRESTARIUM ARGININE 5MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1302871	perindopriil, 8mg	C09AA04	STOPRESS, tablett, 30TK	Pharmaceutical Works Polpharma S.A.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1377312	perindopriil, 8mg	C09AA04	PRENESSA, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1289101	perindopriil+amlodipiin, 10mg+10mg	C09BB04	COVERAM, tablett, 30TK	Les Laboratories Servier	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15					
1602852	perindopriil+amlodipiin, 10mg+10mg	C09BB04	PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA, tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	75	I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15					
					50						
1288953	perindopriil+amlodipiin, 10mg+5mg	C09BB04	COVERAM, tablett, 30TK	Les Laboratories Servier	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15					
1603000	perindopriil+amlodipiin, 10mg+5mg	C09BB04	PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA, tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	75	I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15					
					50						
1499250	perindopriil+amlodipiin, 4mg+10mg	C09BB04	DALNESSA, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo Mesto	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1499003	perindopriil+amlodipiin, 4mg+5mg	C09BB04	DALNESSA, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo Mesto	75	I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15					
					50						
1288818	perindopriil+amlodipiin, 5mg+10mg	C09BB04	COVERAM, tablett, 30TK	Les Laboratories Servier	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15					
1602953	perindopriil+amlodipiin, 5mg+10mg	C09BB04	PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA, tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15					
1288672	perindopriil+amlodipiin, 5mg+5mg	C09BB04	COVERAM, tablett, 30TK	Les Laboratories Servier	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15					
1602908	perindopriil+amlodipiin, 5mg+5mg	C09BB04	PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA, tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	75	I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15					
					50						
1499126	perindopriil+amlodipiin, 8mg+10mg	C09BB04	DALNESSA, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo Mesto	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15					
1499069	perindopriil+amlodipiin, 8mg+5mg	C09BB04	DALNESSA, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo Mesto	75	I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15					
					50						
1588079	perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 10mg+10mg+2,5mg	C09BX01	TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1588091	perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 10mg+10mg+2,5mg	C09BX01	TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Les Laboratoires Servier	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1588024	perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 10mg+5mg+2,5mg	C09BX01	TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1588046	perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 10mg+5mg+2,5mg	C09BX01	TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Les Laboratoires Servier	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1602481	perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 4mg+10mg+1,25mg	C09BX01	CO-DALNESSA, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1602571	perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 4mg+5mg+1,25mg	C09BX01	CO-DALNESSA, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1587977	perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 5mg+10mg+1,25mg	C09BX01	TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1587999	perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 5mg+10mg+1,25mg	C09BX01	TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1587922	perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 5mg+5mg+1,25mg	C09BX01	TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1587944	perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 5mg+5mg+1,25mg	C09BX01	TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Les Laboratoires Servier	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1602683	perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 8mg+10mg+2,5mg	C09BX01	CO-DALNESSA, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1602795	perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 8mg+5mg+2,5mg	C09BX01	CO-DALNESSA, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1339488	perindopriil+indapamiid , 10mg+2,5mg	C09BA04	NOLITERAX 10 MG/2,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratories Servier	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1686720	perindopriil+indapamiid , 10mg+2,5mg	C09BA04	PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1229587	perindopriil+indapamiid , 2,5mg+0,625mg	C09BA04	NOLIPREL ARGININE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratories Servier	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1544374	perindopriil+indapamiid , 2,5mg+0,625mg	C09BA04	PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1600647	perindopriil+indapamiid , 2,5mg+0,625mg	C09BA04	PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1407068	perindopriil+indapamiid , 2mg+0,625mg	C09BA04	CO-PRENESSA, tablett, 30TK	Krka, d.d., Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1407158	perindopriil+indapamiid , 4mg+1,25mg	C09BA04	CO-PRENESSA, tablett, 30TK	Krka, d.d., Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1229879	perindopriil+indapamiid , 5mg+1,25mg	C09BA04	NOLIPREL FORTE ARGININE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratories Servier	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1544486	perindopriil+indapamiid , 5mg+1,25mg	C09BA04	PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1600670	perindopriil+indapamiid , 5mg+1,25mg	C09BA04	PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1407248	perindopriil+indapamiid , 8mg+2,5mg	C09BA04	CO-PRENESSA, tablett, 30TK	Krka, d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1104680	pimekroliimus, 10mg 1g	D11AH02	ELIDEL, kreem, 15g 1TK	SIA Meda Pharma	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1563454	pioglitason, 15mg	A10BG03	PIOGLITAZONE ACCORD, tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
1498495	pioglitason, 30mg	A10BG03	ZIPION 30MG, tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
					75	E14-E14, E11-E11				II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud.	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1563555	pioglitason, 30mg	A10BG03	PIOGLITAZONE ACCORD, tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
1563757	pioglitason, 45mg	A10BG03	PIOGLITAZONE ACCORD, tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					75	E14-E14, E11-E11				II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud	
1023343	piratsetaam, 800mg	N06BX03	NOOTROPIL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	UCB Pharma Oy Finland	50	G25.3-G25.3					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1518881	pirfenidoon, 267mg	L04AX05	ESBRIET, kõvakapsel, 252TK	Roche Registration GmbH	100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast ja haigus püsib ravi käigus stabiilsena (FVC muutus on mõõdetud ning selle langus ei ületa 10% 12 kuu kohta). Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.
1750801	pirfenidoon, 801mg	L04AX05	ESBRIET, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	Roche Registration GmbH	100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast ja haigus püsib ravi käigus stabiilsena (FVC muutus on mõõdetud ning selle langus ei ületa 10% 12 kuu kohta). Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.
1039889	piroksikaam, 20mg	M01AC01	BREXIN, tablett, 20TK	Chiesi Pharmaceuticals GmbH	50						
1039890	piroksikaam, 20mg	M01AC01	BREXIN, suukaudse lahuse pulber, 20TK	Chiesi Pharmaceuticals GmbH	50						
1033681	podofüllotoksiin, 5mg 1ml	D06BB04	WARTEC, nahalahus, 3ml 1TK	Stiefel Laboratories Legacy (Ireland) Limited	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1271775	polüstürensulfonaat, 949mg 1g	V03AE01	SORBISTERIT, suukaudse/rektaalsuspensioo ni pulber, 500g 1TK	Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH	100	N18-N18					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1622203	pomalidomiid, 1mg	L04AX06	IMNOVID, kõvakapsel, 21TK	Celgene Europe BV	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				<p>kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoologi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsidiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgemüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsidiveerunud, ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi pomalidomiidiga on</p>

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.01.2018.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1622214	pomalidomiid, 2mg	L04AX06	IMNOVID, kõvakapsel, 21TK	Celgene Europe BV	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				<p>kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoologi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsidiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgemüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsidiveerunud, ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi pomalidomiidiga on</p>

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.01.2018.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1622225	pomalidomiid, 3mg	L04AX06	IMNOVID, kõvakapsel, 21TK	Celgene Europe BV	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				<p>kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoologi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgemüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsiveerunud, ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi pomalidomiidiga on</p>

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.01.2018.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1622236	pomalidomiid, 4mg	L04AX06	IMNOVID, kõvakapsel, 21TK	Celgene Europe BV	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				<p>kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoologi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsidiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgemüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsidiveerunud, ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi pomalidomiidiga on</p>

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.01.2018.
1646175	posakonasool, 100mg	J02AC04	NOXAFIL, gastroresistentne tablett, 24TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	100	B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44					vereloome tüvirakkude siirdamisega seotud transplantaat- peremehe-vastu haiguse, ägeda müeloidse leukeemia, ägeda lümfoblastse leukeemia või müelodüsplastilise sündroomi intensiivsest keemiaravist tingitud mükoosi profülaktikaks
1218866	posakonasool, 40mg 1ml	J02AC04	NOXAFIL, suukaudne suspensioon, 105ml 1TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	100	B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44					vereloome tüvirakkude siirdamisega seotud transplantaat- peremehe-vastu haiguse, ägeda müeloidse leukeemia, ägeda lümfoblastse leukeemia või müelodüsplastilise sündroomi intensiivsest keemiaravist tingitud mükoosi profülaktikaks
1323256	pramipeksool, 0,088mg	N04BC05	EZAPREV 0,088 MG, tablett, 30TK	UAB Norameda	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1339332	pramipeksool, 0,088mg	N04BC05	PRAMIPEXOLE ORION, tablett, 30TK	Orion Corporation	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1041253	pramipeksool, 0,18mg	N04BC05	MIRAPEXIN, tablett, 30TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1323267	pramipeksool, 0,18mg	N04BC05	EZAPREV 0,18 MG, tablett, 30TK	UAB Norameda	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1339354	pramipeksool, 0,18mg	N04BC05	PRAMIPEXOLE ORION, tablett, 30TK	Orion Corporation	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1450998	pramipeksool, 0,26mg	N04BC05	MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1451023	pramipeksool, 0,52mg	N04BC05	MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1637210	pramipeksool, 0,52mg	N04BC05	OPRYMEA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1041264	pramipeksool, 0,7mg	N04BC05	MIRAPEXIN, tablett, 30TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1323313	pramipeksool, 0,7mg	N04BC05	EZAPREV 0,7 MG, tablett, 100TK	UAB Norameda	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1339400	pramipeksool, 0,7mg	N04BC05	PRAMIPEXOLE ORION, tablett, 30TK	Orion Corporation	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1373824	pramipeksool, 0,7mg	N04BC05	OPRYMEA, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1451067	pramipeksool, 1,05mg	N04BC05	MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1637265	pramipeksool, 1,05mg	N04BC05	OPRYMEA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1451135	pramipeksool, 2,1mg	N04BC05	MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1637344	pramipeksool, 2,1mg	N04BC05	OPRYMEA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1451168	pramipeksool, 3,15mg	N04BC05	MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1677719	pramipeksool, 3,15mg	N04BC05	OPRYMEA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1026201	pravastatiin, 20mg	C10AA03	LIPOSTAT 20 MG, tablett, 30TK	Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft.	75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					100	N18-N18					alates III staadiumist
					50						
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1118034	pravastatiin, 20mg	C10AA03	PRAVAHEXAL 20 MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
					50						
					100	N18-N18				alates III staadiumist	
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
1118056	pravastatiin, 40mg	C10AA03	PRAVAHEXAL 40 MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					100	N18-N18				alates III staadiumist	
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1065776	prednisoloon, 5mg	H02AB06	PREDNISOLON-RICHTER, tablett, 100TK	Gedeon Richter Plc.	75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10- L10, L20-L20	Dermatoveneroloog, Pediaater, Allergoloog- immunoloog				
					75	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater				
					75	N00-N08	Pediaater, Nefroloog				
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46	Pediaater, Reumatoloog	esmane			
					50						
					75	K50-K51, K73-K74	Pediaater, Gastroenteroloog				
					100	C00-D48					
					100	G70-G70	Pediaater, Neuroloog	esmane			
					100	E89.6-E89.6, E27- E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25	Pediaater, Endokrinoloog	esmane			
					75	J45-J45					
100	D59-D59, D69-D69, D60-D64	Hematoloog, Pediaater	esmane								
1031702	prednisoloon+salitsüül hape, 0,2%+0,4%	D07XA81	ALPICORT, nahalahus, 100ml 1TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1655513	pregabaliin, 150mg	N03AX16	PRAGIOLA, kõvakapsel, 14TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					75	G63.2-G63.2	Endokrinoloog, Neuroloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müüjiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1655546	pregabaliin, 150mg	N03AX16	PRAGIOLA, kõvakapsel, 56TK	KRKA d.d., Novo mesto	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					75	G63.2-G63.2	Endokrinoloog, Neuroloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neurooloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1656446	pregabaliin, 150mg	N03AX16	PREGABALIN TEVA, kõvakapsel, 14TK	Teva B.V.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					75	G63.2-G63.2	Neuroloog, Endokrinoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müüjiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1657795	pregabaliin, 150mg	N03AX16	BRIEKA, kõvakapsel, 14TK	Actavis Group PTC ehf	75	G63.2-G63.2	Neuroloog, Endokrinoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane		kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1657829	pregabaliin, 150mg	N03AX16	BRIEKA, kõvakapsel, 56TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					75	G63.2-G63.2	Endokrinoloog, Neuroloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1693122	pregabaliin, 150mg	N03AX16	PREGABALIN ZENTIVA, kõvakapsel, 14TK	Zentiva k.s.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					75	G63.2-G63.2	Endokrinoloog, Neuroloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1693133	pregabaliin, 150mg	N03AX16	PREGABALIN ZENTIVA, kõvakapsel, 56TK	Zentiva k.s.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
					75	G63.2-G63.2	Neuroloog, Endokrinoloog	esmane		ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1695663	pregabaliin, 150mg	N03AX16	PREGABALIN ACCORD, kõvakapsel, 56TK	Accord Healthcare S.L.U.	75	G63.2-G63.2	Neuroloog, Endokrinoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane		kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid	
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1701997	pregabaliin, 150mg	N03AX16	PREGABALIN ACCORD HEALTHCARE, kõvakapsel, 14TK	Accord Healthcare Limited	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
					75	G63.2-G63.2	Endokrinoloog, Neuroloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müüjiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1702011	pregabaliin, 150mg	N03AX16	PREGABALIN ACCORD HEALTHCARE, kõvakapsel, 56TK	Accord Healthcare Limited	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					75	G63.2-G63.2	Neuroloog, Endokrinoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neurooloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1739606	pregabaliin, 150mg	N03AX16	PREGABALIN ZENTIVA k.s, kõvakapsel, 14TK	Zentiva k.s.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
					75	G63.2-G63.2	Endokrinoloog, Neuroloog	esmane		ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1739617	pregabaliin, 150mg	N03AX16	PREGABALIN ZENTIVA k.s, kõvakapsel, 56TK	Zentiva k.s.	50						
					75	G63.2-G63.2	Neuroloog, Endokrinoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1655760	pregabaliin, 300mg	N03AX16	PRAGIOLA, kõvakapsel, 14TK	KRKA d.d., Novo mesto	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					75	G63.2-G63.2	Neuroloog, Endokrinoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neurooloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1655355	pregabaliin, 75mg	N03AX16	PRAGIOLA, kõvakapsel, 14TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	G63.2-G63.2	Endokrinoloog, Neuroloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1655388	pregabaliin, 75mg	N03AX16	PRAGIOLA, kõvakapsel, 56TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					75	G63.2-G63.2	Neuroloog, Endokrinoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1656334	pregabaliin, 75mg	N03AX16	PREGABALIN TEVA, kõvakapsel, 14TK	Teva B.V.	75	G63.2-G63.2	Neuroloog, Endokrinoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müüjiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1657290	pregabaliin, 75mg	N03AX16	PREGAGAMMA, kõvakapsel, 14TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	75	G63.2-G63.2	Endokrinoloog, Neuroloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müüjiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1657346	pregabaliin, 75mg	N03AX16	PREGAGAMMA, kõvakapsel, 56TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	75	G63.2-G63.2	Neuroloog, Endokrinoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1657717	pregabaliin, 75mg	N03AX16	BRIEKA, kõvakapsel, 14TK	Actavis Group PTC ehf	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
					75	G63.2-G63.2	Neuroloog, Endokrinoloog	esmane		ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1657740	pregabaliin, 75mg	N03AX16	BRIEKA, kõvakapsel, 56TK	Actavis Group PTC ehf	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
					75	G63.2-G63.2	Endokrinoloog, Neuroloog	esmane		ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1693043	pregabaliin, 75mg	N03AX16	PREGABALIN ZENTIVA, kõvakapsel, 14TK	Zentiva k.s.	50						
					75	G63.2-G63.2	Endokrinoloog, Neuroloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1693065	pregabaliin, 75mg	N03AX16	PREGABALIN ZENTIVA, kõvakapsel, 56TK	Zentiva k.s.	75	G63.2-G63.2	Endokrinoloog, Neuroloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane		kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid	
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1695461	pregabaliin, 75mg	N03AX16	PREGABALIN ACCORD, kõvakapsel, 56TK	Accord Healthcare S.L.U.	75	G63.2-G63.2	Endokrinoloog, Neuroloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane		kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid	
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müüjiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1701830	pregabaliin, 75mg	N03AX16	PREGABALIN ACCORD HEALTHCARE, kõvakapsel, 14TK	Accord Healthcare Limited	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					75	G63.2-G63.2	Endokrinoloog, Neuroloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1701852	pregabaliin, 75mg	N03AX16	PREGABALIN ACCORD HEALTHCARE, kõvakapsel, 56TK	Accord Healthcare Limited	75	G63.2-G63.2	Endokrinoloog, Neuroloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane		kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid	
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1739550	pregabaliin, 75mg	N03AX16	PREGABALIN ZENTIVA k.s, kõvakapsel, 14TK	Zentiva k.s.	75	G63.2-G63.2	Neuroloog, Endokrinoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid	
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1739572	pregabaliin, 75mg	N03AX16	PREGABALIN ZENTIVA k.s, kõvakapsel, 56TK	Zentiva k.s.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
					75	G63.2-G63.2	Endokrinoloog, Neuroloog	esmane		ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti	
1077027	primidoon, 250mg	N03AA03	LISKANTIN, tablett, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1020126	propafenoon, 150mg	C01BC03	RYTMONORM, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Mylan Healthcare GmbH	50						
1044526	propafenoon, 150mg	C01BC03	PROPANORM 150 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	PRO.MED.CS Praha a.s.	50						
1704833	propafenoon, 150mg	C01BC03	PROPAFENONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare Limited	50						
1020137	propafenoon, 300mg	C01BC03	RYTMONORM, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Mylan Healthcare GmbH	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1704888	propafenoon, 300mg	C01BC03	PROPAFENONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare Limited	50						
1053223	propranolool, 40mg	C07AA05	PROPRA-RATIOPHARM 40 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	ratiopharm GmbH	75	I15-I15, I10-I13, I47-I49					
					50						
1596944	propranolool, 40mg	C07AA05	PROPRANOLOL ACCORD 40MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Accord Healthcare Limited	75	I15-I15, I10-I13, I47-I49					
					50						
1028696	propüülitiouratsiil, 50mg	H03BA02	TIOTIL, tablett, 100TK	Leyh Pharma GmbH	50						
1078310	pseudoefedriin+loratadiin, 240mg+10mg	R01BA89	CLARINASE, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 7TK	UAB Bayer	50						
1141311	pseudoefedriin+tsetirisiin, 120mg+5mg	R01BA93	CIRRUS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 14TK	UCB Pharma Oy Finland	50						
1074451	püridostigmiinbromiid, 60mg	N07AA02	KALYMIN 60 N, tablett, 100TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	G70-G70	Pediaater, Neuroloog	esmane			
1664647	püridostigmiinbromiid, 60mg	N07AA02	MESTINON, kaetud tablett, 150TK	Meda Pharma SIA	100	G70-G70	Neuroloog, Pediaater	esmane			
					50						
1059218	ramipriil, 10mg	C09AA05	CARDACE, tablett, 28TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1153527	ramipriil, 10mg	C09AA05	RAMICOR 10 MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1169939	ramipriil, 10mg	C09AA05	RAMIPRIL ACTAVIS 10MG, tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1190078	ramipriil, 10mg	C09AA05	AMPRIIL 10 MG, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1190090	ramipriil, 10mg	C09AA05	AMPRIIL 10 MG, tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1217977	ramipriil, 10mg	C09AA05	RAMICOR 10 MG, tablett, 60TK	HEXAL AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1502345	ramipriil, 10mg	C09AA05	CARDACE, tablett, 56TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1583423	ramipriil, 10mg	C09AA05	RAMIPRIIL ACTAVIS 10MG, tablett, 90TK	Actavis Group PTC ehf	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1005826	ramipriil, 2,5mg	C09AA05	CARDACE 2,5 MG, tablett, 28TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1074743	ramipriil, 2,5mg	C09AA05	CARDACE 2,5 MG, tablett, 98TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1153381	ramipriil, 2,5mg	C09AA05	RAMICOR 2,5 MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1189953	ramipriil, 2,5mg	C09AA05	AMPRIIL 2,5 MG, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1005859	ramipriil, 5mg	C09AA05	CARDACE 5 MG, tablett, 28TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1074754	ramipriil, 5mg	C09AA05	CARDACE 5 MG, tablett, 98TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1153459	ramipriil, 5mg	C09AA05	RAMICOR 5 MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1169849	ramipriil, 5mg	C09AA05	RAMIPRIL ACTAVIS 5MG, tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1190034	ramipriil, 5mg	C09AA05	AMPRIIL 5 MG, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1190056	ramipriil, 5mg	C09AA05	AMPRIIL 5 MG, tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1217966	ramipriil, 5mg	C09AA05	RAMICOR 5 MG, tablett, 60TK	HEXAL AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1502198	ramipriil, 5mg	C09AA05	CARDACE 5 MG, tablett, 56TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1583412	ramipriil, 5mg	C09AA05	RAMIPRIL ACTAVIS 5MG, tablett, 90TK	Actavis Group PTC ehf	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1510467	ramipriil+amlodipiin, 10mg+10mg	C09BB07	RAMDACORDIA, kõvakapsel, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15					
1712483	ramipriil+amlodipiin, 10mg+10mg	C09BB07	RAMEAM, kõvakapsel, 30TK	Krka, d.d., Novo mesto	75	I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15					
					50						
1510388	ramipriil+amlodipiin, 10mg+5mg	C09BB07	RAMDACORDIA, kõvakapsel, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15					
1712539	ramipriil+amlodipiin, 10mg+5mg	C09BB07	RAMEAM, kõvakapsel, 30TK	Krka, d.d., Novo mesto	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1510423	ramipriil+amlodipiin, 5mg+10mg	C09BB07	RAMDACORDIA, kõvakapsel, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15					
					50						
1712674	ramipriil+amlodipiin, 5mg+10mg	C09BB07	RAMEAM, kõvakapsel, 30TK	Krka, d.d., Novo mesto	75	I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15					
					50						
1510344	ramipriil+amlodipiin, 5mg+5mg	C09BB07	RAMDACORDIA, kõvakapsel, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15					
1712720	ramipriil+amlodipiin, 5mg+5mg	C09BB07	RAMEAM, kõvakapsel, 30TK	Krka, d.d., Novo mesto	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15					
1512953	ramipriil+hüdroklorotia siid, 10mg+12,5mg	C09BA05	CARDACE FORTE, tablett, 56TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1513022	ramipriil+hüdroklorotia siid, 10mg+25mg	C09BA05	CARDACE FORTE, tablett, 56TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1021936	ramipriil+hüdroklorotia siid, 2,5mg+12,5mg	C09BA05	CARDACE COMP, tablett, 28TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1113657	ramipriil+hüdroklorotia siid, 2,5mg+12,5mg	C09BA05	CO-RAMICOR 2,5 MG/12,5 MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1190269	ramipriil+hüdroklorotia siid, 2,5mg+12,5mg	C09BA05	AMPRIHL 2,5MG/12,5MG, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1113680	ramipriil+hüdroklorotia siid, 5mg+25mg	C09BA05	CO-RAMICOR 5 MG/25 MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1141715	ramipriil+hüdroklorotia siid, 5mg+25mg	C09BA05	CARDACE PLUS, tablett, 28TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1190179	ramipriil+hüdroklorotiasiid, 5mg+25mg	C09BA05	AMPRIIL HD 5MG/25MG, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1134986	ranitidiin, 150mg	A02BA02	RANISAN 150 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	PRO.MED.CS Praha a.s.	50						
1581599	ranitidiin, 150mg	A02BA02	RANITIDINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare Limited	50						
1582028	ranitidiin, 300mg	A02BA02	RANITIDINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare Limited	50						
1361652	ranolasiin, 375mg	C01EB18	RANEXA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I50-I50	Kardioloog	esmane			III-IV funktsionaalne klass, kellel esinevad stenokardilised kaebused vaatamata adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega nitropreparaat) või kellel need ravimid on vastunäidustatud ja kelle puhul on kardioloogide konsiilium, kuhu on kaasatud vähemalt üks regionaalhaigla kardiokirurg või invasiivkardioloog, otsustanud et revaskulariseerimine ei ole võimalik

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1361674	ranolasiin, 500mg	C01EB18	RANEXA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I50-I50	Kardioloog	esmane			III-IV funktsionaalne klass, kellel esinevad stenokardilised kaebused vaatamata adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta- adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega nitropreparaat) või kellel need ravimid on vastunäidustatud ja kelle puhul on kardioloogide konsiilium, kuhu on kaasatud vähemalt üks regionaalhaigla kardiokirurg või invasiivkardioloog, otsustanud et revaskulariseerimine ei ole võimalik

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1361685	ranolasiin, 750mg	C01EB18	RANEXA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I50-I50	Kardioloog	esmane			III-IV funktsionaalne klass, kellel esinevad stenokardilised kaebused vaatamata adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta- adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega nitropreparaat) või kellel need ravimid on vastunäidustatud ja kelle puhul on kardioloogide konsiilium, kuhu on kaasatud vähemalt üks regionaalhaigla kardiokirurg või invasiivkardioloog, otsustanud et revaskulariseerimine ei ole võimalik
1203422	rasagiliin, 1mg	N04BD02	AZILECT, tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1678215	rasagiliin, 1mg	N04BD02	RALAGO, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1679272	rasagiliin, 1mg	N04BD02	SAGILIA, tablett, 30TK	Medochemie Ltd	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1679340	rasagiliin, 1mg	N04BD02	RASAGILINE ACCORD, tablett, 28TK	Accord Healthcare Limited	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1679531	rasagiliin, 1mg	N04BD02	PARCILECT, tablett, 28TK	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1715341	rasagiliin, 1mg	N04BD02	RASAGILINE MYLAN, tablett, 28TK	Mylan S.A.S	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1011036	raud(III)hüdroksiid- polümaltoos kompleks, 100mg	B03AB80	FERRUM LEK, närimistablett, 30TK	Lek Pharmaceuticals d.d.	75	D50-D50					rasedatele
					50	D50-D50			3,00		
1011025	raud(III)hüdroksiid- polümaltoos kompleks, 10mg 1ml	B03AB80	FERRUM LEK, siirup, 100ml 1TK	Lek Pharmaceuticals d.d.	50	D50-D50				3,00	
					75	D50-D50				rasedatele	
1073034	ribaviriin, 200mg	J05AP01	REBETOL, kõvakapsel, 140TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	50						
					100	B18.2-B18.2	Infektsionist, Gastroenteroloog				kroonilise progresseeruva kuluga C-viirushepatiidi raviks
1585346	ribaviriin, 200mg	J05AP01	MODERIBA, õhukese polümeerikattega tablett, 168TK	AbbVie SIA	50						
					100	B18.2-B18.2	Gastroenteroloog, Infektsionist				kroonilise progresseeruva kuluga C-viirushepatiidi raviks
1035289	rilusool, 50mg	N07XX02	RILUTEK, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Aventis Pharma SA	50						
					100	G12.2-G12.2	Neuroloog	esmane			mehhaanilise ventilatsiooni vajaduseta patsientidele
1644375	riotsiguaat, 0,5mg	C02KX05	ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Bayer AG	100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Pediaater, Pulmonoloog, Kardioloog				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel patsientidele, kellele kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1644432	riotsiguaat, 1,5mg	C02KX05	ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Bayer AG	100	I27.0-I27.0	Pediaater, Pulmonoloog, Reumatoloog, Kardioloog				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel patsientidele, kellele kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile
1644409	riotsiguaat, 1mg	C02KX05	ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Bayer AG	100	I27.0-I27.0	Pediaater, Reumatoloog, Pulmonoloog, Kardioloog				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel patsientidele, kellele kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile
1644498	riotsiguaat, 2,5mg	C02KX05	ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Bayer AG	100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Kardioloog, Pulmonoloog, Pediaater				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel patsientidele, kellele kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1644465	riotsiguaat, 2mg	C02KX05	ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Bayer AG	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Reumatoloog, Pulmonoloog, Pediaater				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel patsientidele, kellele kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile
1032804	risatriptaan, 10mg	N02CC04	MAXALT, suukaudne lüofilisaat, 2TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
1285680	risedroonhape, 35mg	M05BA07	RISENDROS 35MG, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK	Zentiva k.s.	50						
					75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
1298257	risedroonhape, 35mg	M05BA07	NORIFAZ, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK	Zaklad Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.	75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
					50						
1310757	risedroonhape, 35mg	M05BA07	RISONATE, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1310780	risedroonhape, 35mg	M05BA07	RISONATE, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	M80-M80					
1060456	risperidoon, 1mg	N05AX08	RISPOLEPT 1 mg, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	UAB JOHNSON & JOHNSON	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1367670	risperidoon, 1mg	N05AX08	RISPERIDONE ACCORD 1 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare Limited	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1041028	risperidoon, 1mg 1ml	N05AX08	RISPOLEPT, suukaudne lahus, 100ml 1TK	UAB JOHNSON & JOHNSON	100	F20-F29	Psühhiaater				
					50						
1067509	risperidoon, 2mg	N05AX08	RISPOLEPT 2 mg, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	UAB JOHNSON & JOHNSON	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1151974	risperidoon, 2mg	N05AX08	RISPERIDON ACTAVIS 2MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1367726	risperidoon, 2mg	N05AX08	RISPERIDONE ACCORD 2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare Limited	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1067521	risperidoon, 3mg	N05AX08	RISPOLEPT 3 mg, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	UAB JOHNSON & JOHNSON	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1367760	risperidoon, 3mg	N05AX08	RISPERIDONE ACCORD 3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare Limited	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1067532	risperidoon, 4mg	N05AX08	RISPOLEPT 4 mg, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	UAB JOHNSON & JOHNSON	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1152010	risperidoon, 4mg	N05AX08	RISPERIDON ACTAVIS 4MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Actavis Group PTC ehf	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1367805	risperidoon, 4mg	N05AX08	RISPERIDONE ACCORD 4 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare Limited	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1381665	rivaroksabaan, 10mg	B01AF01	XARELTO, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Bayer AG	75	S72.0-S72.2, S72.7- S72.7, M16-M17					kuni 30 päevaks
					50						
1381676	rivaroksabaan, 10mg	B01AF01	XARELTO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Bayer AG	50						
					75	S72.0-S72.2, S72.7- S72.7, M16-M17					kuni 30 päevaks
1552621	rivaroksabaan, 15mg	B01AF01	XARELTO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Bayer AG	50						
					75	I48-I48					
1552632	rivaroksabaan, 15mg	B01AF01	XARELTO, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Bayer AG	75	I48-I48					
					50						
1552687	rivaroksabaan, 20mg	B01AF01	XARELTO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Bayer AG	75	I48-I48					
					50						
1225741	ropinirool, 2mg	N04BC04	REQUIP-MODUTAB, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	SmithKline Beecham Limited	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1436598	ropinirool, 2mg	N04BC04	ROLPRYNA SR 2MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1225796	ropinirool, 4mg	N04BC04	REQUIP-MODUTAB, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	SmithKline Beecham Limited	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1436633	ropinirool, 4mg	N04BC04	ROLPRYNA SR 4MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused	
1225819	ropinirool, 8mg	N04BC04	REQUIP-MODUTAB, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	SmithKline Beecham Limited	50							
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane				
1436677	ropinirool, 8mg	N04BC04	ROLPRYNA SR 8MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	50							
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane				
1106053	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	CRESTOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	AstraZeneca AB	100	N18-N18						alates III staadiumist
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66						
					50							
					75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
1384758	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROXARDIO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66						
					100	N18-N18					alates III staadiumist	
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
					50							
					75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused	
1396874	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROSUCARD 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66						
					100	N18-N18					alates III staadiumist	
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l		
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel		
					50							
1477267	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROSUVASTATIN KRKA 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo mesto	50							
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66						
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel		
					100	N18-N18				alates III staadiumist		
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l		

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1477975	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROSWERA 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					100	N18-N18				alates III staadiumist	
1477997	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROSWERA 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					50						
					100	N18-N18				alates III staadiumist	
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1505157	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROSUVASTATIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
					100	N18-N18				alates III staadiumist	
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
1505179	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROSUVASTATIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Actavis Group PTC ehf	100	N18-N18					alates III staadiumist
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1587360	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROVASYN, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Medochemie Ltd.	100	N18-N18					alates III staadiumist
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					50						
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
1654174	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROSUVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare Limited	75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					50						
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
					75	I25-I25, I70.2-I70.2, I21-I23, E10-E11, I63-I63, Z95-Z95, E13-E14, Z45-Z45, I65-I66					
					100	N18-N18				alates III staadiumist	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1654219	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROSUVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare Limited	50						
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel
					75	I25-I25, I70.2-I70.2, I21-I23, E10-E11, I63-I63, Z95-Z95, E13-E14, Z45-Z45, I65-I66					
					100	N18-N18				alates III staadiumist	
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
1684638	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROSUVASTATIN TEVA PHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel
					50						
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					100	N18-N18				alates III staadiumist	
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1397099	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROSUCARD 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva k.s.	75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					100	N18-N18				alates III staadiumist	
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					50						
1473476	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROXARDIO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel
					50						
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					100	N18-N18				alates III staadiumist	
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1473511	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROXARDIO, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	N18-N18					alates III staadiumist
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					50						
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
1477481	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROSUVASTATIN KRKA 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					100	N18-N18				alates III staadiumist	
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1478190	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROSWERA 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
					100	N18-N18				alates III staadiumist	
1478213	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROSWERA 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo mesto	100	N18-N18					alates III staadiumist
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1505236	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROSUVASTATIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Actavis Group PTC ehf	100	N18-N18					alates III staadiumist
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					50						
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
1505258	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROSUVASTATIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Actavis Group PTC ehf	75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					100	N18-N18				alates III staadiumist	
					50						
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müüjiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused	
1587517	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROVASYN, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Medochemie Ltd.	75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66						
					75	I11-I12						raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel
					50							
					75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					100	N18-N18					alates III staadiumist	
1654321	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROSUVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare Limited	75	I11-I12						raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel
					50							
					75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					75	I25-I25, I70.2-I70.2, I21-I23, E10-E11, I63-I63, Z95-Z95, E13-E14, Z45-Z45, I65-I66						
					100	N18-N18					alates III staadiumist	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1654365	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROSUVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare Limited	75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel
					50						
					75	I25-I25, I70.2-I70.2, I21-I23, E10-E11, I63-I63, Z95-Z95, E13-E14, Z45-Z45, I65-I66					
					100	N18-N18				alates III staadiumist	
1684773	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROSUVASTATIN TEVA PHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel
					50						
					100	N18-N18				alates III staadiumist	
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused	
1477863	rosuvastatiin, 5mg	C10AA07	ROSWERA 5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66						
					50							
					100	N18-N18					alates III staadiumist	
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l		
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel		
1653993	rosuvastatiin, 5mg	C10AA07	ROSUVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare Limited	75	E78-E78						kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					75	I25-I25, I70.2-I70.2, I21-I23, E10-E11, I63-I63, Z95-Z95, E13-E14, Z45-Z45, I65-I66						
					100	N18-N18					alates III staadiumist	
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel		
					50							

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1620964	rosuvastatiin+esetimiib , 10mg+10mg	C10BA06	DELIPID PLUS, kõvakapsel, 30TK	Egis Pharmaceuticals Public Limited Company	75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					100	N18-N18				patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust	
					50						
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1621044	rosuvastatiin+esetimiib , 20mg+10mg	C10BA06	DELIPID PLUS, kõvakapsel, 30TK	Egis Pharmaceuticals Public Limited Company	75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66				kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust	
					100	N18-N18				patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust	
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1632901	ruksolitiniib, 15mg	L01XE18	JAKAVI, tablett, 56TK	Novartis Europharm Limited	100	D47.1-D47.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi) otsuse alusel primaarse või sekundaarse müelofibroosi raviks keskmise-2 või kõrge riskiga (IPSS \geq 2) patsientidele, kellel eelnev ravi hüdroksüüureaga (annuses vähemalt 2 g päevas vähemalt 3 kuu jooksul) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks
1632934	ruksolitiniib, 20mg	L01XE18	JAKAVI, tablett, 56TK	Novartis Europharm Limited	100	D47.1-D47.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi) otsuse alusel primaarse või sekundaarse müelofibroosi raviks keskmise-2 või kõrge riskiga (IPSS \geq 2) patsientidele, kellel eelnev ravi hüdroksüüureaga (annuses vähemalt 2 g päevas vähemalt 3 kuu jooksul) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1632877	ruksolitiinib, 5mg	L01XE18	JAKAVI, tablett, 56TK	Novartis Europharm Limited	100	D47.1-D47.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoologi) otsuse alusel primaarse või sekundaarse müelofibroosi raviks keskmise-2 või kõrge riskiga (IPSS>=2) patsientidele, kellele eelnev ravi hüdroksüureaga (annuses vähemalt 2 g päevas vähemalt 3 kuu jooksul) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks
1456196	saksagliptiin, 5mg	A10BH03	ONGLYZA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	AstraZeneca AB	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1725522	saksagliptiin+dapagliflo siin, 5mg+10mg	A10BD21	QTERN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	AstraZeneca AB	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
1005512	salbutamool, 100mcg 1annust	R03AC02	VENTOLIN, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 200annust 1TK	Glaxo Group Ltd.	75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
					50						
					75	J45-J45					
1031308	salbutamool, 200mcg 1annust	R03AC02	VENTOLIN DISKUS, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	50						
					75	J45-J45					
					75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
1004319	salbutamool, 400mcg 1ml	R03CC02	VENTOLIN SYRUP, siirup, 150ml 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	75	J45-J45					
					50						
					75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
1004948	salbutamool, 5000mcg 1ml	R03AC02	VENTOLIN, nebuliseeritav lahus, 20ml 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	50						
					75	J45-J45					
					75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
1664423	salbutamool+beklomet asoon, 100mcg+250mcg 1annust	R03AK13	SABACOMB, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 200annust 1TK	Chiesi Pharmaceuticals GmbH	75	J45-J45					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1000405	salmeterool, 25mcg 1annust	R03AC12	SEREVENT, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annust 1TK	GlaxoSmithKline Export Ltd	75	J45-J45					
					50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
1007907	salmeterool, 50mcg 1annust	R03AC12	SEREVENT DISKUS 50 MCG, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	75	J45-J45					
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					50						
1717219	salmeterool+flutikasoo n, 25mcg+125mcg	R03AK06	SERKEP, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annust 1TK	Mylan S.A.S	50						
					75	J45-J45					
1107346	salmeterool+flutikasoo n, 25mcg+125mcg 1annust	R03AK06	SERETIDE INHALER, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annust 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	50						
					75	J45-J45					
1717220	salmeterool+flutikasoo n, 25mcg+250mcg	R03AK06	SERKEP, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annust 1TK	Mylan S.A.S	50						
					75	J45-J45					
1107357	salmeterool+flutikasoo n, 25mcg+250mcg 1annust	R03AK06	SERETIDE INHALER, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annust 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	50						
					75	J45-J45					
1107335	salmeterool+flutikasoo n, 25mcg+50mcg 1annust	R03AK06	SERETIDE INHALER, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annust 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	75	J45-J45					
					50						
1037607	salmeterool+flutikasoo n, 50mcg+100mcg 1annust	R03AK06	SERETIDE DISKUS 100, annustatud inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	50						
					75	J45-J45					
1636466	salmeterool+flutikasoo n, 50mcg+250mcg	R03AK06	AIRFLUSAL FORSPIRO, annustatud inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	J45-J45					
					50						
1037595	salmeterool+flutikasoo n, 50mcg+250mcg 1annust	R03AK06	SERETIDE DISKUS 250, annustatud inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	75	J45-J45					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1636512	salmeterool+flutikasoon, 50mcg+500mcg	R03AK06	AIRFLUSAL FORSPIRO, annustatud inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			III-IV staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel on viimase 3 aasta jooksul esinenud vähemalt 3 süsteemse glükokortikoidiga ravitud haiguse ägenemist
					50						
					75	J45-J45					
1153167	salmeterool+flutikasoon, 50mcg+500mcg 1annust	R03AK06	SERETIDE DISKUS 500, annustatud inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	75	J45-J45	Pulmonoloog	esmane			III-IV staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel on viimase 3 aasta jooksul esinenud vähemalt 3 süsteemse glükokortikoidiga ravitud haiguse ägenemist
					75	J43-J44					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1391789	sapropteriin, 100mg	A16AX07	KUVAN, lahustuv tablett, 120TK	BioMarin International Limited	100	E70.0-E70.1				12,00	konsiiliumi (vähemalt kahe pediaatri või meditsiinigeneetiku ühise) otsuse alusel järgmistel tingimustel: tegemist on biopteriinitundliku haigusvormiga ning dieedi järgimine ei ole taganud ravijuhendi kohase vere fenüülalaniini taseme eesmärkväärtuse saavutamist; ravi võib jätkata kuni 12. eluaastani patsiendil, kellel ravimi kasutamisega püsib fenüülalaniini tase eesmärkväärtuste piires

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügi- loa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1788509	semaglutiid, 0,25mg 1annuses	A10BJ06	OZEMPIC, süstelahus pen- süstlis, 4annust 1TK	Novo Nordisk A/S	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks rasvumisega patsientidel (KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes talutavates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud
					50	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1788510	semaglutiid, 0,5mg 1annuses	A10BJ06	OZEMPIC, süstelahus pen- süstlis, 4annust 1TK	Novo Nordisk A/S	50	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks rasvumisega patsientidel (KMI \geq 35kg/m ²), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes talutavates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1788521	semaglutiid, 1mg 1annuses	A10BJ06	OZEMPIC, süstelahus pen- süstlis, 4annust 1TK	Novo Nordisk A/S	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks rasvumisega patsientidel (KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes talutavates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud
					50	E14-E14, E11-E11				II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud	
1027066	sertindool, 12mg	N05AE03	SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	H. LUNDBECK A/S	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1027077	sertindool, 16mg	N05AE03	SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	H. LUNDBECK A/S	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1027088	sertindool, 20mg	N05AE03	SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	H. LUNDBECK A/S	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1027055	sertindool, 4mg	N05AE03	SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	H. LUNDBECK A/S	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1013746	sertraliin, 100mg	N06AB06	ASENTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2- F32.3	Psühhiaater	esmane			
1160615	sertraliin, 100mg	N06AB06	SERTRALINE LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2- F32.3	Psühhiaater	esmane			
1189762	sertraliin, 100mg	N06AB06	ERSET, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Rivopharm Ltd	100	F33.2-F33.3, F32.2- F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1669989	sertraliin, 100mg	N06AB06	SERTRALINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare Limited	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2- F32.3	Psühhiaater	esmane			
1008638	sertraliin, 50mg	N06AB06	ZOLOFT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2- F32.3	Psühhiaater	esmane			
1143100	sertraliin, 50mg	N06AB06	ASENTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2- F32.3	Psühhiaater	esmane			
1160569	sertraliin, 50mg	N06AB06	SERTRALINE LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2- F32.3	Psühhiaater	esmane			
1189841	sertraliin, 50mg	N06AB06	ERSET, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Rivopharm Ltd	100	F33.2-F33.3, F32.2- F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1239218	sertraliin, 50mg	N06AB06	SERTRALINE-TEVA 50 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2- F32.3	Psühhiaater	esmane			
1669888	sertraliin, 50mg	N06AB06	SERTRALINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare Limited	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2- F32.3	Psühhiaater	esmane			
1422425	sevelameer, 800mg	V03AE02	RENVELA, õhukese polümeerikattega tablett, 180TK	Genzyme Europe B.V.	50						
					100	N18-N18	Nefroloog, Pediaater				juhul, kui kaltsiumipõhine fosforisiduja on vastunäidustatud (seerumi kaltsiumisisaldus >2,54 mmol/l)
1221039	sildenafil, 20mg	G04BE03	REVATIO, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	I27.0-I27.0	Pediaater, Kardioloog, Reumatoloog, Pulmonoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel
					50	I27.0-I27.0	Pediaater, Reumatoloog, Pulmonoloog, Kardioloog				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1702987	sildenafil, 20mg	G04BE03	SILDENAFIL TEVA PHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Teva Pharma B.V.	100	I27.0-I27.0	Pediaater, Pulmonoloog, Reumatoloog, Kardioloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel
					50	I27.0-I27.0	Kardioloog, Reumatoloog, Pediaater, Pulmonoloog				
1729166	sildenafil, 20mg	G04BE03	MYSILDECARD, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Mylan S.A.S	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pediaater, Reumatoloog, Pulmonoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel
					50	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Kardioloog, Pediaater, Pulmonoloog				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused	
1734117	sildenafil, 20mg	G04BE03	GRANPIDAM, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Accord Healthcare S.L.U.	50	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Pediaater, Pulmonoloog, Kardioloog					
					100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Kardioloog, Reumatoloog, Pediaater				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel	
1010271	simvastatiin, 10mg	C10AA01	VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66						
					100	N18-N18					alates III staadiumist	
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
					50							
					75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1080166	simvastatiin, 10mg	C10AA01	SIMVACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	HEXAL AG	100	N18-N18					alates III staadiumist
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					50						
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
1083934	simvastatiin, 10mg	C10AA01	SIMVASTATIN- RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					50						
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					100	N18-N18				alates III staadiumist	
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1334449	simvastatiin, 10mg	C10AA01	SIMVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare Limited	100	N18-N18					alates III staadiumist
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					50						
1594447	simvastatiin, 10mg	C10AA01	VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
					100	N18-N18				alates III staadiumist	
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1010260	simvastatiin, 20mg	C10AA01	VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					100	N18-N18				alates III staadiumist	
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					50						
1080177	simvastatiin, 20mg	C10AA01	SIMVACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	HEXAL AG	100	N18-N18					alates III staadiumist
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					50						
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1083956	simvastatiin, 20mg	C10AA01	SIMVASTATIN- RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					50						
					100	N18-N18				alates III staadiumist	
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					75	I11-I12			raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel		
1334539	simvastatiin, 20mg	C10AA01	SIMVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare Limited	75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					100	N18-N18				alates III staadiumist	
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					50						
					75	I11-I12			raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel		

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused	
1594458	simvastatiin, 20mg	C10AA01	VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66						
					75	E78-E78						kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					50							
					75	I11-I12						raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel
					100	N18-N18						alates III staadiumist
1621493	simvastatiin, 20mg	C10AA01	SIMVACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	HEXAL AG	75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66						
					75	E78-E78						kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					100	N18-N18						alates III staadiumist
					50							
					75	I11-I12						raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1083978	simvastatiin, 40mg	C10AA01	SIMVASTATIN- RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					100	N18-N18					alates III staadiumist
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
1086218	simvastatiin, 40mg	C10AA01	VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					100	N18-N18				alates III staadiumist	
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1129700	simvastatiin, 40mg	C10AA01	SIMVACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	HEXAL AG	50						
					100	N18-N18					alates III staadiumist
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
1334629	simvastatiin, 40mg	C10AA01	SIMVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare Limited	50						
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
					100	N18-N18				alates III staadiumist	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1594469	simvastatiin, 40mg	C10AA01	VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel
					100	N18-N18				alates III staadiumist	
					50						
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
1107739	siroliimus, 1mg	L04AA10	RAPAMUNE, kaetud tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	D18.1-D18.1	Pulmonoloog				lümfangioleiomüomato osi näidustusel
					100	Z94-Z94, T86-T86					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1286568	sitagliptiin, 100mg	A10BH01	JANUVIA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	50						ravimi väljakirjutamise õigus on patsientidele, kelle ravi sitagliptiini sisaldavate ravimpreparaatidega on alustatud enne 01.01.2019.a
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud. Soodustus kehtib patsientidele, kelle ravi sitagliptiini sisaldavate ravimpreparaatidega on alustatud enne 01.01.2019.a.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1286445	sitagliptiin, 25mg	A10BH01	JANUVIA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	50						ravimi väljakirjutamise õigus on patsientidele, kelle ravi sitagliptiini sisaldavate ravimpreparaatidega on alustatud enne 01.01.2019.a
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud. Soodustus kehtib patsientidele, kelle ravi sitagliptiini sisaldavate ravimpreparaatidega on alustatud enne 01.01.2019.a.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1286502	sitagliptiin, 50mg	A10BH01	JANUVIA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud. Soodustus kehtib patsientidele, kelle ravi sitagliptiini sisaldavate ravimpreparaatidega on alustatud enne 01.01.2019.a.
					50						ravimi väljakirjutamise õigus on patsientidele, kelle ravi sitagliptiini sisaldavate ravimpreparaatidega on alustatud enne 01.01.2019.a

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1725825	sofosbuviiir+velpatasvii r, 400mg+100mg	J05AP55	EPCLUSA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Gilead Sciences Ireland UC	100	B18.2-B18.2	Gastroenteroloog, Infektsionist				sõltumata genotüübist, kroonilise progressseeruva C- viirushepatiidi raviks patsientidele, kellel esineb mõõdukas või raske maksafibroos (F2-4) ja kompenseeritud maksahaigus ning sõltumata maksafibroosi astmest patsientidele, kellel kaasvalt esineb krüoglobulineemia (D89.1), kaasasündinud verehaigus (D56-D57; D66-D68) või kellel on maksasiirik (Z94.4)
1597440	solifenatsiin, 10mg	G04BD08	SOLIFENACIN PMCS 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	PRO.MED.CS Praha a.s.	50						
1597372	solifenatsiin, 5mg	G04BD08	SOLIFENACIN PMCS 5MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	PRO.MED.CS Praha a.s.	50						
1041185	somatropiin, 12mg	H01AC01	GENOTROPIN, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
					100	E89.3-E89.3, E23- E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18- N18	Endokrinoloog				kuni kasvatsoonide sulgumiseni
1369009	somatropiin, 3,3mg 1ml	H01AC01	OMNITROPE, süstelahus, 1.5ml 5TK	Sandoz GmbH	50						
					100	E89.3-E89.3, E23- E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18- N18	Endokrinoloog				kuni kasvatsoonide sulgumiseni

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1022072	somatropiin, 5,3mg	H01AC01	GENOTROPIN, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
					100	E89.3-E89.3, E23- E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18- N18	Endokrinoloog				kuni kasvutsoonide sulgumiseni
1415528	somatropiin, 5,83mg 1ml	H01AC01	SAIZEN 5,83 MG/ML, süstelahus, 1.03ml 1TK	Merck Serono S.p.A.	100	E89.3-E89.3, E23- E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18- N18	Endokrinoloog				kuni kasvutsoonide sulgumiseni
					50						
1369032	somatropiin, 6,7mg 1ml	H01AC01	OMNITROPE, süstelahus, 1.5ml 1TK	Sandoz GmbH	100	E89.3-E89.3, E23- E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18- N18	Endokrinoloog				kuni kasvutsoonide sulgumiseni
					50						
1415540	somatropiin, 8mg 1ml	H01AC01	SAIZEN 8 MG/ML, süstelahus, 1.5ml 1TK	Merck Serono S.p.A.	100	E89.3-E89.3, E23- E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18- N18	Endokrinoloog				kuni kasvutsoonide sulgumiseni
					50						
1415551	somatropiin, 8mg 1ml	H01AC01	SAIZEN 8 MG/ML, süstelahus, 2.5ml 1TK	Merck Serono S.p.A.	50						
					100	E89.3-E89.3, E23- E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18- N18	Endokrinoloog				kuni kasvutsoonide sulgumiseni

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1249938	sorafeniib, 200mg	L01XE05	NEXAVAR, õhukese polümeerikattega tablett, 112TK	Bayer AG	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sorafeniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	C22-C22	Onkoloog				kuni haiguse progresseerumiseni, ku i ravi alustamise sorafeniibiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) ning maksa funktsioon ei ole oluliselt häiritud. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi sorafeniibiga on ravimite tootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2010. a.
1034480	sotalool, 80mg	C07AA07	SOTAHEXAL 80 MG, tablett, 20TK	HEXAL AG	75	I47-I49					
					50						
1071863	sotalool, 80mg	C07AA07	SOTAHEXAL 80 MG, tablett, 50TK	HEXAL AG	50						
					75	I47-I49					
1678170	sotalool, 80mg	C07AA07	SOTAHEXAL 80 MG, tablett, 50TK	First Pharma OÜ	50						
					75	I47-I49					
1001091	spironolaktoon, 100mg	C03DA01	SPIRIX, tablett, 20TK	Takeda Pharma AS	75	I50-I50					
					100	I27.0-I27.0					
					75	I10-I13					
					50						
					75	I15-I15					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1689060	spironolaktoon, 100mg	C03DA01	SPIRONOLACTONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Accord Healthcare Limited	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					100	I27.0-I27.0					
1689071	spironolaktoon, 100mg	C03DA01	SPIRONOLACTONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare Limited	100	I27.0-I27.0					
					50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1000944	spironolaktoon, 25mg	C03DA01	SPIRIX, tablett, 20TK	Takeda Pharma AS	75	I50-I50					
					75	I15-I15					
					75	I10-I13					
					100	I27.0-I27.0					
					50						
1014848	spironolaktoon, 25mg	C03DA01	VEROSPIRON, tablett, 20TK	Gedeon Richter Plc.	100	I27.0-I27.0					
					75	I50-I50					
					50						
					75	I15-I15					
					75	I10-I13					
1688946	spironolaktoon, 25mg	C03DA01	SPIRONOLACTONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Accord Healthcare Limited	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					100	I27.0-I27.0					
					50						
1688957	spironolaktoon, 25mg	C03DA01	SPIRONOLACTONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare Limited	100	I27.0-I27.0					
					50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1001013	spironolaktoon, 50mg	C03DA01	SPIRIX, tablett, 20TK	Takeda Pharma AS	75	I15-I15					
					75	I50-I50					
					50						
					100	I27.0-I27.0					
					75	I10-I13					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1042018	spironolaktoon, 50mg	C03DA01	VEROSPIRON, kõvakapsel, 30TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					75	I50-I50					
					75	I10-I13					
					75	I15-I15					
					100	I27.0-I27.0					
1071650	spironolaktoon, 50mg	C03DA01	SPIRIX, tablett, 100TK	Takeda Pharma AS	75	I15-I15					
					75	I50-I50					
					50						
					100	I27.0-I27.0					
					75	I10-I13					
1689004	spironolaktoon, 50mg	C03DA01	SPIRONOLACTONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Accord Healthcare Limited	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
					100	I27.0-I27.0					
1689015	spironolaktoon, 50mg	C03DA01	SPIRONOLACTONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare Limited	100	I27.0-I27.0					
					50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1280056	stiripentool, 250mg	N03AX17	DIACOMIT, kõvakapsel, 60TK	BIOCODEX	100	G40-G40	Neuroloog				koos klobasaami ja valproaadiga väikelapse raske müoklooniilise epilepsia (SMEI, Dravet' sündroom) korral, kui kombinatsioonravi klobasaami ja valproaadiga on osutunud ebapiisavaks ning topiramaat ja levetiratsetaam on ebaefektiivsed või vastunäidustatud

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1280146	stiripentool, 250mg	N03AX17	DIACOMIT, suukaudse suspensiooni pulber, 60TK	BIOCODEX	100	G40-G40	Neuroloog				koos klobasaami ja valproaadiga väikelapse raske müokloonilise epilepsia (SMEI, Dravet' sündroom) korral, kui kombinatsioonravi klobasaami ja valproaadiga on osutunud ebapiisavaks ning topiramaat ja levetiratsetaam on ebaefektiivsed või vastunäidustatud
1280089	stiripentool, 500mg	N03AX17	DIACOMIT, kõvakapsel, 60TK	BIOCODEX	100	G40-G40	Neuroloog				koos klobasaami ja valproaadiga väikelapse raske müokloonilise epilepsia (SMEI, Dravet' sündroom) korral, kui kombinatsioonravi klobasaami ja valproaadiga on osutunud ebapiisavaks ning topiramaat ja levetiratsetaam on ebaefektiivsed või vastunäidustatud

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1280113	stiripentool, 500mg	N03AX17	DIACOMIT, suukaudse suspensiooni pulber, 60TK	BIOCODEX	100	G40-G40	Neuroloog				koos klobasaami ja valproaadiga väikelapse raske müokloonilise epilepsia (SMEI, Dravet' sündroom) korral, kui kombinatsioonravi klobasaami ja valproaadiga on osutunud ebapiisavaks ning topiramaat ja levetiratsetaam on ebaefektiivsed või vastunäidustatud
1008818	sulfametoksasool+trimetoprim, 40mg+8mg 1ml	J01EE01	BACTRIM, siirup, 100ml 1TK	Roche Eesti OÜ	50						
					100	Z21-Z21, Z20.6-Z20.6, B20-B24	Infektsionist				
1016086	sulfametoksasool+trimetoprim, 800mg+160mg	J01EE01	BERLOCID, tablett, 20TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	100	Z21-Z21, Z20.6-Z20.6, B20-B24	Infektsionist				
					50						
1023455	sulfasalasiin, 500mg	A07EC01	SALAZOPYRIN EN, gastroresistentne tablett, 100TK	Pfizer Europe MA EEIG	75	M08-M08, M45-M45, M06-M06, M05-M05, M46-M46	Pediaater, Reumatoloog				
					50						
					75	K51-K51, K50-K50	Gastroenteroloog, Pediaater				
1040612	sulpiriid, 100mg	N05AL01	BETAMAKS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	AS Grindeks	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				
1705115	sulpiriid, 100mg	N05AL01	BETAMAKS, tablett, 30TK	AS Grindeks	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				
1040601	sulpiriid, 200mg	N05AL01	BETAMAKS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	AS Grindeks	100	F20-F29	Psühhiaater				
					50						
1705126	sulpiriid, 200mg	N05AL01	BETAMAKS, tablett, 30TK	AS Grindeks	100	F20-F29	Psühhiaater				
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1040623	sulpiriid, 50mg	N05AL01	BETAMAKS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	AS Grindeks	100	F20-F29	Psühhiaater				
					50						
1705081	sulpiriid, 50mg	N05AL01	BETAMAKS, tablett, 30TK	AS Grindeks	100	F20-F29	Psühhiaater				
					50						
1018482	sultamitsilliin, 375mg	J01CR04	UNASYN, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1139914	sumatriptaan, 100mg	N02CC01	IMIGRAN FDT, õhukese polümeerikattega tablett, 2TK	GlaxoSmithKline Export Ltd	50						
1139947	sumatriptaan, 100mg	N02CC01	IMIGRAN FDT, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK	GlaxoSmithKline Export Ltd	50						
1234213	sumatriptaan, 100mg	N02CC01	CINIE 100 MG, tablett, 6TK	Zentiva k.s.	50						
1234505	sumatriptaan, 100mg	N02CC01	SUMATRIPTAN STADA, tablett, 6TK	STADA Arzneimittel AG	50						
1278053	sumatriptaan, 100mg	N02CC01	SUMATRIPTAN ACTAVIS, kaetud tablett, 6TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1678125	sumatriptaan, 100mg	N02CC01	CINIE 100 MG, tablett, 6TK	First Pharma OÜ	50						
1139880	sumatriptaan, 50mg	N02CC01	IMIGRAN FDT, õhukese polümeerikattega tablett, 2TK	GlaxoSmithKline Export Ltd	50						
1139903	sumatriptaan, 50mg	N02CC01	IMIGRAN FDT, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK	GlaxoSmithKline Export Ltd	50						
1234156	sumatriptaan, 50mg	N02CC01	CINIE 50 MG, tablett, 6TK	Zentiva k.s.	50						
1277995	sumatriptaan, 50mg	N02CC01	SUMATRIPTAN ACTAVIS, kaetud tablett, 6TK	Actavis Group PTC ehf	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1353305	sunitiniib, 12,5mg	L01XE04	SUTENT, kõvakapsel, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi esimese rea ravina või teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sunitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1353293	sunitiniib, 25mg	L01XE04	SUTENT, kõvakapsel, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi esimese rea ravina või teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sunitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1353282	sunitiniib, 50mg	L01XE04	SUTENT, kõvakapsel, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi esimese rea ravina või teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sunitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
1113422	zidovudiin, 10mg 1ml	J05AF01	RETROVIR, suukaudne lahus, 200ml 1TK	ViiV Healthcare BV	50		Infektsionist				HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega
1036460	zidovudiin+lamivudiiin, 300mg+150mg	J05AR01	COMBIVIR, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	ViiV Healthcare BV	50		Infektsionist				HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1005815	zuklopentiksool, 10mg	N05AF05	CISORDINOL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	H. LUNDBECK A/S	50						
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
1006232	zuklopentiksool, 200mg 1ml	N05AF05	CISORDINOL DEPOT, süstelahus, 1ml 1TK	H. LUNDBECK A/S	100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
1065226	zuklopentiksool, 200mg 1ml	N05AF05	CISORDINOL DEPOT, süstelahus, 1ml 10TK	H. LUNDBECK A/S	50						
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1006322	zuklopentiksool, 50mg 1ml	N05AF05	CISORDINOL-ACUTARD, süstelahus, 1ml 10TK	H. LUNDBECK A/S	50						
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
1379303	tafluprost, 0,015mg 1ml	S01EE05	TAFLOTAN, silmatilgad, lahus üheannuselises konteineris, 0.3ml 30TK	Santen Oy	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui ravi jätkamine teiste glaukoomiravimitega on meditsiiniliselt vastunäidustatud bensalkooniumkloriidil e tekkinud tõendatud ülitundlikkuse või olulise toksilise toime tõttu silma eesmisele osale
1179840	takroliimus, 0,3mg 1g	D11AH01	PROTOPIC, salv, 30g 1TK	LEO Pharma A/S	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1294646	takroliimus, 0,5mg	L04AD02	ADVAGRAF, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Astellas Pharma Europe B.V.	100	Z94-Z94, T86-T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA>20%), korduvsiirdamise puhul, maksasiirdamise puhul, kopsusiirdamise puhul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt
1294680	takroliimus, 1mg	L04AD02	ADVAGRAF, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Astellas Pharma Europe B.V.	100	Z94-Z94, T86-T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA>20%), korduvsiirdamise puhul, maksasiirdamise puhul, kopsusiirdamise puhul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt
1179851	takroliimus, 1mg 1g	D11AH01	PROTOPIC, salv, 30g 1TK	LEO Pharma A/S	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1488337	takroliimus, 3mg	L04AD02	ADVAGRAF, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Astellas Pharma Europe B.V.	100	Z94-Z94, T86-T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA>20%), korduvsiirdamise puhul, maksasiirdamise puhul, kopsusiirdamise puhul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt
1294668	takroliimus, 5mg	L04AD02	ADVAGRAF, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Astellas Pharma Europe B.V.	100	Z94-Z94, T86-T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA>20%), korduvsiirdamise puhul, maksasiirdamise puhul, kopsusiirdamise puhul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt
1347230	talidomiid, 50mg	L04AX02	THALIDOMIDE CELGENE, kõvakapsel, 28TK	Celgene Europe BV	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				ravimi väljakirjutamise õigus hulgimüeloomi suukaudseks mono- või kombinatsioonraviks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1015704	tamoksifeen, 20mg	L02BA01	TAMOXIFEN "EBEWE", tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	D18.1-D18.1	Pulmonoloog, Onkoloog				
					100	C00-D48	Onkoloog				
					50						
					100	C50-C50	Günekoloog, Üldkirurg			rinnavähi adjuvantraviks	
1188143	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA02	FLOSIN 0,4MG, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
1188378	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA02	TAMSULOSIN AUXILIA, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Auxilia Pharma OÜ	50						
1188402	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA02	TAMSULOSIN AUXILIA, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 60TK	Auxilia Pharma OÜ	50						
1188480	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA02	TAMSULOSIN LANNACHER, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						
1195826	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA02	OMSAL, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Gedeon Richter Plc.	50						
1206773	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA02	FOKUSIN, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Takeda GmbH	50						
1436015	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA02	TANYZ ERAS 0.4MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
1390463	tamsulosiin+dutasteriid , 0,4mg+0,5mg	G04CA52	COMBODART, kõvakapsel, 30TK	GlaxoSmithKline Eesti OÜ	50						
1046292	telmisartaan, 40mg	C09CA07	MICARDIS, tablett, 28TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1395424	telmisartaan, 40mg	C09CA07	TELMISARTAN- RATIOPHARM 40MG, tablett, 28TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	I10-I13, I15-I15					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1430233	telmisartaan, 40mg	C09CA07	TELMISARTAN SANDOZ 40 MG, tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1482263	telmisartaan, 40mg	C09CA07	TOLURA, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1482274	telmisartaan, 40mg	C09CA07	TOLURA, tablett, 56TK	KRKA d.d., Novo mesto	50	I10-I13, I15-I15					
					75						
1046258	telmisartaan, 80mg	C09CA07	MICARDIS, tablett, 28TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50	I10-I13, I15-I15					
					75						
1395569	telmisartaan, 80mg	C09CA07	TELMISARTAN- RATIOPHARM 80MG, tablett, 28TK	ratiopharm GmbH	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1430389	telmisartaan, 80mg	C09CA07	TELMISARTAN SANDOZ 80 MG, tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50	I10-I13, I15-I15					
					75						
1482331	telmisartaan, 80mg	C09CA07	TOLURA, tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	50	I10-I13, I15-I15					
					75						
1482342	telmisartaan, 80mg	C09CA07	TOLURA, tablett, 56TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1499452	telmisartaan+amlodipii n, 80mg+10mg	C09DB04	TWYNSTA, tablett, 28TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1643161	telmisartaan+amlodipii n, 80mg+10mg	C09DB04	MIXOR, tablett, 28TK	Zentiva k.s.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1707049	telmisartaan+amlodipii n, 80mg+10mg	C09DB04	TELDIPIN, tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1499384	telmisartaan+amlodipii n, 80mg+5mg	C09DB04	TWYNSTA, tablett, 28TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50	I10-I13, I15-I15					
					75						
1643071	telmisartaan+amlodipii n, 80mg+5mg	C09DB04	MIXOR, tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50	I10-I13, I15-I15					
					75						
1706969	telmisartaan+amlodipii n, 80mg+5mg	C09DB04	TELDIPIN, tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1609613	telmisartaan+hüdroklor otiasiid, 40mg+12,5mg	C09DA07	TOLUCOMBI, tablett, 56TK	Krka, d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1114793	telmisartaan+hüdroklor otiasiid, 80mg+12,5mg	C09DA07	MICARDISPLUS, tablett, 28TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50	I10-I13, I15-I15					
					75						
1566615	telmisartaan+hüdroklor otiasiid, 80mg+12,5mg	C09DA07	TELMISARTAN/HYDROCHL OROTHIAZIDE TAD, tablett, 30TK	TAD Pharma GmbH	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1566996	telmisartaan+hüdroklor otiasiid, 80mg+12,5mg	C09DA07	TEZEO HCT 80 MG/12,5 MG, tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50	I10-I13, I15-I15					
					75						
1567267	telmisartaan+hüdroklor otiasiid, 80mg+12,5mg	C09DA07	TELMISARTAN /HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ, kaetud tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1609691	telmisartaan+hüdroklor otiasiid, 80mg+12,5mg	C09DA07	TOLUCOMBI, tablett, 56TK	Krka, d.d., Novo mesto	50	I10-I13, I15-I15					
					75						
1612910	telmisartaan+hüdroklor otiasiid, 80mg+12,5mg	C09DA07	TELMISARTAN/HYDROCHL OROTHIAZIDE TEVA PHARMA, tablett, 28TK	Teva B.V.	50	I10-I13, I15-I15					
					75						
1676954	telmisartaan+hüdroklor otiasiid, 80mg+12,5mg	C09DA07	TELMISARTAN/HYDROCHL OROTHIAZIDE ACCORD, tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50	I10-I13, I15-I15					
					75						
1367524	telmisartaan+hüdroklor otiasiid, 80mg+25mg	C09DA07	MICARDISPLUS, tablett, 28TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1566705	telmisartaan+hüdroklor otiasiid, 80mg+25mg	C09DA07	TELMISARTAN/HYDROCHL OROTHIAZIDE TAD, tablett, 30TK	TAD Pharma GmbH	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1567379	telmisartaan+hüdroklor otiasiid, 80mg+25mg	C09DA07	TELMISARTAN /HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ, kaetud tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50	I10-I13, I15-I15					
					75						
1609770	telmisartaan+hüdroklor otiasiid, 80mg+25mg	C09DA07	TOLUCOMBI, tablett, 56TK	Krka, d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1613045	telmisartaan+hüdroklor otiasiid, 80mg+25mg	C09DA07	TELMISARTAN/HYDROCHL OROTHIAZIDE TEVA PHARMA, tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1677045	telmisartaan+hüdroklor otiasiid, 80mg+25mg	C09DA07	TELMISARTAN/HYDROCHL OROTHIAZIDE ACCORD, tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1458963	temosolomiid, 100mg	L01AX03	TEMOZOLOMIDE TEVA, kõvakapsel, 5TK	Teva B.V.	50						
					100	C71-C71	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
1462115	temosolomiid, 100mg	L01AX03	TEMOZOLOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 5TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					100	C71-C71	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
1534676	temosolomiid, 100mg	L01AX03	BLASTOMAT 100 MG, kõvakapsel, 5TK	Alvogen IPCo S.ar.l.	50						
					100	C71-C71	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
1462137	temosolomiid, 140mg	L01AX03	TEMOZOLOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 5TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					100	C71-C71	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1534698	temosolomiid, 140mg	L01AX03	BLASTOMAT 140 MG, kõvakapsel, 5TK	Alvogen IPCo S.ar.l.	50						
					100	C71-C71	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
1458941	temosolomiid, 20mg	L01AX03	TEMOZOLOMIDE TEVA, kõvakapsel, 5TK	Teva B.V.	50						
					100	C71-C71	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
1462092	temosolomiid, 20mg	L01AX03	TEMOZOLOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 5TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C71-C71	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
					50						
1534654	temosolomiid, 20mg	L01AX03	BLASTOMAT 20 MG, kõvakapsel, 5TK	Alvogen IPCo S.ar.l.	50						
					100	C71-C71	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1459021	temosolomiid, 250mg	L01AX03	TEMOZOLOMIDE TEVA, kõvakapsel, 5TK	Teva B.V.	100	C71-C71	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
					50						
1462171	temosolomiid, 250mg	L01AX03	TEMOZOLOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 5TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C71-C71	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
					50						
1114951	temosolomiid, 5mg	L01AX03	TEMODAL, kõvakapsel, 5TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	100	C71-C71	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
					50						
1124031	teofülliin, 200mg	R03DA04	RETAFYLLIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Orion Corporation	75	J45-J45					
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					50						
1124042	teofülliin, 300mg	R03DA04	RETAFYLLIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Orion Corporation	75	J45-J45					
					50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
1158757	terbinafiin, 250mg	D01BA02	TERBINAFINE SANDOZ 250 MG, tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1176308	terbinafiin, 250mg	D01BA02	TERBINAFIN ACTAVIS, tablett, 14TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1176319	terbinafiin, 250mg	D01BA02	TERBINAFIN ACTAVIS, tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1176353	terbinafiin, 250mg	D01BA02	TERBINAFIN ACTAVIS, tablett, 56TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1213614	terbinafiin, 250mg	D01BA02	TERBINAFIN NYCOMED, tablett, 28TK	Takeda Pharma AS	50						
1245406	terbinafiin, 250mg	D01BA02	TERBINAFINE OLAINFARM 250MG, tablett, 28TK	JSC Olainfarm	50						
1681501	terbinafiin, 250mg	D01BA02	TERBINAFIN ACTAVIS, tablett, 28TK	First Pharma OÜ	50						
1624092	teriflunomiid, 14mg	L04AA31	AUBAGIO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	sanofi-aventis groupe	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks patsientidele, kellele beetainterferoon või glatirameeratsetaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks või talumatuks
1022623	testosteroon, 250mg 1ml	G03BA03	SUSTANON, süstelahus, 1ml 1TK	Aspen Pharma Trading Limited	100	C00-D48	Onkoloog, Hematoloog				
					50						
					100	E29.1-E29.1, E89.5-E89.5, E23-E23, Q98-Q98	Günekoloog, Endokrinoloog				
1169445	testosteroon, 250mg 1ml	G03BA03	NEBIDO, süstelahus, 4ml 1TK	Bayer AG	100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog				
					50						
					100	E29.1-E29.1, E89.5-E89.5, E23-E23, Q98-Q98	Günekoloog, Endokrinoloog				
1343898	tetrabensiin, 25mg	N07XX06	TETMODIS, tablett, 112TK	AOP Orphan Pharmaceuticals AG	100	G10-G10	Neuroloog	esmane			hüperkineetiliste motoorsete häiretega Huntingtoni tõve raviks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1436835	tianeptiin, 12,5mg	N06AX14	SALYMBRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1436846	tianeptiin, 12,5mg	N06AX14	SALYMBRA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1506585	tikagreloor, 90mg	B01AC24	BRILIQUE, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	AstraZeneca AB	75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Sisearst, Kardioloog	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
					50						
1038956	timolool, 1mg 1g	S01ED01	TIMOSAN, silmageel, 5g 1TK	Santen Oy	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1252976	timolool+bimatoprost, 5mg+0,3mg 1ml	S01ED82	GANFORT, silmatilgad, lahus, 3ml 1TK	Allergan Pharmaceuticals Ireland	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku
					50						
1720134	timolool+bimatoprost, 5mg+0,3mg 1ml	S01ED82	BIMATOPROST/TIMOLOL TEVA, silmatilgad, lahus, 3ml 1TK	Teva B.V.	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku
					50						
1720145	timolool+bimatoprost, 5mg+0,3mg 1ml	S01ED82	BIMATOPROST/TIMOLOL TEVA, silmatilgad, lahus, 3ml 3TK	Teva B.V.	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1720178	timolool+bimatoprost, 5mg+0,3mg 1ml	S01ED82	BIMATOPROST/TIMOLOL MYLAN, silmatilgad, lahus, 3ml 1TK	Mylan S.A.S	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku
1392207	timolool+brinsolamiid, 5mg+10mg 1ml	S01ED83	AZARGA, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Novartis Europharm Limited	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku
1039799	timolool+dorsolamiid, 5mg+20mg 1ml	S01ED80	COSOPT, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Santen Oy	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku
1420243	timolool+dorsolamiid, 5mg+20mg 1ml	S01ED80	DORZOLAMIDE/TIMOLOL ELVIM, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	SIA ELVIM	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku
					50						
1429118	timolool+latanoprost, 5mg+0,05mg 1ml	S01ED84	LATOXAP 0,05MG/5MG/ML, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1088254	timolool+latanoprost, 5mg+50mcg 1ml	S01ED84	XALACOM, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku
1445161	timolool+latanoprost, 5mg+50mcg 1ml	S01ED84	LATIRA, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	ratiopharm GmbH	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku
1445172	timolool+latanoprost, 5mg+50mcg 1ml	S01ED84	LATIRA, silmatilgad, lahus, 2.5ml 3TK	ratiopharm GmbH	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku
					50						
1618141	timolool+tafluprost, 5mg+15mcg 1ml	S01ED85	TAPTIQOM, silmatilgad, lahus üheannuselises konteineris, 0.3ml 30TK	Santen Oy	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui ravi jätkamine teiste glaukoomiravimitega on meditsiiniliselt vastunäidustatud bensalkooniumkloriidil e tekkinud tõendatud ülitundlikkuse või olulise toksilise toime tõttu silma eesmisele osale ning monoteeraapia säilitusaine vaba prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1243763	timolool+travoprost, 5mg+40mcg 1ml	S01ED81	DUOTRAV, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Novartis Europharm Limited	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku
1004375	tioguaaniin, 40mg	L01BB03	LANVIS, tablett, 25TK	Aspen Pharma Trading Limited	50						
1111341	tiokthape (alfa- lipoehape), 600mg	A16AX01	THIOCTACID HR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Meda Pharma GmbH & Co. KG	50						
1303276	tiokthape (alfa- lipoehape), 600mg	A16AX01	THIOGAMMA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	50						
1511301	tiotroopium, 2,5mcg 1annust	R03BB04	SPIRIVA RESPIMAT, inhalatsioonilahus, 60annust 1TK	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
1173822	tisanidiin, 2mg	M03BX02	SIRDALUD, tablett, 30TK	SIA "Novartis Baltics"	50						
					75	G82-G82, G81-G81					
1211599	tisanidiin, 4mg	M03BX02	SIRDALUD, tablett, 30TK	SIA "Novartis Baltics"	50						
					75	G82-G82, G81-G81					
1553880	tobramütsiin, 28mg	J01GB01	TOBI PODHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 224TK	Novartis Europharm Limited	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater				Pseudomonas aeruginosa põhjustatud kroonilise kopsuinfektsiooni supressiivseks raviks tsüstilise fibroosiga patsientidel
1646827	tobramütsiin, 300mg 5ml	J01GB01	TOBRAMYCIN VIA PHARMA, nebuliseeritav lahus, 56TK	UAB Via pharma	100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog				Pseudomonas aeruginosa põhjustatud kroonilise kopsuinfektsiooni supressiivseks raviks tsüstilise fibroosiga patsientidel
1012543	tobramütsiin, 3mg 1g	S01AA12	TOBEX, silmasalv, 3.5g 1TK	SIA "Novartis Baltics"	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1150120	tobramütsiin, 3mg 1ml	S01AA12	TOBEX 2X, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	SIA "Novartis Baltics"	50						
7000119	toitained ilma fenüülalaniinina,		PHLEXY-10 DRINK MIX , pulber, 20g N30	SHS International	100	E70.0-E70.1					
					50						
7000131	toitained ilma fenüülalaniinina,		XP MAXAMAID (ORANGE FLAVOURED) pulber, pulber, 500g N4	SHS International	50						
					100	E70.0-E70.1					
7000142	toitained ilma fenüülalaniinina,		XP MAXAMAID (UNFLAVOURED) pulber, pulber, 500g N4	SHS International	50						
					100	E70.0-E70.1					
7000153	toitained ilma fenüülalaniinina,		XP MAXAMUM (ORANGE FLAVOURED) pulber, pulber, 500g N4	SHS International	50						
					100	E70.0-E70.1					
7000164	toitained ilma fenüülalaniinina,		XP MAXAMUM (UNFLAVOURED) pulber, pulber, 500g N4	SHS International	50						
					100	E70.0-E70.1					
7000186	toitained ilma fenüülalaniinina,		DUOCAL Supersoluble , pulber, 400 g	SHS	50						
					100	E70.0-E70.1					
7002504	toitained ilma fenüülalaniinina,		PKU-EXPRESS, pulber, 25g N30	Vitaflo International Ltd.	100	E70.0-E70.1					
7002515	toitained ilma fenüülalaniinina,		PKU-GEL, pulber, 20g N30	Vitaflo International Ltd.	100	E70.0-E70.1					
7002896	toitained ilma fenüülalaniinina,		PKU ANAMIX INFANT, pulber, 400g	SHS International Ltd	100	E70.1-E70.1, E70.0-E70.0					
7017588	toitained ilma fenüülalaniinina,		COMIDA PKU B Formula, pulber, 500g N1	UAB Pharm House	100	E70.1-E70.1, E70.0-E70.0					
7015777	toitained ilma fenüülalaniinina,		PKU Lophlex LQ Juicy tropical 10, suukaudne lahus, 62,5ml N60	SHS International Ltd	100	E70.0-E70.1					
7006081	toitained ilma fenüülalaniinina,		AVONIL POWDER , suukaudne pulber, 500g N1	PreKULab Ltd.	100	E70.0-E70.1					
7017577	toitained ilma fenüülalaniinina,		COMIDA PKU A Formula, pulber, 400g N1	UAB Pharm House	100	E70.1-E70.1, E70.0-E70.0					
7017599	toitained ilma fenüülalaniinina,		COMIDA PKU B Formula Orange, pulber, 500g N1	UAB Pharm House	100	E70.1-E70.1, E70.0-E70.0					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
7015755	toitained ilma fenüülalaniinita,		PKU Lophlex LQ Juicy berries 10, suukaudne lahus, 62,5ml N60	SHS International Ltd	100	E70.0-E70.1					
7015744	toitained ilma fenüülalaniinita,		PKU Lophlex LQ Juicy berries 20, suukaudne lahus, 125ml N30	SHS International Ltd	100	E70.0-E70.1					
7015766	toitained ilma fenüülalaniinita,		PKU Lophlex LQ Juicy tropical 20, suukaudne lahus, 125ml N30	SHS International Ltd	100	E70.0-E70.1					
7004922	toitained ilma fenüülalaniinita,		PKU Squeezie, suukaudne pasta, 85 g manustamisvalmis toitainesegu kotikeses, ühes karbis on 30 kotikest (2550 g)	VitaFlo International Ltd.	100	E70.0-E70.1					
1371248	tokofersolaan, 50mg 1ml	A11HA08	VEDROP, suukaudne lahus, 60ml 1TK	Orphan Europe SARL	100	E84-E84, Q44-Q44	Pediaater			19,00	raske kroonilise kolestaasi raviks kuni 18-aastastele patsientidele konsiiliumi (vähemalt kahe pediatriline ühise) otsuse alusel
1430086	tokofersolaan, 50mg 1ml	A11HA08	VEDROP, suukaudne lahus, 20ml 1TK	Orphan Europe SARL	100	E84-E84, Q44-Q44	Pediaater			19,00	raske kroonilise kolestaasi raviks kuni 18-aastastele patsientidele konsiiliumi (vähemalt kahe pediatriline ühise) otsuse alusel
1284498	tolterodiin, 2mg	G04BD07	UROFLOW 2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
1503762	tolterodiin, 4mg	G04BD07	UROFLOW 4MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	Zentiva k.s.	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1076778	topiramaat, 100mg	N03AX11	TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	UAB JOHNSON & JOHNSON	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
1309878	topiramaat, 100mg	N03AX11	TOPIRAMATE ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Orion Corporation	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
1456488	topiramaat, 100mg	N03AX11	TOPIRAMATE ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	SIA ELVIM	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
1076846	topiramaat, 200mg	N03AX11	TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	UAB JOHNSON & JOHNSON	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1076688	topiramaat, 25mg	N03AX11	TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	UAB JOHNSON & JOHNSON	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1309812	topiramaat, 25mg	N03AX11	TOPIRAMATE ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Orion Corporation	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
1456444	topiramaat, 25mg	N03AX11	TOPIRAMATE ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	SIA ELVIM	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
1076734	topiramaat, 50mg	N03AX11	TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	UAB JOHNSON & JOHNSON	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
1309834	topiramaat, 50mg	N03AX11	TOPIRAMATE ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Orion Corporation	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1456466	topiramaat, 50mg	N03AX11	TOPIRAMATE ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	SIA ELVIM	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1158050	torasemiid, 100mg	C03CA04	TORASEMIDE HEXAL 100 MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1771332	torasemiid, 100mg	C03CA04	TORASEMIDE HEXAL 100 MG, tablett, 30TK	First Pharma OÜ	50						
1032332	torasemiid, 10mg	C03CA04	TRIFAS 10 MG, tablett, 30TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
1166015	torasemiid, 10mg	C03CA04	TORASEMIDE TEVA, tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
1422717	torasemiid, 10mg	C03CA04	TORASEMIDE HEXAL, tablett, 30TK	HEXAL AG	50						
1770892	torasemiid, 10mg	C03CA04	TORASEMIDE HEXAL, tablett, 30TK	First Pharma OÜ	50						
1032321	torasemiid, 200mg	C03CA04	TRIFAS 200 MG, tablett, 30TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
1158106	torasemiid, 200mg	C03CA04	TORASEMIDE HEXAL 200 MG, tablett, 30TK	HEXAL AG	50						
1165957	torasemiid, 5mg	C03CA04	TORASEMIDE TEVA, tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
1015399	tramadool, 100mg	N02AX02	TRAMAL, rektaalsuposiit, 5TK	STADA Arzneimittel AG	50						
1032691	tramadool, 100mg	N02AX02	TRAMADOL LANNACHER, rektaalsuposiit, 5TK	G.L. Pharma GmbH	50						
1043525	tramadool, 100mg	N02AX02	TRAMADOL KRKA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
1075665	tramadool, 100mg	N02AX02	TRAMADOL LANNACHER 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						
1075890	tramadool, 100mg	N02AX02	TRAMAL RETARD 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	STADA Arzneimittel AG	50						
1174621	tramadool, 100mg	N02AX02	MABRON RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Medochemie Ltd	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1041545	tramadool, 150mg	N02AX02	TRAMAL RETARD 150 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 10TK	STADA Arzneimittel AG	50						
1085857	tramadool, 150mg	N02AX02	TRAMADOL LANNACHER 150MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						
1174632	tramadool, 150mg	N02AX02	MABRON RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Medochemie Ltd	50						
1759743	tramadool, 150mg	N02AX02	OLTERON, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
1041556	tramadool, 200mg	N02AX02	TRAMAL RETARD 200 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 10TK	STADA Arzneimittel AG	50						
1085879	tramadool, 200mg	N02AX02	TRAMADOL LANNACHER 200 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						
1174643	tramadool, 200mg	N02AX02	MABRON RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Medochemie Ltd	50						
1759822	tramadool, 200mg	N02AX02	OLTERON, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
1015580	tramadool, 50mg	N02AX02	TRAMADOL KRKA, kõvakapsel, 20TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
1032679	tramadool, 50mg	N02AX02	TRAMADOL LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	G.L. Pharma GmbH	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1656952	trametiniib, 0,5mg	L01XE25	MEKINIST, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Novartis Europharm Limited	100	C43-C43	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) otsuse alusel BRAF V600 mutatsiooniga kaugelearenenud mitteresetseeritava või metastaatilise (IIIc-IV st) melanoomi raviks juhul, kui patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ning eelneva 3 ravikuu järel (ravi alustamisel) ja edaspidi 3-kuulise intervalliga hinnatuna püsib haigus vähemalt stabiilsena (KT- või/ja muu asjakohase uuringu alusel hinnatuna haiguse progressiooni ei esine). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi trametiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.01.2018.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1656985	trametiniib, 2mg	L01XE25	MEKINIST, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Novartis Europharm Limited	100	C43-C43	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) otsuse alusel BRAF V600 mutatsiooniga kaugelarenenud mitteresetseeritava või metastaatilise (IIIc-IV st) melanoomi raviks juhul, kui patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ning eelneva 3 ravikuu järel (ravi alustamisel) ja edaspidi 3-kuulise intervalliga hinnatuna püsib haigus vähemalt stabiilsena (KT- või/ja muu asjakohase uuringu alusel hinnatuna haiguse progressiooni ei esine). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi trametiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.01.2018.
1074765	trandolapriil, 2mg	C09AA10	GOPTEN, kõvakapsel, 28TK	BGP Products SIA	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1327520	trandolapriil, 4mg	C09AA10	GOPTEN, kõvakapsel, 28TK	BGP Products SIA	50	I10-I13, I15-I15					
					75						
1233290	trandolapriil+verapamiil, 2mg+180mg	C09BB10	TARKA, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 28TK	BGP Products SIA	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1377660	trandolapriil+verapamiil, 4mg+240mg	C09BB10	TARKA, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 28TK	BGP Products SIA	50	I10-I13, I15-I15					
					75						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1083316	traneksaamhape, 500mg	B02AA02	CYKLOKAPRON, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Meda AB	50						
1130454	travoprost, 40mcg 1ml	S01EE04	TRAVATAN, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Novartis Europharm Limited	100 50	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1600614	travoprost, 40mcg 1ml	S01EE04	BONDULC, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Actavis Group PTC ehf	50 100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1608027	travoprost, 40mcg 1ml	S01EE04	TRAVOPROST ZENTIVA, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Zentiva k.s.	100 50	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1186040	treprostiniil, 1mg 1ml	B01AC21	REMODULIN, infusioonilahus, 20ml 1TK	Ferrer Internacional, SA.	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Pediaater, Kardioloog				NYHA III või IV kl idiopaatilise või päriliku pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kopsusiirdamise järjekorras olevale patsiendile, kellel muud ravivõimalused on ebapiisavad või ravivormi tõttu sobimatud
1186062	treprostiniil, 2,5mg 1ml	B01AC21	REMODULIN, infusioonilahus, 20ml 1TK	Ferrer Internacional, SA.	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Pediaater, Kardioloog				NYHA III või IV kl idiopaatilise või päriliku pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kopsusiirdamise järjekorras olevale patsiendile, kellel muud ravivõimalused on ebapiisavad või ravivormi tõttu sobimatud

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1186073	treprostiniil, 5mg 1ml	B01AC21	REMODULIN, infusioonilahus, 20ml 1TK	Ferrer Internacional, SA.	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pediaater, Pulmonoloog				NYHA III või IV kl idiopaatilise või päriliku pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kopsusiirdamise järjekorras olevale patsiendile, kellel muud ravivõimalused on ebapiisavad või ravivormi tõttu sobimatud
1008425	triamtsinoloon, 40mg 1ml	H02AB08	KENALOG, süstesuspensioon, 1ml 5TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
1014422	triheksüfenidüül, 2mg	N04AA01	CYCLODOL, tablett, 50TK	AS Grindeks	50						
1109641	trimetasidiin, 35mg	C01EB15	PREDUCTAL MR, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	Les Laboratories Servier	50						
1293162	trimetasidiin, 35mg	C01EB15	TRIMETAZIDINE TEVA 35MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Teva Pharma B.V.	50						
1401411	trimetasidiin, 35mg	C01EB15	TRIMETAZIDINE ACTAVIS, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1016312	trimetoprim, 100mg	J01EA01	TRIMETOP 100MG, tablett, 30TK	VITABALANS OY	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused	
1400421	triptoreliin, 11,25mg	L02AE04	DIPHERELINE 11,25 MG, toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK	Ipsen Pharma	75	N80-N80	Günekoloog					III-IV astme endometriooosi põdevatele patsientidele
					100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				lokaalse või lokaalselt levinud ja kõrge riskiga eesnäärmevähiga patsientidele (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kokkuvõttes kuni 2 aasta vältel, ravimi väljakirjutamise õigus alates 13. ravinädalast	
					75	E22.8-E22.8	Pediaater, Endokrinoloog					
					50							
					100	N97.0-N97.9, Z31.0- Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1040397	triptoreliin, 3,75mg	L02AE04	DIPHERELINE 3,75 MG, toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK	Ipsen Pharma	75	N80-N80	Günekoloog				III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele
					100	N97.0-N97.9, Z31.0- Z31.9			41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks	
					75	E22.8-E22.8	Pediaater, Endokrinoloog				
					100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog			lokaalse või lokaalselt levinud ja kõrge riskiga eesnäärmevähiga patsientidele (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfiõlmehaardete või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kokkuvõttes kuni 2 aasta vältel, ravimi väljakirjutamise õigus alates 13. ravinädalast	
					50						
1007963	tromantadiin, 1%	D06BB02	VIRU-MERZ SEROL GEEL, geel, 2g 1TK	Merz Pharmaceuticals GmbH	50						
1090189	trosipiumkloriid, 15mg	G04BD09	SPASMED 15, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	PRO.MED.CS Praha a.s.	50						
1025064	tsefadroksiil, 1g	J01DB05	DURACEF, lahustuv tablett, 10TK	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o	50						
1027134	tsefadroksiil, 500mg	J01DB05	DURACEF, kõvakapsel, 12TK	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1067318	tsefadroksiil, 50mg 1ml	J01DB05	DURACEF, suukaudse suspensiooni pulber, 100ml 1TK	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o	50						
1068320	tsefprosiil, 250mg	J01DC10	CEFZIL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o	50						
1068375	tsefprosiil, 500mg	J01DC10	CEFZIL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o	50						
1028506	tsefprosiil, 50mg 1ml	J01DC10	CEFZIL, suukaudse suspensiooni pulber, 60ml 1TK	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o	50						
1007110	tsefuroksiim, 250mg	J01DC02	ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
1438387	tsefuroksiim, 250mg	J01DC02	AXETINE, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Medochemie Ltd.	50						
1659922	tsefuroksiim, 250mg	J01DC02	FUROCEF, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Krka, d.d., Novo mesto	50						
1137350	tsefuroksiim, 25mg 1ml	J01DC02	ZINNAT, suukaudse suspensiooni graanulid, 100ml 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
1007143	tsefuroksiim, 500mg	J01DC02	ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
1287840	tsefuroksiim, 500mg	J01DC02	ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
1438398	tsefuroksiim, 500mg	J01DC02	AXETINE, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Medochemie Ltd.	50						
1580947	tsefuroksiim, 500mg	J01DC02	AXETINE, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Medochemie Ltd.	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1659988	tsefuroksiim, 500mg	J01DC02	FUROCEF, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Krka, d.d., Novo mesto	50						
1660003	tsefuroksiim, 500mg	J01DC02	FUROCEF, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Krka, d.d., Novo mesto	50						
1073641	tselekoksiib, 100mg	M01AH01	CELEBREX, kõvakapsel, 20TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1596719	tselekoksiib, 100mg	M01AH01	ACLEXA, kõvakapsel, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
1596797	tselekoksiib, 200mg	M01AH01	ACLEXA, kõvakapsel, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
1684560	tseritiniib, 150mg	L01XE28	ZYKADIA, kõvakapsel, 150TK	Novartis Europharm Limited	100	C34-C34	Onkoloog				anaplastilise lümfoomkineaaspositiivse kaugelearenenud varem ravimata mitteväikerakk-kopsuvähi raviks heas üldseisundis (ECOG 0-2) täiskasvanud patsientidele
1077836	tsetirisiin, 10mg	R06AE07	ZYRTEC, tablett, 30TK	UCB Pharma Oy Finland	50						
1098918	tsetirisiin, 10mg	R06AE07	CETIRIZIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1121870	tsetirisiin, 10mg	R06AE07	ACETERIN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1430750	tsetirisiin, 10mg	R06AE07	CETRIX 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	VITABALANS OY	50						
1430772	tsetirisiin, 10mg	R06AE07	CETRIX 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	VITABALANS OY	50						
1022869	tsetirisiin, 10mg 1ml	R06AE07	ZYRTEC, suukaudsed tilgad, lahus, 20ml 1TK	UCB Pharma Oy Finland	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1728637	tsetirisiin, 10mg 1ml	R06AE07	ZYRTEC, suukaudsed tilgad, lahus, 20ml 1TK	Globalex Pharma OÜ	50						
1043356	tsetroreliks, 0,25mg	H01CC02	CETROTIDE, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Merck Europe B.V.	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1205132	tsinakaltseet, 30mg	H05BX01	MIMPARA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Amgen Europe B.V.	50						
					100	N18-N18	Nefroloog, Pediaater				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid vastunäidustatud
1667370	tsinakaltseet, 30mg	H05BX01	CINACALCET TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					100	N18-N18	Pediaater, Nefroloog				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid vastunäidustatud

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1667538	tsinakaltseet, 30mg	H05BX01	CINACALCET ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare Limited	100	N18-N18	Nefroloog, Pediaater				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analogueidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analogueid vastunäidustatud
					50						
1205176	tsinakaltseet, 60mg	H05BX01	MIMPARA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Amgen Europe B.V.	50	N18-N18	Pediaater, Nefroloog				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analogueidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analogueid vastunäidustatud
					100						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1667448	tsinakaltseet, 60mg	H05BX01	CINACALCET TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					100	N18-N18	Nefroloog, Pediaater				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid vastunäidustatud
1667572	tsinakaltseet, 60mg	H05BX01	CINACALCET ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare Limited	50						
					100	N18-N18	Pediaater, Nefroloog				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid vastunäidustatud

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1205211	tsinakaltseet, 90mg	H05BX01	MIMPARA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Amgen Europe B.V.	50						
					100	N18-N18	Nefroloog, Pediaater				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid vastunäidustatud
1667606	tsinakaltseet, 90mg	H05BX01	CINACALCET ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare Limited	100	N18-N18	Nefroloog, Pediaater				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid vastunäidustatud
					50						
1196388	tsink, 25mg	A16AX05	WILZIN, kõvakapsel, 250TK	Orphan Europe SARL	100	E83.0-E83.0	Neuroloog, Gastroenteroloog	esmane			
1196377	tsink, 50mg	A16AX05	WILZIN, kõvakapsel, 250TK	Orphan Europe SARL	100	E83.0-E83.0	Neuroloog, Gastroenteroloog	esmane			
1005488	tsiprofloksatsiin, 250mg	J01MA02	CIPRINOL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	KRKA d.d., Novo mesto	100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater				
					100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog				
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1042827	tsiprofloksatsiin, 3mg 1ml	S01AE03	CILOXAN, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	SIA "Novartis Baltics"	50						
1005545	tsiprofloksatsiin, 500mg	J01MA02	CIPRINOL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	KRKA d.d., Novo mesto	100	D60-D64	Pediaater, Hematoloog				
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater				
					50						
1223929	tsiprofloksatsiin, 500mg	J01MA02	CIPROFLOXACIN SANDOZ 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater				
					50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater				
1500994	tsiprofloksatsiin, 500mg	J01MA02	CIPROFLOXACIN OLAINFARM, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	JSC Olainfarm	50						
					100	D60-D64	Pediaater, Hematoloog				
					100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog				
1218361	tsitalopraam, 10mg	N06AB04	CITALOPRAM - TEVA 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2- F32.3	Psühhiaater	esmane			
1083563	tsitalopraam, 20mg	N06AB04	CITALEC 20, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva a.s.	100	F33.2-F33.3, F32.2- F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1112937	tsitalopraam, 20mg	N06AB04	CIRAL 20 MG, kaetud tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	F33.2-F33.3, F32.2- F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1185409	tsitalopraam, 20mg	N06AB04	CITALOPRAM ACTAVIS 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	100	F33.2-F33.3, F32.2- F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1218462	tsitalopraam, 20mg	N06AB04	CITALOPRAM - TEVA 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2- F32.3	Psühhiaater	esmane			
1443631	tsitalopraam, 20mg	N06AB04	CITALOPRAM VITABALANS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	VITABALANS OY	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2- F32.3	Psühhiaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused	
1185533	tsitalopraam, 40mg	N06AB04	CITALOPRAM ACTAVIS 40 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane				
					50							
1218563	tsitalopraam, 40mg	N06AB04	CITALOPRAM - TEVA 40MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50							
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane				
1443697	tsitalopraam, 40mg	N06AB04	CITALOPRAM VITABALANS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	VITABALANS OY	50							
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane				
1021790	tsüklofosfamiid, 50mg	L01AA01	ENDOXAN, kaetud tablett, 50TK	Baxter Oncology GmbH	50							
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater					
					75	M45-M46, M08-M08, M30-M35, M05-M06	Pediaater, Reumatoloog					
					100	C00-D48	Onkoloog, Hematoloog					
1123760	tsüklopentolaat, 10mg 1ml	S01FA04	CYCLOGYL, silmatilgad, lahus, 15ml 1TK	s.a. Alcon-Couvreur N.V.	50						silmahaiguste ambulatoorseks raviks	
1008559	tsüklosporiin, 100mg	L04AD01	SANDIMMUN NEORAL, pehmekapsel, 50TK	SIA "Novartis Baltics"	75	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater, Reumatoloog					
					75	N00-N08	Pediaater, Nefroloog					
					100	D46-D46	Hematoloog					
					100	Z94-Z94, T86-T86						
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46	Reumatoloog, Pediaater					
					100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater					
					50							
					75	L50.8-L50.9, L50.1-L50.5						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1098840	tsüklosporiin, 100mg	L04AD01	EQUORAL 100 MG, pehmekapsel, 50TK	Teva B.V.	100	D60-D64	Pediaater, Hematoloog				
					100	D46-D46	Hematoloog				
					75	L50.8-L50.9, L50.1- L50.5					
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46	Pediaater, Reumatoloog				
					50						
					75	L40-L40	Reumatoloog, Pediaater, Dermatoveneroloog				
1008526	tsüklosporiin, 25mg	L04AD01	SANDIMMUN NEORAL, pehmekapsel, 50TK	SIA "Novartis Baltics"	100	D60-D64	Pediaater, Hematoloog				
					50						
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46	Reumatoloog, Pediaater				
					75	L40-L40	Pediaater, Reumatoloog, Dermatoveneroloog				
					75	N00-N08	Nefrooloog, Pediaater				
					75	L50.8-L50.9, L50.1- L50.5					
100	D46-D46	Hematoloog									

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1098828	tsüklosporiin, 25mg	L04AD01	EQUORAL 25 MG, pehmekapsel, 50TK	Teva B.V.	100	D46-D46	Hematoloog				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46	Pediaater, Reumatoloog				
					50						
					75	L40-L40	Dermatoveneroloog, Reumatoloog, Pediaater				
					100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater				
					75	L50.8-L50.9, L50.1- L50.5					
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater				
1008548	tsüklosporiin, 50mg	L04AD01	SANDIMMUN NEORAL, pehmekapsel, 50TK	SIA "Novartis Baltics"	50						
					100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater				
					75	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater, Reumatoloog				
					75	N00-N08	Pediaater, Nefroloog				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46	Reumatoloog, Pediaater				
					100	D46-D46	Hematoloog				
					75	L50.8-L50.9, L50.1- L50.5					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1098839	tsüklosporiin, 50mg	L04AD01	EQUORAL 50 MG, pehmekapsel, 50TK	Teva B.V.	75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater				
					100	D46-D46	Hematoloog				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					50						
					75	L50.8-L50.9, L50.1- L50.5					
					75	L40-L40	Pediaater, Reumatoloog, Dermatoveneroloog				
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46	Reumatoloog, Pediaater				
					100	D60-D64	Pediaater, Hematoloog				
1064124	tsüproteroon, 50mg	G03HA01	ANDROCUR, tablett, 50TK	Bayer AG	100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosest kastratsioonist)
					50						
1014488	tsüproteroon+östrogeen, 2mg+0,035mg	G03HB01	DIANE, kaetud tablett, 21TK	Bayer AG	50						
1557435	ulipristaal, 5mg	G03XB02	ESMYA, tablett, 28TK	Gedeon Richter Plc.	50						
1646940	umekliidiinium, 55mcg 1annust	R03BB07	INCRUSE ELLIPTA, annustatud inhalatsioonipulber, 30annust 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused	
1016985	ursodeoksükoolhape, 250mg	A05AA02	URSOSAN, kõvakapsel, 50TK	PRO.MED.CS Praha a.s.	75	K74-K74, K73-K73	Gastroenteroloog, Pediaater					
					50							
1709401	ursodeoksükoolhape, 250mg	A05AA02	URSOGRIX, kõvakapsel, 50TK	AS Grindeks	75	K73-K74	Pediaater, Gastroenteroloog					
					50							
1301094	valatsikloviir, 1000mg	J05AB11	VALACICLOVIR ACTAVIS 1000MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Actavis Group PTC ehf	50							
1016301	valatsikloviir, 500mg	J05AB11	VALTREX, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations	50							
1300936	valatsikloviir, 500mg	J05AB11	VALACICLOVIR ACTAVIS 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Actavis Group PTC ehf	50							
1369593	valatsikloviir, 500mg	J05AB11	VALACICLOVIR ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	SIA ELVIM	50							
1043592	valproehape, 150mg	N03AG01	CONVULEX 150 MG, gastroresistentne pehmekapsel, 100TK	G.L. Pharma GmbH	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane				
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane				
					50							

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1076419	valproehape, 150mg	N03AG01	ORFIRIL LONG 150 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
1108246	valproehape, 150mg	N03AG01	ORFIRIL 150, gastroresistentne tablett, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1043604	valproehape, 300mg	N03AG01	CONVULEX 300 MG, gastroresistentne pehmekapsel, 100TK	G.L. Pharma GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
1077308	valproehape, 300mg	N03AG01	ORFIRIL LONG 300 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1086555	valproehape, 300mg	N03AG01	DEPAKINE CHRONO 300 mg, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
1108257	valproehape, 300mg	N03AG01	ORFIRIL 300, gastroresistentne tablett, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1076341	valproehape, 500mg	N03AG01	ORFIRIL LONG 500 MG, toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1086544	valproehape, 500mg	N03AG01	DEPAKINE CHRONO 500 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Sanofi-Aventis Estonia OÜ	100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1224672	valproehape, 500mg	N03AG01	VALPROATE SODIUM SANDOZ 500MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
1043581	valproehape, 50mg 1ml	N03AG01	CONVULEX, siirup, 100ml 1TK	G.L. Pharma GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1108268	valproehape, 600mg	N03AG01	ORFIRIL 600, gastroresistentne tablett, 50TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
1025536	valproehape, 60mg 1ml	N03AG01	ORFIRIL SAFT, suukaudne lahus, 250ml 1TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
1092844	valsartaan, 160mg	C09CA03	DIOVAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	SIA "Novartis Baltics"	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1250378	valsartaan, 160mg	C09CA03	VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1250389	valsartaan, 160mg	C09CA03	VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1434495	valsartaan, 160mg	C09CA03	VALZAP, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1515057	valsartaan, 160mg	C09CA03	VALSARTAN MEDOCHEMIE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Medochemie Ltd.	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1515079	valsartaan, 160mg	C09CA03	VALSARTAN MEDOCHEMIE, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Medochemie Ltd.	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1421233	valsartaan, 320mg	C09CA03	VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1250323	valsartaan, 80mg	C09CA03	VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1434473	valsartaan, 80mg	C09CA03	VALZAP, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
1514854	valsartaan, 80mg	C09CA03	VALSARTAN MEDOCHEMIE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Medochemie Ltd.	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1514876	valsartaan, 80mg	C09CA03	VALSARTAN MEDOCHEMIE, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Medochemie Ltd.	75	I15-I15, I50-I50, I10- I13					
					50						
1675324	valsartaan+amlodipiin, 160mg+10mg	C09DB01	WAMLOX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1676886	valsartaan+amlodipiin, 160mg+10mg	C09DB01	AMLODIPINE /VALSARTAN SANDOZ, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1675234	valsartaan+amlodipiin, 160mg+5mg	C09DB01	WAMLOX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1676808	valsartaan+amlodipiin, 160mg+5mg	C09DB01	AMLODIPINE /VALSARTAN SANDOZ, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1324314	valsartaan+hüdroklorot iasiid, 160mg+12,5mg	C09DA03	VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1434518	valsartaan+hüdroklorot iasiid, 160mg+12,5mg	C09DA03	VALZAP H, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1324235	valsartaan+hüdroklorot iasiid, 160mg+25mg	C09DA03	VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1457557	valsartaan+hüdroklorot iasiid, 320mg+12,5mg	C09DA03	VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1324156	valsartaan+hüdroklorot iasiid, 80mg+12,5mg	C09DA03	VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1434530	valsartaan+hüdroklorot iasiid, 80mg+12,5mg	C09DA03	VALZAP H, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1704181	valsartaan+sakubitrilil, 102,8mg+97,2mg	C09DX04	ENTRESTO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Novartis Europharm Limited	75	I50-I50	Kardioloog, Sisearst	esmane			täiskasvanud patsientidele, kes vastavad kõigile järgnevatele kriteeriumitele: kellel on vähenenud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon (LVEF<=35%), kes kuuluvad NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea, keda on eelnevalt vähemalt 3 kuud püsivalt ravitud Euroopa ravijuhendi järgse AKE-inhibiitori või ARB eesmärknusega (selle dokumenteeritud talumatuse korral vähemalt keskmise annusega), kombinatsioonis maksimaalses talutavas annuses beetablokaatoriga ning kellel kaksikravile mineralokortikoidiretse ptori antagonisti lisamise järgselt südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1704147	valsartaan+sakubitrilil, 25,7mg+24,3mg	C09DX04	ENTRESTO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novartis Europharm Limited	75	I50-I50	Sisearst, Kardioloog	esmane			täiskasvanud patsientidele, kes vastavad kõigile järgnevatele kriteeriumitele: kellel on vähenenud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon (LVEF<=35%), kes kuuluvad NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea, keda on eelnevalt vähemalt 3 kuud püsivalt ravitud Euroopa ravijuhendi järgse AKE-inhibiitori või ARB eesmärknusega (selle dokumenteeritud talumatuse korral vähemalt keskmise annusega), kombinatsioonis maksimaalses talutavas annuses beetablokaatoriga ning kellel kaksikravile mineralokortikoidiretse ptori antagonisti lisamise järgselt südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1704169	valsartaan+sakubitrilil, 51,4mg+48,6mg	C09DX04	ENTRESTO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Novartis Europharm Limited	75	I50-I50	Kardioloog, Sisearst	esmane			täiskasvanud patsientidele, kes vastavad kõigile järgnevatele kriteeriumitele: kellel on vähenenud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon (LVEF<=35%), kes kuuluvad NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea, keda on eelnevalt vähemalt 3 kuud püsivalt ravitud Euroopa ravijuhendi järgse AKE-inhibiitori või ARB eesmärknusega (selle dokumenteeritud talumatuse korral vähemalt keskmise annusega), kombinatsioonis maksimaalses talutavas annuses beetablokaatoriga ning kellel kaksikravile mineralokortikoidiretse ptori antagonisti lisamise järgselt südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad
1008335	varfariin, 3mg	B01AA03	MAREVAN, tablett, 100TK	Orion Corporation	50						
					75	I47-I49					
					100	I80-I82, Z95.2- Z95.2, I26-I26, T82- T82, I67.6-I67.6, I27.0-I27.0					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1008368	varfariin, 5mg	B01AA03	MAREVAN FORTE, tablett, 100TK	Orion Corporation	100	I80-I82, Z95.2- Z95.2, I26-I26, T82- T82, I67.6-I67.6, I27.0-I27.0					
					50						
					75	I47-I49					
1232468	venlafaksiin, 150mg	N06AX16	ALVENTA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
1261741	venlafaksiin, 150mg	N06AX16	VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR 150 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	Medochemie Ltd	50						
1306325	venlafaksiin, 150mg	N06AX16	VENLAGAMMA 150 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	50						
1316405	venlafaksiin, 150mg	N06AX16	ARGOFAN 150 SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Zentiva a.s.	50						
1435205	venlafaksiin, 150mg	N06AX16	VENLAFAXINE ELVIM, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	SIA ELVIM	50						
1232266	venlafaksiin, 37,5mg	N06AX16	ALVENTA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
1232367	venlafaksiin, 75mg	N06AX16	ALVENTA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
1261684	venlafaksiin, 75mg	N06AX16	VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR 75 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	Medochemie Ltd	50						
1306246	venlafaksiin, 75mg	N06AX16	VENLAGAMMA 75 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	50						
1316371	venlafaksiin, 75mg	N06AX16	ARGOFAN 75 SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Zentiva a.s.	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1435182	venlafaksiin, 75mg	N06AX16	VENLAFAXINE ELVIM, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	SIA ELVIM	50						
1073157	verapamiil, 120mg	C08DA01	ISOPTIN RETARD 120 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Mylan Healthcare GmbH	75	I10-I13, I15-I15					
					75	I47-I49	Pediaater, Kardioloog	esmane			
					50						
1073180	verapamiil, 240mg	C08DA01	ISOPTIN RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Mylan Healthcare GmbH	75	I10-I13, I15-I15					
					75	I47-I49	Kardioloog, Pediaater	esmane			
					50						
1073405	verapamiil, 80mg	C08DA01	VERAPAMIL- RATIOPHARM 80 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	ratiopharm GmbH	75	I47-I49	Pediaater, Kardioloog	esmane			
					50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1632361	vilanterool+flutikasoonf uroaat, 22mcg+184mcg 1annust	R03AK10	RELVAR ELLIPTA, annustatud inhalatsioonipulber, 30annust 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	75	J45-J45					
					50						
1632338	vilanterool+flutikasoonf uroaat, 22mcg+92mcg 1annust	R03AK10	RELVAR ELLIPTA, annustatud inhalatsioonipulber, 30annust 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			III-IV staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel on viimase 3 aasta jooksul esinenud vähemalt 3 süsteemse glükokortikoidiga ravitud haiguse ägenemist
					75	J45-J45					
1649224	vilanterool+umekliidiini um, 22mcg+55mcg 1annuses	R03AL03	ANORO ELLIPTA, annustatud inhalatsioonipulber, 30annust 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1756436	vilanterool+umekliidiini um+flutikasoonfuroaat, 22mcg+55mcg+92mcg 1annust	R03AL08	TRELEGY ELLIPTA, annustatud inhalatsioonipulber, 30annust 1TK	GlaxoSmithKline Trading Services Ltd.	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			III-IV staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel on viimase 3 aasta jooksul esinenud vähemalt 3 süsteemse glükokortikoidiga ravitud haiguse ägenemist
					50						
1316326	vildagliptiin, 50mg	A10BH02	GALVUS, tablett, 60TK	Novartis Europharm Limited	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						
1712438	vildagliptiin, 50mg	A10BH02	SAXOTIN, tablett, 60TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1714160	vildagliptiin, 50mg	A10BH02	DALMEVIN, tablett, 60TK	Medochemie Ltd	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
1729436	vildagliptiin, 50mg	A10BH02	GLYPVILO, tablett, 60TK	KRKA d.d., Novo mesto	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
1038091	von Willebrandi faktor+VIII hüübimisfaktor, 375RÜ+500RÜ	B02BD06	IMMUNATE 500 RÜ/375 RÜ, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	D68.0-D68.0, D68.4-D68.4, D66-D66	Hematoloog, Pediaater				
1349232	von Willebrandi faktor+VIII hüübimisfaktor, 750RÜ+1000RÜ	B02BD06	IMMUNATE 1000 RÜ/750 RÜ, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	D68.0-D68.0, D68.4-D68.4, D66-D66	Pediaater, Hematoloog				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1107975	vorikonasool, 200mg	J02AC03	VFEND, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					väljakirjutamise õigus kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks, kui muud suukaudsed seenevastased ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud
1561823	vorikonasool, 200mg	J02AC03	VORICONAZOLE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Teva Pharma B.V.	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					väljakirjutamise õigus kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks, kui muud suukaudsed seenevastased ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1615902	vorikonasool, 200mg	J02AC03	VORICONAZOLE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					väljakirjutamise õigus kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks, kui muud suukaudsed seenevastased ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud
1031746	östradiol, 0,01% 1g	G03CA03	LINOLADIOL N, kreem, 25g 1TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1380721	östradiol, 10mcg	G03CA03	VAGIFEM, vaginaaltablett, 18TK	Novo Nordisk A/S	50						
1030442	östradiol, 1mg	G03CA03	ESTROFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novo Nordisk A/S	100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Endokrinoloog, Gynecoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
					50						
1063415	östradiol, 1mg 1g	G03CA03	DIVIGEL, transdermaalne geel, 1g 28TK	Orion Corporation	50						
1030431	östradiol, 2mg	G03CA03	ESTROFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novo Nordisk A/S	100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Endokrinoloog, Gynecoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
					50						
1684111	östradiol, 2mg	G03CA03	ESTROFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	First Pharma OÜ	50	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Endokrinoloog, Gynecoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
					100						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1031735	östradiool+prednisoloon, 0,05mg+4mg 1g	G03CA80	LINOLADIOL-H N, kreem, 25g 1TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1022634	östriool, 500mcg	G03CA04	OVESTIN, vaginaalsuposiit, 15TK	Aspen Pharma Trading Limited	50						