

EESTI HAIGEKASSA RAVIMITE LOETELU

Lisatakse read järgmises sõnastuses:

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1628636	alfafollitropiin, 300RÜ 0.5ml	G03GA05	OVALEAP, süstelahus, 0.5ml 1TK	Teva B.V.	50						
1628647	alfafollitropiin, 450RÜ 0.75ml	G03GA05	OVALEAP, süstelahus, 0.75ml 1TK	Teva B.V.	50						
1628658	alfafollitropiin, 900RÜ 1.5ml	G03GA05	OVALEAP, süstelahus, 1.5ml 1TK	Teva B.V.	50						
1703630	aripiprasool, 15mg	N05AX12	ARIPIPRAZOLE ACCORD, tablett, 28TK	Accord Healthcare Limited	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1610536	atomoksetiin, 10mg	N06BA09	ATOMINEX 10MG, kõvakapsel, 56TK	Zentiva k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19-aastastele lastele ja noorukitele aktiivsuse ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on vastunäidustatud,

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1610615	atomoksetiin, 18mg	N06BA09	ATOMINEX 18MG, kõvakapsel, 56TK	Zentiva k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19-aastastele lastele ja noorukitele aktiivsuse ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on vastunäidustatud,

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1610693	atomoksetiin, 25mg	N06BA09	ATOMINEX 25 MG, kõvakapsel, 56TK	Zentiva k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19- aastastele lastele ja noorukitele aktiivsus- ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C- GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on vastunäidustatud,

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1610772	atomoksetiin, 40mg	N06BA09	ATOMINEX 40 MG, kõvakapsel, 56TK	Zentiva k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19- aastastele lastele ja noorukitele aktiivsus- ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoterapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C- GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on vastunäidustatud,

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1610851	atomoksetiin, 60mg	N06BA09	ATOMINEX 60 MG, kõvakapsel, 56TK	Zentiva k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19- aastastele lastele ja noorukitele aktiivsus- ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoterapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C- GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on vastunäidustatud,

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul
1683952	bisoprolol, 10mg	C07AB07	BISOPROLOL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare Limited	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					75	I47-I49	Kardioloog, Pediaater	esmane			
1683794	bisoprolol, 2,5mg	C07AB07	BISOPROLOL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare Limited	75	I47-I49	Kardioloog, Pediaater	esmane			
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						
1683873	bisoprolol, 5mg	C07AB07	BISOPROLOL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare Limited	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						
					75	I47-I49	Pediaater, Kardioloog	esmane			
1670419	duloksetiin, 30mg	N06AX21	ONELAR, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Medochemie Ltd.	50						
1699117	duloksetiin, 30mg	N06AX21	DULOXETINE SANDOZ, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Sandoz d.d.	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1670510	duloksetiin, 60mg	N06AX21	ONELAR, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Medochemie Ltd.	50						
					75	G63.2-G63.2	Neuroloog, Endokrinoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
1699140	duloksetiin, 60mg	N06AX21	DULOXETINE SANDOZ, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Sandoz d.d.	50						
					75	G63.2-G63.2	Neuroloog, Endokrinoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1659360	glatirameeratsetaat, 20mg 1ml	L03AX13	REMUREL, süstelahus süstlis, 1ml 28TK	Alvogen IPCo S.ar.l.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks patsientidele, kellele beetainterferoon on meditsiiniliselt vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks või talumatuks, soodustus kehtib alates 1. novembrist 2016. a
7017432	imikute toitesegu,		INFATRINI, suspensioon, 125ml N24	Nutricia	75	E42-E42				1,00	lastele, kellele on paigaldatud gastrostoom või jejunostoom
1544004	kapetsitabiin, 500mg	L01BC06	CAPECITABINE SANDOZ, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					100	C18-C20	Onkoloog				kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliativseks monokemoterapiaks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1657290	pregabaliin, 75mg	N03AX16	PREGAGAMMA, kõvakapsel, 14TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	75	G63.2-G63.2	Neuroloog, Endokrinoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane		kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid	
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1657346	pregabaliin, 75mg	N03AX16	PREGAGAMMA, kõvakapsel, 56TK	WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG	75	G63.2-G63.2	Endokrinoloog, Neuroloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane		kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid	
					50						
1679272	rasagiliin, 1mg	N04BD02	SAGILIA, tablett, 30TK	Medochemie Ltd	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1679340	rasagiliin, 1mg	N04BD02	RASAGILINE ACCORD, tablett, 28TK	Accord Healthcare Limited	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1643161	telmisartaan+amlodipiin, 80mg+10mg	C09DB04	MIXOR, tablett, 28TK	Zentiva k.s.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1643071	telmisartaan+amlodipiin, 80mg+5mg	C09DB04	MIXOR, tablett, 28TK	Zentiva k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1667370	tsinakaltseet, 30mg	H05BX01	CINACALCET TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	100	N18-N18	Pediaater, Nefroloog				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid vastunäidustatud
					50						
1667538	tsinakaltseet, 30mg	H05BX01	CINACALCET ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare Limited	50	N18-N18	Nefroloog, Pediaater				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid vastunäidustatud
					100						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1667448	tsinakaltseet, 60mg	H05BX01	CINACALCET TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	100	N18-N18	Pediaater, Nefroloog				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid vastunäidustatud
					50						
1667572	tsinakaltseet, 60mg	H05BX01	CINACALCET ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare Limited	50	N18-N18	Pediaater, Nefroloog				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid vastunäidustatud
					100						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1667606	tsinakaltseet, 90mg	H05BX01	CINACALCET ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare Limited	100	N18-N18	Pediaater, Nefroloog				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analogueidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analogueid vastunäidustatud
					50						
1561823	vorikonasool, 200mg	J02AC03	VORICONAZOLE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Teva Pharma B.V.	100	B45-B45, B48.2- B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44- B44					väljakirjutamise õigus kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks, kui muud suukaudsed seenevastased ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud

Muudetakse read ja sõnastatakse järgmiselt:

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1349872	ambrisentaan, 10mg	C02KX02	VOLIBRIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Glaxo Group Ltd.	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Reumatoloog, Pediaater, Pulmonoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafili ja bosentaan on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1349850	ambrisentaan, 5mg	C02KX02	VOLIBRIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Glaxo Group Ltd.	50						
					100	I27.0-I27.0	Pediaater, Kardioloog, Pulmonoloog, Reumatoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafili ja bosentaan on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1275768	dasatiniib, 50mg	L01XE06	SPRYCEL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsivad II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru dasatiniibravi foonil). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi dasatiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2009. a.
					50						
1063303	desogestrel, 75mcg	G03AC09	CERAZETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	N.V. ORGANON	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1505450	desogestreel, 75mcg	G03AC09	DESIRETT 75 MCG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	UAB EXELTIS BALTICS	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1589519	desogestreel, 75mcg	G03AC09	CERAZETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	First Pharma OÜ	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1241244	glatirameeratsetaat, 20mg 1ml	L03AX13	COPAXONE, süstelahus süstlis, 1ml 28TK	Teva Pharmaceuticals Limited	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks patsientidele, kellele beetainterferoon on meditsiiniliselt vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks või talumatuks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1548592	imatiniiib, 100mg	L01XE01	IMATINIB ZENTIVA 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Zentiva k.s.	100	C49.9-C49.9, C16- C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele:diagno ositud KIT-positiivne mitteopereeritav või metastaseerunud pahaloomuline gastrointestinaalne stromaaltruumor ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
					50						
					100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniiibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1549009	imatiiniib, 100mg	L01XE01	IMATINIB SANOSWISS 100MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	UAB SanoSwiss	50						
					100	C49.9-C49.9, C16- C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmiste kriteeriumidele:diagno ositud KIT-positiivne mitteopereeritav või metastaseerunud pahaloomuline gastrointestinaalne stromaaltruumor ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
					100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1566413	imatinib, 100mg	L01XE01	MEAXIN, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Krka d.d. Novo Mesto	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoologi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatinibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)
					50						
					100	C49.9-C49.9, C16-C20	Onkoloog			patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatinibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoologi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele:diagno ositud KIT-positiivne mitteopereeritav või metastaseerunud pahaloomuline gastrointestinaalne stromaaltruumor ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1588417	imatiniib, 100mg	L01XE01	IMATINIB GRINDEKS, kõvakapsel, 120TK	AS Grindeks	50						
					100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)
					100	C49.9-C49.9, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele:diagnoositud KIT-positiivne mitteopereeritav või metastaseerunud pahaloomuline gastrointestinaalne stromaaltruumor ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1604900	imatiniiib, 100mg	L01XE01	IMATINIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Teva B.V.	50						
					100	C49.9-C49.9, C16- C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniiibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele:diagno ositud KIT-positiivne mitteopereeritav või metastaseerunud pahaloomuline gastrointestinaalne stromaaltruumor ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
					100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniiibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1619726	imatiniiib, 100mg	L01XE01	IMATINIB ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Accord Healthcare Limited	100	C49.9-C49.9, C16- C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniiibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele:diagno ositud KIT-positiivne mitteopereeritav või metastaseerunud pahaloomuline gastrointestinaalne stromaaltruumor ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
					50						
					100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniiibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1658448	imatiniib, 100mg	L01XE01	GLIPOX, kõvakapsel, 120TK	UAB Norameda	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoologi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)
					50						
					100	C49.9-C49.9, C16-C20	Onkoloog			patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoologi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele:diagnoositud KIT-positiivne mitteopereeritav või metastaseerunud pahaloomuline gastrointestinaalne stromaaltruumor ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1549043	imatiniib, 400mg	L01XE01	IMATINIB SANOSWISS 400MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	UAB SanoSwiss	100	C49.9-C49.9, C16- C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele:diagno ositud KIT-positiivne mitteopereeritav või metastaseerunud pahaloomuline gastrointestinaalne stromaaltruumor ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
					100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1658471	imatiiniib, 400mg	L01XE01	GLIPOX, kõvakapsel, 30TK	UAB Norameda	50						
					100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)
					100	C49.9-C49.9, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele:diagnoositud KIT-positiivne mitteopereeritav või metastaseerunud pahaloomuline gastrointestinaalne stromaaltruumor ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
1183867	kandesartaan, 32mg	C09CA06	ATACAND, tablett, 28TK	AstraZeneca AB	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1621752	levonorgestreel+etüünü ülöstradiool, 0,15mg+0,03mg	G03AA07	LEVERETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	UAB EXELTIS BALTICS	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1342190	nilotiniib, 200mg	L01XE08	TASIGNA, kõvakapsel, 112TK	Novartis Europharm Limited	50 100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru nilotiniibravi foonil). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi nilotiniibiga on ravimiteotja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2009. a.

Tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1300026	alendroonhape, 70mg	M05BA04	ALENDRONIC ACID ACCORD 70MG, tablett, 4TK	Accord Healthcare Limited	75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1299618	atomoksetiin, 80mg	N06BA09	STRATTERA, kõvakapsel, 28TK	Eli Lilly Holdings Limited	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19- aastastele lastele ja noorukitele aktiivsus- ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C- GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on vastunäidustatud,

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul
1073999	diklofenak, 50mg 1g	M02AA15	DICLAC 5%, geel, 100g 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1325360	doksasosiin, 4mg	C02CA04	DOXAZOSIN TEVA 4 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
1312535	donepesiil, 5mg	N06DA02	DONEPEZIL ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Orion Corporation	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1566446	imatiniib, 400mg	L01XE01	MEAXIN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Krka d.d. Novo Mesto	50						
					100	C92.1-C92.1	Hematoloog				patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: näidustatud on tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)
					100	C49.9-C49.9, C16- C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele:diagno ositud KIT-positiivne mitteopereeritav või metastaseerunud pahaloomuline gastrointestinaalne stromaaltruumor ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
1035908	kandesartaan, 16mg	C09CA06	ATACAND, tablett, 28TK	AstraZeneca AB	50						
1132591	kandesartaan+hüdrokl orotiasiid, 16mg+12,5mg	C09DA06	ATACAND PLUS, tablett, 28TK	AstraZeneca AB	50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1496796	kvetiapiin, 50mg	N05AH04	QUETIAPINE TEVA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				kui risperidoon on vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1063550	medroksüprogesteroon , 150mg 1ml	L02AB02; G03DA02	DEPO-PROVERA, süstesuspensioon, 3.3ml 1TK	Pfizer Enterprises SARL	100	C00-D48	Onkoloog				
					50						
					100	D18.1-D18.1	Onkoloog, Pulmonoloog				
1063561	medroksüprogesteroon , 150mg 1ml	G03DA02; L02AB02	DEPO-PROVERA, süstesuspensioon, 1ml 1TK	Pfizer Enterprises SARL	100	D18.1-D18.1	Pulmonoloog, Onkoloog				
					100	C00-D48	Onkoloog				
					50						
1192227	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	MELOXICAM SANDOZ 7,5 MG, tablett, 50TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1437780	naprokseen+esomepra sool, 500mg+20mg	M01AE52	VIMOVO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 30TK	AstraZeneca AB	50						
1005163	ondansetroon, 8mg	A04AA01	ZOFTRAN, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Novartis Finland OY	50						
					100	C00-D48					suukaudsest keemiaravist põhjustatud iivelduse ja oksendamise profülaktikaks ja raviks juhul, kui metoklopramiid ei ole esmase valikuna soovitatud või see on osutunud ebaefektiivseks

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1286681	pravastatiin, 10mg	C10AA03	PRAVASTATIN ACCORD 10MG, tablett, 28TK	Accord Healthcare Limited	75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					100	N18-N18				alates III staadiumist	
					50						
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
1286704	pravastatiin, 20mg	C10AA03	PRAVASTATIN ACCORD 20MG, tablett, 28TK	Accord Healthcare Limited	100	N18-N18					alates III staadiumist
					75	E78-E78				kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l	
					50						
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1286715	pravastatiin, 40mg	C10AA03	PRAVASTATIN ACCORD 40MG, tablett, 28TK	Accord Healthcare Limited	75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					100	N18-N18				alates III staadiumist	
					50						
					75	I11-I12				raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel	
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
1208652	pregabaliin, 150mg	N03AX16	LYRICA, kõvakapsel, 14TK	Pfizer Limited	50					epilepsia, perifeerse või tsentraalse neuropaatilise valu ja generaliseerunud ärevushäire raviks pärast muu näidustatud farmakoteraapia ebaõnnestumist	
1208663	pregabaliin, 150mg	N03AX16	LYRICA, kõvakapsel, 56TK	Pfizer Limited	50					epilepsia, perifeerse või tsentraalse neuropaatilise valu ja generaliseerunud ärevushäire raviks pärast muu näidustatud farmakoteraapia ebaõnnestumist	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1252617	pregabaliin, 225mg	N03AX16	LYRICA, kõvakapsel, 14TK	Pfizer Limited	50						epilepsia, perifeerse või tsentraalse neuropaatilise valu ja generaliseerunud ärevushäire raviks pärast muu näidustatud farmakoteraapia ebaõnnestumist
1208731	pregabaliin, 300mg	N03AX16	LYRICA, kõvakapsel, 14TK	Pfizer Limited	50						epilepsia, perifeerse või tsentraalse neuropaatilise valu ja generaliseerunud ärevushäire raviks pärast muu näidustatud farmakoteraapia ebaõnnestumist
1208573	pregabaliin, 75mg	N03AX16	LYRICA, kõvakapsel, 14TK	Pfizer Limited	50						epilepsia, perifeerse või tsentraalse neuropaatilise valu ja generaliseerunud ärevushäire raviks pärast muu näidustatud farmakoteraapia ebaõnnestumist
1208584	pregabaliin, 75mg	N03AX16	LYRICA, kõvakapsel, 56TK	Pfizer Limited	50						epilepsia, perifeerse või tsentraalse neuropaatilise valu ja generaliseerunud ärevushäire raviks pärast muu näidustatud farmakoteraapia ebaõnnestumist

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1303232	temosolomiid, 140mg	L01AX03	TEMODAL, kõvakapsel, 5TK	Merck Sharp & Dohme Limited	100	C71-C71	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
					50						
1115019	temosolomiid, 250mg	L01AX03	TEMODAL, kõvakapsel, 5TK	Merck Sharp & Dohme Limited	50						
					100	C71-C71	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
1585953	travoprost, 40mcg 1ml	S01EE04	TRAVOPROST TEVA, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1083552	tsitalopraam, 10mg	N06AB04	CITALEC 10, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva a.s.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1435160	venlafaksiin, 37,5mg	N06AX16	VENLAFAXINE ELVIM, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	Portfarma ehf	50						