

Tervise- ja tööministri 15. juuni 2016. a määruse
nr 47 "Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a
määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite
loetelu" muutmise"

lisa

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr
112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu"

lisa

EESTI HAIGEKASSA RAVIMITE LOETELU

Lisatakse read järgmises sõnastuses:

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1316191	apomorfiin, 10mg 1ml	N04BC07	APO-GO PEN, süstelahus, 3ml 5TK	Britannia Pharmaceutical Limited	100	G20-G20	Neuroloog				konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellel esineb vaatamata optimaalsele suukaudsele ravile raskekujuline motoorikahäire kestvate või sagedaste mootorsete fluktuatsioonidega (MDS-UPDRS III skoor off-perioodis on >40 punkti, off-perioodi kestus >25% ärkvelolekuajast) ning ravivastus apomorfiinile on hea (MDS-UPDRS III skoor paraneb >40%)
1649796	aripiprasool, 10mg	N05AX12	ZYKALOR, tablett, 30TK	Medochemie Ltd.	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1649370	aripiprasool, 15mg	N05AX12	LEMILVO, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1649853	aripiprasool, 15mg	N05AX12	ZYKALOR, tablett, 30TK	Medochemie Ltd.	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1667325	asatiopriin, 50mg	L04AX01	ATSIMUTIN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o	50						
					75	N00-N08	Pediaater, Nefroloog				
					100	G70-G70	Neuroloog, Pediaater	esmane			
					75	K50-K51, K73-K74	Pediaater, Gastroenteroloog				
					75	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46	Pediaater, Reumatoloog				
					75	L12-L12, L13.0- L13.0, L10-L10	Pediaater, Dermatoveneroloog, Allergoloog- immunoloog				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1612055	bosutiniib, 100mg	L01XE14	BOSULIF, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Pfizer Limited	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru bosutiniibravi foonil). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi bosutiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.07.2016. a.

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1612077	bosutiniib, 500mg	L01XE14	BOSULIF, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Pfizer Limited	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru bosutiniibravi foonil). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi bosutiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.07.2016. a.
1664939	glargiin-insuliin, 100ühik 1ml	A10AE04	ABASAGLAR, süstelahus kolbampullis, 3ml 10TK	Eli Lilly Regional Operations GmbH	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1648403	gosereliin, 10,8mg	L02AE03	RESELIGO, implantaat süstlis, 1TK	Alvogen IPCo S.ar.l.	100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				lokaalse või lokaalselt levinud ja kõrge riskiga eesnäärmevähiga patsientidele (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel
					75	N80-N80	Günekoloog				III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele
					50						
1648425	gosereliin, 3,6mg	L02AE03	RESELIGO, implantaat süstlis, 1TK	Alvogen IPCo S.ar.l.	50						
					100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				lokaalse või lokaalselt levinud ja kõrge riskiga eesnäärmevähiga patsientidele (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel
					75	N80-N80	Günekoloog				III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1534205	kapetsitabiin, 150mg	L01BC06	CAPECITABINE NORAMEDA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	UAB Norameda	50						
					100	C18-C20	Onkoloog				kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliativseks monokemoteraapiaks
1534216	kapetsitabiin, 500mg	L01BC06	CAPECITABINE NORAMEDA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	UAB Norameda	100	C18-C20	Onkoloog				kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliativseks monokemoteraapiaks
					50						
1540099	kapetsitabiin, 500mg	L01BC06	CAPECITABINE ZENTIVA 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Zentiva k.s.	50						
					100	C18-C20	Onkoloog				kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliativseks monokemoteraapiaks
1713248	lispro-insuliin, 200TÜ 1ml	A10AB04	HUMALOG KWIKPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					
1672286	metoprolol, 100mg	C07AB02	BLOXAZOC 100, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Krka d.d. Novo Mesto	50						
					75	I47-I49	Kardioloog, Pediaater	esmane			
					75	I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15					
1672174	metoprolol, 50mg	C07AB02	BLOXAZOC 50, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Krka d.d. Novo Mesto	75	I20-I20, I50-I50, I10- I13, I15-I15					
					50						
					75	I47-I49	Kardioloog, Pediaater	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1671263	naloksegool, 25mg	A06AH03	MOVENTIG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	AstraZeneca AB	75	K59.0-K59.0					kroonilise opioid-indutseeritud kõhukinnisuse raviks patsiendile, kes kasutab igapäevaselt tugevatoimelist opioidi (morfiin, oksükodoon, fentanüül) ning kes ei ole vähemalt 2 kuu möödumisel opioidravi alustamisest saavutanud lahtistite abil piisavat raviefekti
1488337	takroliimus, 3mg	L04AD02	ADVAGRAF, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Astellas Pharma Europe B.V.	100	Z94-Z94, T86-T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA>20%), kordusüirdamise puhul, maksasiirdamise puhul, kopsusiirdamise puhul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1186040	treprostiniil, 1mg 1ml	B01AC21	REMODULIN, infusioonilahus, 20ml 1TK	United Therapeutics Europe, Ltd	100	I27.0-I27.0	Pediaater, Kardioloog, Pulmonoloog				NYHA III või IV kl idiopaatilise või päriliku pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kopsusiirdamise järjekorras olevale patsiendile, kellel muud ravivõimalused on ebapiisavad või ravivormi tõttu sobimatud
1186062	treprostiniil, 2,5mg 1ml	B01AC21	REMODULIN, infusioonilahus, 20ml 1TK	United Therapeutics Europe, Ltd	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Pediaater, Kardioloog				NYHA III või IV kl idiopaatilise või päriliku pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kopsusiirdamise järjekorras olevale patsiendile, kellel muud ravivõimalused on ebapiisavad või ravivormi tõttu sobimatud

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1186073	treprostinil, 5mg 1ml	B01AC21	REMODYLIN, infusioonilahus, 20ml 1TK	United Therapeutics Europe, Ltd	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Pediaater, Kardioloog				NYHA III või IV kl idiopaatilise või päriliku pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kopsusiirdamise järjekorras olevale patsiendile, kellel muud ravivõimalused on ebapiisavad või ravivormi tõttu sobimatud

Muudetakse read ja sõnastatakse järgmiselt:

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1349872	ambrisentaan, 10mg	C02KX02	VOLIBRIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Glaxo Group Ltd.	50						
					100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Pediaater, Kardioloog, Reumatoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1349850	ambrisentaan, 5mg	C02KX02	VOLIBRIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Glaxo Group Ltd.	50						
					100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pulmonoloog, Pediaater, Reumatoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafili on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
1019809	asitromütsiin, 20mg 1ml	J01FA10	SUMAMED, suukaudse suspensiooni pulber, 20ml 1TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
1019775	asitromütsiin, 250mg	J01FA10	SUMAMED, kõvakapsel, 6TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1184914	asitromütsiin, 250mg	J01FA10	AZITHROMYCIN SANDOZ 250MG, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK	Sandoz GmbH	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1614439	asitromütsiin, 250mg	J01FA10	AZITHROMYCIN KRKA, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK	KRKA d.d., Novo mesto	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					50						
1373396	asitromütsiin, 2g	J01FA10	ZITRAVAL, suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 1TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
					100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1168130	asitromütsiin, 40mg 1ml	J01FA10	SUMAMED FORTE, suukaudse suspensiooni pulber, 15ml 1TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1267309	asitromütsiin, 40mg 1ml	J01FA10	SUMAMED FORTE, suukaudse suspensiooni pulber, 30ml 1TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1019797	asitromütsiin, 500mg	J01FA10	SUMAMED, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1113398	asitromütsiin, 500mg	J01FA10	AZITROX 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	Zentiva k.s.	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1184992	asitromütsiin, 500mg	J01FA10	AZITHROMYCIN SANDOZ 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	Sandoz GmbH	50						
					100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
1549548	asitromütsiin, 500mg	J01FA10	AZITHROMYCIN GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	AS Grindeks	50						
					100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
1563342	asitromütsiin, 500mg	J01FA10	AZITHROMYCIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1614451	asitromütsiin, 500mg	J01FA10	AZITHROMYCIN KRKA, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	KRKA d.d., Novo mesto	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1586718	bosentaan, 125mg	C02KX01	BOSENTAN NORAMEDA 125 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	UAB Norameda	50						
					100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Kardioloog, Pulmonoloog, Pediaater				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
1586684	bosentaan, 62,5mg	C02KX01	BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	UAB Norameda	50						
					100	I27.0-I27.0	Pediaater, Pulmonoloog, Reumatoloog, Kardioloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1346958	fentanüül, 100mcg	N02AB03	EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK	Teva B.V.	100	C00-D48	Neuroloog, Hematoloog, Anestesioloog, Reumatoloog, Onkoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1400948	fentanüül, 100mcg	N02AB03	LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	C00-D48	Neuroloog, Anestesioloog, Reumatoloog, Onkoloog, Hematoloog	esmane			<p>ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalentsust) annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu</p>

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1346970	fentanüül, 200mcg	N02AB03	EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK	Teva B.V.	100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog, Anestesioloog, Neuroloog, Reumatoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1400959	fentanüül, 200mcg	N02AB03	LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	C00-D48	Hematoloog, Reumatoloog, Anestesioloog, Onkoloog, Neuroloog	esmane			<p>ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalentsust) annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu</p>

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1514034	fentanüül, 200mcg	N02AB03	BREAKYL, bukaalravimküle, 10TK	Meda Pharma GmbH & Co. KG	50 100	C00-D48	Reumatoloog, Neuroloog, Hematoloog, Onkoloog, Anestesioloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neurooloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1400960	fentanüül, 300mcg	N02AB03	LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	C00-D48	Onkoloog, Anestesioloog, Neuroloog, Reumatoloog, Hematoloog	esmane			<p>ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalentsust) annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu</p>

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1346992	fentanüül, 400mcg	N02AB03	EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					100	C00-D48	Neuroloog, Reumatoloog, Onkoloog, Anestesioloog, Hematoloog	esmane			<p>ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu</p>

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1400971	fentanüül, 400mcg	N02AB03	LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK	Gedeon Richter Plc.	100	C00-D48	Hematoloog, Anestesioloog, Onkoloog, Neuroloog, Reumatoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalentsust) annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1586796	fentanüül, 400mcg	N02AB03	BREAKYL, bukaalravimküle, 10TK	Meda Pharma GmbH & Co. KG	100	C00-D48	Reumatoloog, Neuroloog, Onkoloog, Hematoloog, Anestesioloog	esmane			<p>ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalentsust) annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu</p>
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1347038	fentanüül, 600mcg	N02AB03	EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK	Teva B.V.	100	C00-D48	Reumatoloog, Hematoloog, Anestesioloog, Onkoloog, Neuroloog	esmane			<p>ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu</p>
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1400982	fentanüül, 600mcg	N02AB03	LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK	Gedeon Richter Plc.	100	C00-D48	Neuroloog, Anestesioloog, Hematoloog, Onkoloog, Reumatoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
					50						

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1347016	fentanüül, 800mcg	N02AB03	EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					100	C00-D48	Neuroloog, Hematoloog, Reumatoloog, Onkoloog, Anestesioloog	esmane			<p>ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu</p>

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1400993	fentanüül, 800mcg	N02AB03	LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	C00-D48	Onkoloog, Hematoloog, Reumatoloog, Neuroloog, Anestesioloog	esmane			<p>ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalentsust) annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu</p>

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1002621	gosereliin, 3,6mg	L02AE03	ZOLADEX, implantaat, 1TK	AstraZeneca UK Limited	75	N80-N80	Günekoloog				III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele
					50						
					100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog			lokaalse või lokaalselt levinud ja kõrge riskiga eesnäärmevähiga patsientidele (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel	
1221039	sildenafil, 20mg	G04BE03	REVATIO, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Pfizer Limited	50	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Pulmonoloog, Pediaater, Kardioloog				
					100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Pulmonoloog, Pediaater, Kardioloog			NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel	

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1008559	tsüklosporiin, 100mg	L04AD01	SANDIMMUN NEORAL, pehmekapsel, 50TK	Novartis Finland OY	75	L50.8-L50.9, L50.1- L50.5					
					100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater				
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater				
					75	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog, Reumatoloog				
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46	Reumatoloog, Pediaater				
					100	D46-D46	Hematoloog				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					50						
1098840	tsüklosporiin, 100mg	L04AD01	EQUORAL 100 MG, pehmekapsel, 50TK	TEVA Czech Industries s.r.o.	100	D46-D46	Hematoloog				
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46	Pediaater, Reumatoloog				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater				
					75	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater, Reumatoloog				
					50						
					75	L50.8-L50.9, L50.1- L50.5					
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1008526	tsüklosporiin, 25mg	L04AD01	SANDIMMUN NEORAL, pehmekapsel, 50TK	Novartis Finland OY	100	Z94-Z94, T86-T86					
					100	D60-D64	Pediaater, Hematoloog				
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46	Reumatoloog, Pediaater				
					75	L40-L40	Reumatoloog, Dermatoveneroloog, Pediaater				
					100	D46-D46	Hematoloog				
					75	L50.8-L50.9, L50.1- L50.5					
					50						
					75	N00-N08	Pediaater, Nefroloog				
1098828	tsüklosporiin, 25mg	L04AD01	EQUORAL 25 MG, pehmekapsel, 50TK	TEVA Czech Industries s.r.o.	75	L50.8-L50.9, L50.1- L50.5					
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					100	D60-D64	Pediaater, Hematoloog				
					50						
					75	N00-N08	Pediaater, Nefroloog				
					100	D46-D46	Hematoloog				
					75	L40-L40	Reumatoloog, Pediaater, Dermatoveneroloog				
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46	Reumatoloog, Pediaater				

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1008548	tsüklosporiin, 50mg	L04AD01	SANDIMMUN NEORAL, pehmekapsel, 50TK	Novartis Finland OY	75	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog, Reumatoloog				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	L50.8-L50.9, L50.1- L50.5					
					100	D46-D46	Hematoloog				
					50						
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46	Pediaater, Reumatoloog				
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater				
100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater									
1098839	tsüklosporiin, 50mg	L04AD01	EQUORAL 50 MG, pehmekapsel, 50TK	TEVA Czech Industries s.r.o.	100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	L50.8-L50.9, L50.1- L50.5					
					75	L40-L40	Reumatoloog, Dermatoveneroloog, Pediaater				
					100	D46-D46	Hematoloog				
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater				
					50						
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46	Pediaater, Reumatoloog				
100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater									

Tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1627523	alogliptiin, 25mg	A10BH04	VIPIDIA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Takeda Pharma A/S	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombineeritud raviks; kombineeritud ravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1299652	atomoksetiin, 100mg	N06BA09	STRATTERA, kõvakapsel, 28TK	Eli Lilly Holdings Limited	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20- aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19-aastastele lastele ja noorukitele aktiivsuse- ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1062436	beetametasoon+salitsü- ülhape, 0,5mg+30mg 1g	D07BC80	DIPROSALIC, salv, 50g 1TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	50						
1232569	beklometasoon, 50mcg 1annust	R01AD01	BECLONASAL, ninasprei, suspensioon, 200annust 1TK	Orion Corporation Orion Pharma	75 50	J30-J30				17,00	
1537095	botsepreviir, 200mg	J05AE12	VICTRELIS, kõvakapsel, 336TK	Merck Sharp & Dohme Ltd	100	B18.2-B18.2	Gastroenteroloog, Infektsionist				1. ja 4. genotüübi kroonilise progresseeruva C- viirushepatiidi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel esineb mõõdukas või raske maksafibroos (F2-4) ja kompenseeritud maksahaigus
1175521	budesoniid, 200mcg 1annust	R03BA02	BUDIAIR, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annust 1TK	Chiesi Pharmaceuticals GmbH	75 50	J45-J45					
1083585	doksasosiin, 2mg	C02CA04	ZOXON 2, tablett, 30TK	Takeda GmbH	50						
1321951	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	NEPANIL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Gedeon Richter Plc.	50 100	F33.2-F33.3, F32.2- F32.3	Psühhiaater	esmane			
1185858	formoterool, 12mcg	R03AC13	GALIRON 12 MIKROGRAMMI, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 60TK	Septinta S.P.R.L.	75 50 75	J45-J45 J43-J44	 Pulmonoloog	 esmane			
1000258	furosemiid, 40mg	C03CA01	FUROSEMID NYCOMED 40 mg, tablett, 20TK	Takeda Pharma AS	100 50 75	I27.0-I27.0 I50-I50					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloo hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1073078	ibuprofeen, 400mg	M01AE01	IBUMETIN, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Takeda Pharma AS	75	M15-M19			63,00		
					50						
					100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05- M08, M45-M46					
1454497	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE01	LATANOPROST NTC, silmatilgad, lahus, 2.5ml 3viaal	NTC S.r.l.	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1012420	lispro-insuliin, 100TÜ 1ml	A10AD04	HUMALOG MIX50, süstesuspensioon kolbampullis, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1					
1582129	memantiin, 10mg	N06DX01	XAPIMANT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1582219	memantiin, 10mg	N06DX01	XAPIMANT, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1014051	morfiin, 30mg	N02AA01	DOLTARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK	Takeda Pharma AS	50						
					100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Anestesioloog, Neuroloog	esmane			esmise väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul
					100	C00-D48					

Ravimi- kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus- tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1014062	morfiin, 60mg	N02AA01	DOLTARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK	Takeda Pharma AS	50						
					100	R52.1-R52.1	Anestesioloog, Neuroloog, Reumatoloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul
					100	C00-D48					
1259096	olansapiin, 10mg	N05AH03	OLANZAPIN-RATIOPHARM, tablett, 28TK	ratiopharm GmbH	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater			kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid	
1351583	paroksetiin, 20mg	N06AB05	PAROXETINE ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Orion Corporation	100	F33.2-F33.3, F32.2- F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1323762	pramipeksool, 0,18mg	N04BC05	PRAMIPEXOLE PORTFARMA, tablett, 30TK	Portfarma ehf	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1609602	telmisartaan+hüdroklor otiasiid, 40mg+12,5mg	C09DA07	TOLUCOMBI, tablett, 30TK	Krka, d.d., Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1609680	telmisartaan+hüdroklor otiasiid, 80mg+12,5mg	C09DA07	TOLUCOMBI, tablett, 30TK	Krka, d.d., Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1609769	telmisartaan+hüdroklor otiasiid, 80mg+25mg	C09DA07	TOLUCOMBI, tablett, 30TK	Krka, d.d., Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1158724	terbinafiin, 250mg	D01BA02	TERBINAFINE SANDOZ 250 MG, tablett, 14TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1281709	venlafaksiin, 75mg	N06AX16	VENLAFAXIN-RATIOPHARM 75MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	ratiopharm GmbH	50						
1021161	östramustiin, 140mg	L01XX11	ESTRACYT, kõvakapsel, 100TK	Pfizer Enterprises SARL	50						